



# 綠繡眼

學名：*Zosterops japonica simplex* Swinhoe

英名：Japanese white-eye

俗名：青笛仔、青絲仔

## 一、前言

在果樹上除了最常見的為白頭翁外，以綠繡眼最為普遍留鳥，雖其危害農作物，實際上亦取食農業害蟲，現因賞鳥盛行，又為放生的主要鳥類之一，因而坊間已大量人工飼養，應研擬一套應對之法。

## 二、危害狀

危害情形與白頭翁相似，皆屬危害嚴重的鳥類，但危害孔較小。

## 三、綠繡眼概述

### (一) 分類地位

燕雀目 Passeriformes

繡眼科 Zosteropidae

### (二) 分布

臺灣、中國華南各省。

### (三) 寄主

以漿果類作物、花蜜、果實為主，並取食昆蟲，亦常見於朱槿、刺桐等開花植物上吸食蜜蜂。

### (四) 形態

體上部柔綠色，額、腮及喉黃色；嘴黑色；眼周圍有白圈，並具不明顯的黑色過眼

線；胸及腹部白色，胸側羽色略濃；尾下覆羽鮮黃色；腳青灰色或褐色，由於具青綠色的羽衣，鳴聲宛如吹笛，因而得名。體長13



圖一：綠繡眼。（章加寶）





公分，翼長6.9 ~ 7.0公分，尾長4.56 ~ 5.4公分（圖一）。

#### （五）生活史

繁殖時期在4 ~ 6月間，築巢於離地4 ~ 6公尺的樹林或竹林裡，以芒草穗、草莖及乾葉為材料，築成細緻精巧的酒杯狀，每巢平均2 ~ 3個蛋，藍白色，無斑點，大小約16 × 12公分。

#### 四、發生生態

為普遍留鳥，常見於平地至海拔1200公尺間，連城市的庭園、校園、公園等均能見到，海拔1200公尺的山區於秋冬季時較易發現，除繁殖期外常10餘隻集體覓食或上百隻成群活動於枝葉上，鳴唱活動，發出啾呼叫聲，其鳴聲清朗而帶顫動，婉轉而動聽。

#### 五、防治方法

同前述白頭翁。

#### 六、參考文獻

1. 何東輯。2002。彩翼精靈。p. 95。特有生物保育中心。
2. 周鎮。1995。臺灣鳥類圖鑑 1：242。
3. 周鎮。1998。臺灣鄉土鳥誌。p. 301。
4. 周鎮。1999。鳳凰谷的野鳥。p. 172。
5. 魏銀南。2002。墾丁國家公園賞鳥手冊。p. 115。墾丁國家公園管理處。

（作者：章加寶）

