

中華民國輸入植物或植物產品檢疫規定甲、禁止輸入之植物或植物產品第一點、乙、有條件輸入植物或植物產品之檢疫條件第一點、第二點、第十點修正草案對照表

修	正	規	定	現	行	規	定	說	明
甲、禁止輸入之植物或植物產品 依據：植物防疫檢疫法第十四條第一項第一款規定。 一、禁止輸入之植物或植物產品之名稱及其部位、國家或地區、禁止原因如下表：				甲、禁止輸入之植物或植物產品 依據：植物防疫檢疫法第十四條第一項第一款規定。 一、禁止輸入之植物或植物產品之名稱及其部位、國家或地區、禁止原因如下表：				一、依據 CABI、EPPO 資料及最新疫情資料等相關文獻，新增中國大陸及新喀里多尼亞為穿孔線蟲疫區，另依英文國名字首，酌予調整汶萊、帛琉、斐濟及密克羅尼西亞等國家排序，並遞移其他國家或地區排序。 二、增列水蘿（ <i>Aponogeton natans</i> ）及椒草屬（ <i>Peperomia</i> spp.）地上部為其寄主，並酌予修正部分植物學名格式。	
植物名稱及其部位	國 家 或 地 區	禁止原因（病蟲害名稱）		植物名稱及其部位	國 家 或 地 區	禁止原因（病蟲害名稱）			
3. 植物名稱及其部位： I. 除下列植物外，其他 生植株之地下部及不定根（植物組織培養苗除外）： (1) 龍舌蘭屬（ <i>Agave</i> spp.） (2) 蔥屬（ <i>Allium</i> spp.） (3) 孤挺花屬（ <i>Amaryllis</i> spp. = <i>Hippeastrum</i> spp.） (4) 牛蒡（ <i>Arctium lappa</i> L.） (5) 蘆筍（ <i>Asparagus officinalis</i> ） (6) 苔蘚類（ <i>Bryophyta</i> ） (7) 仙人掌科（ <i>Cactaceae</i> ） (8) 大麻屬（ <i>Cannabis</i> spp.） (9) 變葉木屬（ <i>Codiaeum</i> spp.） (10) 石竹屬（ <i>Dianthus</i> spp.） (11) 鈴蘭（ <i>Epipactis longifolia</i> ） (12) 大戟屬（ <i>Euphorbia</i> spp.） (13) 小蒼蘭屬（ <i>Freesia</i> spp.） (14) 食用菌類(擔子菌門及子囊菌門)（ <i>Edible fungus</i> Basidiomycota and	亞洲及太平洋地區 (1)美屬薩摩亞 (2)澳大利亞(北領地、新南威爾士州、昆士蘭州、南澳大利亞州、西澳大利亞州) (3)汶萊 (4)中國大陸 (5)庫克群島 (6)斐濟 (7)法屬波里尼西亞 (8)關島 (9)印度 (10)印尼 (11)黎巴嫩 (12)馬來西亞 (13)密克羅尼西亞 (14)尼泊爾 (15)新喀里多尼亞 (16)紐埃 (17)諾福克島 (18)阿曼 (19)巴基斯坦 (20)帛琉 (21)巴布亞紐幾內亞 (22)菲律賓 (23)薩摩亞 (24)新加坡 (25)所羅門群島 (26)斯里蘭卡 (27)泰國 (28)東加	穿孔線蟲 (<i>Radopholus similis</i> (Cobb)Thorne; <i>R. citrophilus</i> Huettel, Dickson & Kaplan)		3. 植物名稱及其部位： I. 除下列植物外，其他 生植株之地下部及不定根（植物組織培養苗除外）： (1) 龍舌蘭屬（ <i>Agave</i> spp.） (2) 蔥屬（ <i>Allium</i> spp.） (3) 孤挺花屬（ <i>Amaryllis</i> spp. = <i>Hippeastrum</i> spp.） (4) 牛蒡（ <i>Arctium lappa</i> L.） (5) 蘆筍（ <i>Asparagus officinalis</i> ） (6) 苔蘚類（ <i>Bryophyta</i> ） (7) 仙人掌科（ <i>Cactaceae</i> ） (8) 大麻屬（ <i>Cannabis</i> spp.） (9) 變葉木屬（ <i>Codiaeum</i> spp.） (10) 石竹屬（ <i>Dianthus</i> spp.） (11) 鈴蘭（ <i>Epipactis longifolia</i> ） (12) 大戟屬（ <i>Euphorbia</i> spp.） (13) 小蒼蘭屬（ <i>Freesia</i> spp.） (14) 食用菌類(擔子菌門及子囊菌門)（ <i>Edible fungus</i> Basidiomycota and	亞洲及太平洋地區 (1)美屬薩摩亞 (2)澳大利亞(北領地、新南威爾士州、昆士蘭州、南澳大利亞州、西澳大利亞州) (3)帛琉 (4)汶萊 (5)庫克群島 (6)密克羅尼西亞 (7)斐濟 (8)法屬波里尼西亞 (9)關島 (10)印度 (11)印尼 (12)黎巴嫩 (13)馬來西亞 (14)尼泊爾 (15)紐埃 (16)諾福克島 (17)阿曼 (18)巴基斯坦 (19)巴布亞紐幾內亞 (20)菲律賓 (21)薩摩亞 (22)新加坡 (23)所羅門群島 (24)斯里蘭卡 (25)泰國 (26)東加 (27)越南 (28)葉門	穿孔線蟲 (<i>Radopholus similis</i> (Cobb)Thorne; <i>R. citrophilus</i> Huettel, Dickson & Kaplan)			

Ascomycota))	(29)越南		Ascomycota))	非洲		
(15) 牻牛兒苗屬 (<i>Geranium</i> spp.)	(30)葉門		(15) 牻牛兒苗屬 (<i>Geranium</i> spp.)	(29)非洲國家、地區		
(16) 風信子屬 (<i>Hyacinthus</i> spp.)	非洲		(16) 風信子屬 (<i>Hyacinthus</i> spp.)	歐洲		
(17) 鳶尾屬(<i>Iris</i> spp.)	(31)非洲國家、地區		(17) 鳶尾屬(<i>Iris</i> spp.)	(30)比利時		
(18) 胡桃屬(<i>Juglans</i> spp.)	歐洲		(18) 胡桃屬(<i>Juglans</i> spp.)	(31)法國		
(19) 百合屬(<i>Lilium</i> spp.)	(32)比利時		(19)百合屬(<i>Lilium</i> spp.)	(32)德國		
(20) 蘋果屬 (<i>Malus</i> spp.)	(33)法國		(20)蘋果屬(<i>Malus</i> spp.)	(33)義大利		
(21) 地錢(<i>Marchantia</i> <i>polymorpha</i>)	(34)德國		(21)地錢(<i>Marchantia</i> <i>polymorpha</i>)	(34)盧森堡		
(22) 葡萄風信子屬 (	(35) 義大利		(22)葡萄風信子屬 (	(35)荷蘭		
<i>Muscari</i> spp.)	(36) 盧森堡		<i>Muscari</i> spp.)	(36)波蘭		
(23) 蘭科 (Orchidaceae)	(37) 荷蘭		(23)蘭科 (Orchidaceae)	(37)斯洛維尼亞		
(24) 防風草 (<i>Pastinaca</i> <i>sativa</i>)	(38) 波蘭		(24)防風草 (<i>Pastinaca</i> <i>sativa</i>)	(38)英國		
(25) 天竺葵屬 (<i>Pelargonium</i> spp.)	(39) 斯洛維尼亞		(25)天竺葵屬 (<i>Pelargonium</i> spp.)	北美		
(26) 李屬 (<i>Prunus</i> spp.;	(40) 英國		(26)李屬 (<i>Prunus</i> spp.;	(39)墨西哥		
<i>P. persica</i> 除外)	北美		<i>P. persica</i> 除外)	(40)美國(阿拉斯加州		
(27) 蕨類 (Pteridophyte)	(41) 墨西哥		(27)蕨類 (Pteridophyte)	及加利福尼亞州		
(28) 杜鵑花屬	(42) 美國(阿拉斯加州		(28)杜鵑花屬	除外)		
(<i>Rhododendron</i> spp.;	及加利福尼亞州		(<i>Rhododendron</i> spp.;	中南美		
<i>R. indicum</i> 除外)	除外)		<i>R. indicum</i> 除外)	(41)巴貝多		
(29) 蚌蘭(<i>Rhoeo discolor</i>)	中南美		(29)蚌蘭(<i>Rhoeo discolor</i>)	(42)貝里斯		
(30) 薔薇屬(<i>Rosa</i> spp.)	(43) 巴貝多		(30)薔薇屬(<i>Rosa</i> spp.)	(43)玻利維亞		
(31) 懸鈎子屬(<i>Rubus</i> spp.)	(44) 貝里斯		(31)懸鈎子屬(<i>Rubus</i> spp.)	(44)巴西		
(32) 慈菇屬(<i>Sagittaria</i> spp.)	(45) 玻利維亞		(32)慈菇屬(<i>Sagittaria</i> spp.)	(45)哥倫比亞		
(33) 馬鈴薯(<i>Solanum</i> <i>tuberosum</i>)塊莖	(46) 巴西		(33)馬鈴薯(<i>Solanum</i> <i>tuberosum</i>)塊莖	(46)哥斯大黎加		
(34) 鬱金香屬(<i>Tulipa</i> spp.)	(47) 哥倫比亞		(34)鬱金香屬(<i>Tulipa</i> spp.)	(47)古巴		
(35) 葡萄(<i>Vitis vinifera</i>)	(48) 哥斯大黎加		(35)葡萄(<i>Vitis vinifera</i>)	(48)多米尼克		
(36) 花卉種球(不包括美	(49) 古巴		(36)花卉種球(不包括美	(49)多明尼加		
人蕉屬(<i>Cannas</i>	(50) 多米尼克		人蕉屬 (<i>Cannas</i> spp.)	(50)厄瓜多		
spp.)、芭蕉屬(<i>Musa</i>	(51) 多明尼加		、芭蕉屬(<i>Musa</i> spp.)	(51)薩爾瓦多		
spp.) 及薑科	(52) 厄瓜多		(<i>Zingiberaceae</i>))	(52)法屬圭亞那		
	(53) 薩爾瓦多			(53)法屬西印度群島		
	(54) 法屬圭亞那			(54)格瑞那達		
	(55) 法屬西印度群島			(55)瓜地洛普		
	(56) 格瑞那達			(56)瓜地馬拉		
	(57) 瓜地洛普			(57)蓋亞那		
	(58) 瓜地馬拉			(58)宏都拉斯		
	(59) 蓋亞那			(59)牙買加		
	(60) 宏都拉斯			(60)馬丁尼克島(法		
	(61) 牙買加			屬)		
	(62) 馬丁尼克島(法			(61)尼加拉瓜		
	屬)			(62)巴拿馬		
II. 下列植物之莖(包含	(63) 尼加拉瓜		II. 下列植物之莖(包含	(63)秘魯		

根狀莖)： (1)火鶴花屬(<i>Anthurium</i> spp.) (2)蔓綠絨屬(<i>Philodendron</i> spp.) (3)龜背芋屬(<i>Monstera</i> spp.) III. 下列植物之地上部： (1) 水榕屬(<i>Anubias</i> spp.) (2)水蘿(<i>Aponogeton natans</i>) (3)辣椒榕屬(<i>Bucephalandra</i> spp.) (4)莎草屬(<i>Cyperus</i> spp.) (5)椒草屬 (<i>Peperomia</i> spp.)			(64) 巴拿馬 (65) 秘魯 (66) 波多黎各 (67) 聖克里斯多福 (68) 聖露西亞 (69) 聖文森 (70) 千里達 (71) 蘇利南 (72) 美屬維京群島 (73) 委內瑞拉					
			根狀莖)： (1)火鶴花屬(<i>Anthurium</i> spp.) (2)蔓綠絨屬(<i>Philodendron</i> spp.) (3)龜背芋屬(<i>Monstera</i> spp.) III. 下列植物之地上部： (1)水榕屬(<i>Anubias</i> spp.) (2)辣椒榕屬(<i>Bucephalandra</i> spp.) (3)莎草屬(<i>Cyperus</i> spp.)			(64)波多黎各 (65)聖克里斯多福 (66)聖露西亞 (67)聖文森 (68)千里達 (69)蘇利南 (70)美屬維京群島 (71)委內瑞拉		
植物名稱及其部位	國 家 或 地 區	禁止原因（病蟲害名稱）	植物名稱及其部位	國 家 或 地 區	禁止原因（病蟲害名稱）	一、依據 CABI、EPPO 資料及最新疫情資料等相關文獻，新增中國大陸、伊朗、日本、哈薩克、南韓、寮國、巴基斯坦、泰國、奈及利亞、蘇丹、阿爾巴尼亞、亞塞拜然、捷克、德國、匈牙利、俄羅斯、塞爾維亞、加拿大、智利、古巴、牙買加、烏拉圭、澳大利亞及紐西蘭為木孔病疫區。 二、經查我國外交部將賽普勒斯歸列於歐洲地區，爰刪除原列於亞洲及太平洋地區之項目，將其移列於歐洲。另史瓦濟蘭業已改稱為史瓦帝尼，爰依英文國名字首，酌予調整史瓦帝尼及賴索托等國家排序，並遞移其他國家或地區排序。		
9.柑桔類（包括柑桔屬（ <i>Citrus</i> spp.）、金柑屬（ <i>Fortunella</i> spp.）、枸橘屬（ <i>Poncirus</i> spp.）生植株之全部、部分（花、果實、種子除外）	亞洲及太平洋地區 (1)澳大利亞 (2)亞塞拜然 (3)中國大陸 (4)印度 (5)伊朗 (6)以色列 (7)日本 (8)約旦 (9)哈薩克 (10)南韓 (11)寮國 (12)黎巴嫩 (13)紐西蘭 (14)巴基斯坦 (15)菲律賓 (16)俄羅斯聯邦 (17)沙烏地阿拉伯 (18)敘利亞 (19)泰國 (20)土耳其	木孔病 （ <i>Citrus cachexia viroid</i> ）	9.柑桔類（包括柑桔屬（ <i>Citrus</i> spp.）、金柑屬（ <i>Fortunella</i> spp.）、枸橘屬（ <i>Poncirus</i> spp.）生植株之全部、部分（花、果實、種子除外）	亞洲及太平洋地區 (1)賽普勒斯 (2)印度 (3)以色列 (4)約旦 (5)黎巴嫩 (6)菲律賓 (7)沙烏地阿拉伯 (8)敘利亞 (9)土耳其 (10)葉門共和國 非洲 (11)阿爾及利亞 (12)埃及 (13)肯亞 (14)摩洛哥 (15)賴索托 (16)南非 (17)史瓦濟蘭 (18)突尼西亞 歐洲	木孔病 （ <i>Citrus cachexia viroid</i> ）			

	(21)葉門共和國 非洲 (22)阿爾及利亞 (23)埃及 (24)史瓦帝尼 (25)肯亞 (26)賴索托 (27)摩洛哥 (28)奈及利亞 (29)南非 (30)蘇丹 (31)突尼西亞 歐洲 (32)阿爾巴尼亞 (33)波士尼亞赫塞哥維納 (34)克羅埃西亞 (35)賽普勒斯 (36)捷克 (37)法國 (38)德國 (39)希臘 (40)匈牙利 (41)義大利 (42)葡萄牙 (43)塞爾維亞 (44)斯洛維尼亞 (45)西班牙 (46)南斯拉夫 北美 (47)加拿大 (48)美國 中南美 (49)阿根廷 (50)巴西 (51)智利 (52)哥倫比亞 (53)古巴 (54)厄瓜多 (55)蓋亞那 (56)牙買加 (57)蘇利南			(19)波士尼亞赫塞哥維納 (20)克羅埃西亞 (21)法國 (22)希臘 (23)義大利 (24)葡萄牙 (25)斯洛維尼亞 (26)西班牙 (27)南斯拉夫 北美 (28)美國 中南美 (29)阿根廷 (30)巴西 (31)哥倫比亞 (32)厄瓜多 (33)蓋亞那 (34)蘇利南 (35)千里達及托巴哥 (36)委內瑞拉		
--	--	--	--	---	--	--

	(58)千里達及托巴哥 (59)烏拉圭 (60)委內瑞拉					
植物名稱及其部位	國 家 或 地 區	禁 止 原 因 (病 蟲 害 名 稱)	植物名稱及其部位	國 家 或 地 區	禁 止 原 因 (病 蟲 害 名 稱)	經查我國外交部將賽普勒斯及烏克蘭歸列於歐洲地區，爰刪除原列於亞洲及太平洋地區之項目，將其移列於歐洲，並遞移其他國家或地區排序。
16. 柑桔、檸檬、酸橙、香櫞等植物之生植株之全部、部分（種子、果實除外）	亞洲及太平洋地區 (1)亞美尼亞 (2)亞塞拜然 (3)白俄羅斯 (4)喬治亞 (5)以色列 (6)哈薩克 (7)吉爾吉斯 (8)摩爾多瓦 (9)俄羅斯聯邦 (10)敘利亞 (11)塔吉克 (12)土耳其 (13)土庫曼 (14)烏茲別克 非洲 (15)阿爾及利亞 (16)突尼西亞 歐洲 (17)克利特島（希臘屬） (18)賽普勒斯 (19)愛沙尼亞 (20)法國 (21)希臘 (22)義大利 (23)拉脫維亞 (24)立陶宛 (25)烏克蘭	枝枯病 （ <i>Phoma tracheiphila</i> Petri）	16. 柑桔、檸檬、酸橙、香櫞等植物之生植株之全部、部分（種子、果實除外）	亞洲及太平洋地區 (1)亞美尼亞 (2)亞塞拜然 (3)白俄羅斯 (4)賽普勒斯 (5)喬治亞 (6)以色列 (7)哈薩克 (8)吉爾吉斯 (9)摩爾多瓦 (10)俄羅斯聯邦 (11)敘利亞 (12)塔吉克 (13)土耳其 (14)土庫曼 (15)烏克蘭 (16)烏茲別克 非洲 (17)阿爾及利亞 (18)突尼西亞 歐洲 (19)克利特島（希臘屬） (20)愛沙尼亞 (21)法國 (22)希臘 (23)義大利 (24)拉脫維亞 (25)立陶宛	枝枯病 （ <i>Phoma tracheiphila</i> Petri）	
植物名稱及其部位	國 家 或 地 區	禁 止 原 因 (病 蟲 害 名 稱)	植物名稱及其部位	國 家 或 地 區	禁 止 原 因 (病 蟲 害 名 稱)	經查我國外交部將賽普勒斯及烏克蘭歸列於歐洲地區，爰刪除原列於亞洲及太平洋地區之項目，將其移列於歐洲，並依英文國名字首，酌予調整斯洛維尼亞及英國等國家排序，並遞移其他國家或地區排序。
28. 鮮果實；包括果樹與蔬菜之果實及青膨香蕉。但不包括下列果實： (1) 黃秋葵 （ <i>Abelmoschus esculentus</i> ）	亞洲及太平洋地區 (1) 亞美尼亞 (2) 澳大利亞（塔斯馬尼亞州、Riverland 地區及Sunraysia 地區除外）	地中海果實蠅 （ <i>Ceratitis capitata</i> Wiedemann）	28. 鮮果實；包括果樹與蔬菜之果實及青膨香蕉。但不包括下列果實： (1) 黃秋葵 （ <i>Abelmoschus esculentus</i> ）	亞洲及太平洋地區 (1) 亞美尼亞 (2) 澳大利亞（塔斯馬尼亞州、Riverland 地區及Sunraysia 地區除外）	地中海果實蠅 （ <i>Ceratitis capitata</i> Wiedemann）	

=<i>Hibiscus esculentus</i>) (2) 不含果梨之腰果 (<i>Anacardium occidentale</i>) (3) 鳳梨 (<i>Ananas comosus</i>) (4) 板栗 (<i>Castanea mollissima</i>) (5) 椰子 (<i>Cocos nucifera</i>) (6) 榛果 (<i>Corylus avellana</i>) (7) 桉屬 (<i>Eucalyptus</i> spp.) (8) 山毛櫸 (<i>Fagus grandifolia</i>) (9) 鐵筷子屬 (<i>Helleborus</i> spp.) (10) 金絲桃屬 (<i>Hypericum</i> spp.) (11) 白絨樹屬 (<i>Leucadendron</i> spp.) (12) 風吹蕭屬 (<i>Leycesteria</i> spp.) (13) 未黃熟香蕉 (<i>Musa</i> spp.) (14) 黑種草屬 (<i>Nigella</i> spp.) (15) 美洲白橡 (<i>Quercus alba</i>) (16) 假葉樹屬 (<i>Ruscus</i> spp.) (17) 雪梅屬 (<i>Symphoricarpus</i>)	(3) 亞塞拜然 (4) 白俄羅斯 (5) 喬治亞 (6) 以色列 (7) 約旦 (8) 哈薩克 (9) 吉爾吉斯 (10) 黎巴嫩 (11) 摩爾多瓦 (12) 俄羅斯聯邦 (13) 沙烏地阿拉伯 (14) 敘利亞 (15) 塔吉克 (16) 土耳其 (17) 土庫曼 (18) 烏茲別克 非洲 (19) 非洲國家、地區 歐洲 (20) 阿爾巴尼亞 (21) 奧地利 (22) 比利時 (23) 波士尼亞赫塞哥維納 (24) 克羅埃西亞 (25) 賽普勒斯 (26) 愛沙尼亞 (27) 法國 (28) 德國(下薩克森邦除外) (29) 希臘 (30) 匈牙利 (31) 愛爾蘭 (32) 義大利 (33) 拉脫維亞 (34) 立陶宛 (35) 馬爾他 (36) 荷蘭 (37) 葡萄牙 (38) 斯洛維尼亞 (39) 西班牙			=<i>Hibiscus esculentus</i>) (2) 不含果梨之腰果 (<i>Anacardium occidentale</i>) (3) 鳳梨 (<i>Ananas comosus</i>) (4) 板栗 (<i>Castanea mollissima</i>) (5) 椰子 (<i>Cocos nucifera</i>) (6) 榛果 (<i>Corylus avellana</i>) (7) 桉屬 (<i>Eucalyptus</i> spp.) (8) 山毛櫸 (<i>Fagus grandifolia</i>) (9) 鐵筷子屬 (<i>Helleborus</i> spp.) (10) 金絲桃屬 (<i>Hypericum</i> spp.) (11) 白絨樹屬 (<i>Leucadendron</i> spp.) (12) 風吹蕭屬 (<i>Leycesteria</i> spp.) (13) 未黃熟香蕉 (<i>Musa</i> spp.) (14) 黑種草屬 (<i>Nigella</i> spp.) (15) 美洲白橡 (<i>Quercus alba</i>) (16) 假葉樹屬 (<i>Ruscus</i> spp.) (17) 雪梅屬 (<i>Symphoricarpus</i>)	(3) 亞塞拜然 (4) 白俄羅斯 (5) 賽普勒斯 (6) 喬治亞 (7) 以色列 (8) 約旦 (9) 哈薩克 (10) 吉爾吉斯 (11) 黎巴嫩 (12) 摩爾多瓦 (13) 俄羅斯聯邦 (14) 沙烏地阿拉伯 (15) 敘利亞 (16) 塔吉克 (17) 土耳其 (18) 土庫曼 (19) 烏克蘭 (20) 烏茲別克 非洲 (21) 非洲國家、地區 歐洲 (22) 阿爾巴尼亞 (23) 奧地利 (24) 比利時 (25) 波士尼亞赫塞哥維納 (26) 英國 (27) 克羅埃西亞 (28) 愛沙尼亞 (29) 法國 (30) 德國(下薩克森邦除外) (31) 希臘 (32) 匈牙利 (33) 愛爾蘭 (34) 義大利 (35) 拉脫維亞 (36) 立陶宛 (37) 馬爾他 (38) 荷蘭 (39) 葡萄牙		
--	---	--	--	--	--	--	--

spp.) (18)英蒨屬 (<i>Viburnum</i> spp.)	(40)瑞士 (41)南斯拉夫 (42)烏克蘭 (43)英國 北美 (44)百慕達（英屬） (45)夏威夷 中南美 (46)安地卡及巴布達 (47)阿根廷 (48)巴哈馬 (49)巴貝多 (50)玻利維亞 (51)巴西 (52)智利(第三區至第十區、第十四區、第十六區及都會區除外) (53)哥倫比亞 (54)哥斯大黎加 (55)古巴 (56)多米尼克 (57)多明尼加 (58)厄瓜多 (59)薩爾瓦多 (60)格瑞那達 (61)瓜地馬拉 (62)海地 (63)宏都拉斯 (64)牙買加 (65)墨西哥 (66)尼加拉瓜 (67)巴拿馬 (68)巴拉圭 (69)秘魯 (70)波多黎各 (71)聖克里斯多福 (72)聖露西亞 (73)聖文森及格瑞那達 (74)千里達及托巴哥		spp.) (18)英蒨屬 (<i>Viburnum</i> spp.)	(40)西班牙 (41)瑞士 (42)南斯拉夫 (43)斯洛維尼亞 北美 (44)百慕達（英屬） (45)夏威夷 中南美 (46)安地卡及巴布達 (47)阿根廷 (48)巴哈馬 (49)巴貝多 (50)玻利維亞 (51)巴西 (52)智利(第三區至第十區、第十四區、第十六區及都會區除外) (53)哥倫比亞 (54)哥斯大黎加 (55)古巴 (56)多米尼克 (57)多明尼加 (58)厄瓜多 (59)薩爾瓦多 (60)格瑞那達 (61)瓜地馬拉 (62)海地 (63)宏都拉斯 (64)牙買加 (65)墨西哥 (66)尼加拉瓜 (67)巴拿馬 (68)巴拉圭 (69)秘魯 (70)波多黎各 (71)聖克里斯多福 (72)聖露西亞 (73)聖文森及格瑞那達 (74)千里達及托巴哥		
---	--	--	---	---	--	--

	(75)烏拉圭 (76)委內瑞拉				(75)烏拉圭 (76)委內瑞拉		
植物名稱及其部位	國 家 或 地 區	禁 止 原 因 (病 蟲 害 名 稱)		植物名稱及其部位	國 家 或 地 區	禁 止 原 因 (病 蟲 害 名 稱)	
30. 下列植物生植株之全部或部分（花、果實、種子除外）： (1) 番椒（ <i>Capsicum annuum</i> ） (2) 番茄（ <i>Solanum lycopersicum</i> = <i>Lycopersicon esculentum</i> ） (3) 白英（ <i>Solanum lyratum</i> ） (4) 茄子（ <i>Solanum melongena</i> ） (5) 龍葵（ <i>Solanum nigrum</i> ） (6)馬鈴薯（ <i>Solanum tuberosum</i> ）	亞洲及太平洋地區 (1)亞美尼亞 (2)亞塞拜然 (3)白俄羅斯 (4)不丹 (5)喬治亞 (6)哈薩克 (7)印度 (8)吉爾吉斯 (9)中國大陸 (10)摩爾多瓦 (11)尼泊爾 (12)俄羅斯聯邦 (13)塔吉克 (14)土庫曼 (15)烏茲別克 非洲 (16) 史瓦帝尼 (17) 賴索托 (18) 南非 歐洲 (19)歐洲國家、地區（阿爾巴尼亞及希臘除外） 北美 (20)加拿大（新伯倫瑞克省及魁北克省除外，惟種用馬鈴薯不得輸入） 中南美 (21)玻利維亞 (22)智利 (23)厄瓜多 (24)福克蘭群島 (25)秘魯 (26)烏拉圭	馬鈴薯癌腫病 （ <i>Synchytrium endobioticum</i> （Schilf）Per.）		30. 下列植物生植株之全部或部分（花、果實、種子除外）： (1) 番椒（ <i>Capsicum annuum</i> ） (2) 番茄（ <i>Lycopersicon esculentum</i> ） (3) 白英（ <i>Solanum lyratum</i> ） (4) 茄子（ <i>Solanum melongena</i> ） (5) 龍葵（ <i>Solanum nigrum</i> ） (6)馬鈴薯（ <i>Solanum tuberosum</i> ）	亞洲及太平洋地區 (1)亞美尼亞 (2)亞塞拜然 (3)白俄羅斯 (4)不丹 (5)喬治亞 (6)哈薩克 (7)印度 (8)吉爾吉斯 (9)中國大陸 (10)摩爾多瓦 (11)尼泊爾 (12)俄羅斯聯邦 (13)塔吉克 (14)土庫曼 (15)烏克蘭 (16)烏茲別克 非洲 (17)賴索托 (18)南非 (19)史瓦濟蘭 歐洲 (20)歐洲國家、地區（阿爾巴尼亞及希臘除外） 北美 (21)加拿大（新伯倫瑞克省及魁北克省除外，惟種用馬鈴薯不得輸入） 中南美 (22)玻利維亞 (23)智利 (24)厄瓜多 (25)福克蘭群島 (26)秘魯 (27)烏拉圭	馬鈴薯癌腫病 （ <i>Synchytrium endobioticum</i> （Schilf）Per.）	一、經查我國外交部將烏克蘭歸列於歐洲地區，爰刪除原列於亞洲及太平洋地區之項目，將其歸列於歐洲國家、地區。另史瓦濟蘭業已改稱為史瓦帝尼，爰依英文國名字首，酌予調整史瓦帝尼排序，並遞移其他國家或地區排序。 二、另依現行科學文獻所載植物學名，增列番茄之同物異名。

植物名稱及其部位	國 家 或 地 區	禁 止 原 因 (病 蟲 害 名 稱)	植物名稱及其部位	國 家 或 地 區	禁 止 原 因 (病 蟲 害 名 稱)	
31. 下列植物生植株之全部或部分(葉、花、果實、種子、植物組織培養苗除外)： (1) 藜屬 (<i>Chenopodium</i> spp.) (2) 美人襟科 (Salpiglossidaceae) (3) 茄科(Solanaceae)	亞洲及太平洋地區 (1)亞美尼亞 (2)澳大利亞(維多利亞州及西澳大利亞州) (3)亞塞拜然 (4)白俄羅斯 (5)喬治亞 (6)印度 (7)印尼 (8)日本 (9)哈薩克 (10)吉爾吉斯 (11)黎巴嫩 (12)馬來西亞 (13)摩爾多瓦 (14)紐西蘭 (15)諾福克島 (16)阿曼 (17)巴基斯坦 (18)菲律賓 (19)俄羅斯聯邦 (20)斯里蘭卡 (21)塔吉克 (22)土庫曼 (23)土耳其 (24)烏茲別克 非洲 (25)阿爾及利亞 (26)埃及 (27)史瓦帝尼 (28)卡那利群島 (西班牙屬) (29)賴索托 (30)利比亞 (31)摩洛哥 (32)獅子山 (33)南非 (34)突尼西亞 (35)辛巴威 歐洲	黃金線蟲 (<i>Globodera rostochiensis</i> Wr.)	31. 下列植物生植株之全部或部分(葉、花、果實、種子、植物組織培養苗除外)： (1) 藜屬 (<i>Chenopodium</i> spp.) (2) 美人襟科 (Salpiglossidaceae) (3) 茄科(Solanaceae)	亞洲及太平洋地區 (1)亞美尼亞 (2)澳大利亞(維多利亞州及西澳大利亞州) (3)亞塞拜然 (4)白俄羅斯 (5)喬治亞 (6)印度 (7)印尼 (8)日本 (9)哈薩克 (10)吉爾吉斯 (11)黎巴嫩 (12)馬來西亞 (13)摩爾多瓦 (14)紐西蘭 (15)諾福克島 (16)阿曼 (17)巴基斯坦 (18)菲律賓 (19)俄羅斯聯邦 (20)斯里蘭卡 (21)塔吉克 (22)土庫曼 (23)土耳其 (24)烏克蘭 (25)烏茲別克 非洲 (26)阿爾及利亞 (27)埃及 (28)卡那利群島 (西班牙屬) (29)賴索托 (30)利比亞 (31)摩洛哥 (32)獅子山 (33)南非 (34)史瓦濟蘭 (35)突尼西亞 (36)辛巴威	黃金線蟲 (<i>Globodera rostochiensis</i> Wr.)	經查我國外交部將烏克蘭歸列於歐洲地區，爰刪除原列於亞洲及太平洋地區之項目，將其移列於歐洲。另史瓦濟蘭業已改稱為史瓦帝尼，爰依英文國名字首，酌予調整史瓦帝尼排序，並遞移其他國家或地區排序。

	(36)阿爾巴尼亞 (37)奧地利 (38)巴利亞利群島 (西班牙屬) (39)比利時 (40)波士尼亞赫塞哥 維納 (41)保加利亞 (42)克羅埃西亞 (43)海峽群島（英 屬） (44)賽普勒斯 (45)克利特島（希臘 屬） (46)捷克 (47)丹麥 (48)愛沙尼亞 (49)法羅群島(丹麥 屬自治區) (50)芬蘭 (51)法國 (52)德國 (53)希臘 (54)匈牙利 (55)冰島 (56)愛爾蘭 (57)義大利 (58)列支敦斯登 (59)拉脫維亞 (60)立陶宛 (61)盧森堡 (62)馬爾他 (63)蒙特內哥羅 (64)荷蘭 (65)挪威 (66)波蘭 (67)葡萄牙 (68)羅馬尼亞 (69)塞爾維亞 (70)斯洛維尼亞 (71)斯洛伐克 (72)西班牙			歐洲 (37)阿爾巴尼亞 (38)奧地利 (39)巴利亞利群島 (西班牙屬) (40)比利時 (41)波士尼亞赫塞哥 維納 (42)保加利亞 (43)克羅埃西亞 (44)海峽群島（英 屬） (45)賽普勒斯 (46)克利特島（希臘 屬） (47)捷克 (48)丹麥 (49)愛沙尼亞 (50)法羅群島(丹麥 屬自治區) (51)芬蘭 (52)法國 (53)德國 (54)希臘 (55)匈牙利 (56)冰島 (57)愛爾蘭 (58)義大利 (59)列支敦斯登 (60)拉脫維亞 (61)立陶宛 (62)盧森堡 (63)馬爾他 (64)蒙特內哥羅 (65)荷蘭 (66)挪威 (67)波蘭 (68)葡萄牙 (69)羅馬尼亞 (70)塞爾維亞 (71)斯洛伐克 (72)斯洛維尼亞
--	---	--	--	--

	(73)瑞典 (74)瑞士 (75)南斯拉夫 (76)烏克蘭 (77)英國 北美 (78)加拿大（新伯倫瑞克省及愛德華島省除外，惟種用馬鈴薯不得輸入） (79)墨西哥 (80)美國（阿拉斯加州、加利福尼亞州、科羅拉多州、愛達荷州、蒙大拿州、奧勒岡州及華盛頓州除外，惟種用馬鈴薯限自阿拉斯加州及蒙大拿州輸入） 中南美 (81)阿根廷 (82)玻利維亞 (83)巴西 (84)智利 (85)哥倫比亞 (86)哥斯大黎加 (87)厄瓜多 (88)巴拿馬 (89)秘魯 (90)委內瑞拉			(73)西班牙 (74)瑞典 (75)瑞士 (76)南斯拉夫 (77)英國 北美 (78)加拿大（新伯倫瑞克省及愛德華島省除外，惟種用馬鈴薯不得輸入） (79)墨西哥 (80)美國（阿拉斯加州、加利福尼亞州、科羅拉多州、愛達荷州、蒙大拿州、奧勒岡州及華盛頓州除外，惟種用馬鈴薯限自阿拉斯加州及蒙大拿州輸入） 中南美 (81)阿根廷 (82)玻利維亞 (83)巴西 (84)智利 (85)哥倫比亞 (86)哥斯大黎加 (87)厄瓜多 (88)巴拿馬 (89)秘魯 (90)委內瑞拉		
植物名稱及其部位	國 家 或 地 區	禁 止 原 因（病 蟲 害 名 稱）	植物名稱及其部位	國 家 或 地 區	禁 止 原 因（病 蟲 害 名 稱）	經查我國外交部將烏克蘭歸列於歐洲地區，爰刪除原列於亞洲及太平洋地區之項目，將其歸列於歐洲國家，另配合其他檢疫條件用詞修正為「歐洲國家、地區(荷蘭除外)」，並酌修遞移國家或地區排序。
32. 下列植物生植株之全部、部分（種子除外）： (1) 番椒（ <i>Capsicum annuum</i> ） (2) 菸草（ <i>Nicotiana tabacum</i> ） (3) 茄子（ <i>Solanum</i>	亞洲及太平洋地區 (1)亞美尼亞 (2)澳大利亞 (3)亞塞拜然 (4)白俄羅斯 (5)喬治亞 (6)伊朗	菸草露菌病 （ <i>Peronospora tabacina</i> Adam.）	32. 下列植物生植株之全部、部分（種子除外）： (1) 番椒（ <i>Capsicum annuum</i> ） (2) 菸草（ <i>Nicotiana tabacum</i> ） (3) 茄子（ <i>Solanum</i>	亞洲及太平洋地區 (1)亞美尼亞 (2)澳大利亞 (3)亞塞拜然 (4)白俄羅斯 (5)喬治亞 (6)伊朗	菸草露菌病 （ <i>Peronospora tabacina</i> Adam.）	

<i>melongena</i>)	(7)伊拉克 (8)以色列 (9)約旦 (10)哈薩克 (11)吉爾吉斯 (12)黎巴嫩 (13)摩爾多瓦 (14)緬甸 (15)巴勒斯坦 (16)俄羅斯聯邦 (17)敘利亞 (18)塔吉克 (19)土耳其 (20)土庫曼 (21)烏茲別克 (22)葉門共和國 非洲 (23)阿爾及利亞 (24)埃及 (25)利比亞 (26)摩洛哥 (27)留尼旺島(法屬) (28)突尼西亞 歐洲 (29)歐洲國家、地區 (荷蘭除外) 北美 (30)加拿大(卑詩省 除外) (31)美國 中南美 (32)安地卡及巴布達 (33)阿根廷 (34)巴哈馬 (35)巴貝多 (36)貝里斯 (37)巴西 (38)智利 (39)哥倫比亞 (40)哥斯大黎加 (41)古巴 (42)多米尼克			<i>melongena</i>)	(7)伊拉克 (8)以色列 (9)約旦 (10)哈薩克 (11)吉爾吉斯 (12)黎巴嫩 (13)摩爾多瓦 (14)緬甸 (15)巴勒斯坦 (16)俄羅斯聯邦 (17)敘利亞 (18)塔吉克 (19)土耳其 (20)土庫曼 (21)烏克蘭 (22)烏茲別克 (23)葉門共和國 非洲 (24)阿爾及利亞 (25)埃及 (26)利比亞 (27)摩洛哥 (28)留尼旺島(法屬) (29)突尼西亞 歐洲 (30)歐洲各個國家、 地區(荷蘭除外) 北美 (31)加拿大(卑詩省 除外) (32)美國 中南美 (33)安地卡及巴布達 (34)阿根廷 (35)巴哈馬 (36)巴貝多 (37)貝里斯 (38)巴西 (39)智利 (40)哥倫比亞 (41)哥斯大黎加 (42)古巴		
--------------------	--	--	--	--------------------	---	--	--

	(43)多明尼加 (44)薩爾瓦多 (45)格瑞那達 (46)瓜地馬拉 (47)海地 (48)宏都拉斯 (49)牙買加 (50)墨西哥 (51)尼加拉瓜 (52)巴拿馬 (53)波多黎各 (54)聖克里斯多福 (55)聖露西亞 (56)聖文森及格瑞那 丁 (57)千里達及托巴哥 (58)烏拉圭 (59)委內瑞拉			(43)多米尼克 (44)多明尼加 (45)薩爾瓦多 (46)格瑞那達 (47)瓜地馬拉 (48)海地 (49)宏都拉斯 (50)牙買加 (51)墨西哥 (52)尼加拉瓜 (53)巴拿馬 (54)波多黎各 (55)聖克里斯多福 (56)聖露西亞 (57)聖文森及格瑞那 丁 (58)千里達及托巴哥 (59)烏拉圭 (60)委內瑞拉		
植物名稱及其部位	國 家 或 地 區	禁 止 原 因 (病 蟲 害 名 稱)	植物名稱及其部位	國 家 或 地 區	禁 止 原 因 (病 蟲 害 名 稱)	經查我國外交部將烏克蘭歸列於歐洲地區，爰刪除原列於亞洲及太平洋地區之項目，將其移列於歐洲，並依英文國名字首，酌予調整賽普勒斯及捷克等國家排序，並遞移其他國家或地區排序。
50. 下列植物生植株之全部、部分(果實及種子除外)： (1) 唐棣屬 (<i>Amelanchier</i> spp.) (2) 山楸梅屬 (<i>Aronia</i> spp.) (3) 木瓜屬 (<i>Chaenomeles</i> spp.) (4) 車輪棠屬 (<i>Cotoneaster</i> spp.) (5) 薔薇科之一屬 (<i>Crataegomespilus</i> spp.) (6) 山楂屬 (<i>Crataegus</i> spp.) (7) 榲桲屬 (<i>Cydonia</i> spp.) (8) 牛筋條屬 (<i>Dichotomanthes</i> spp.) (9) 柊依屬	亞洲及太平洋地區 (1)亞美尼亞 (2)亞塞拜然 (3)白俄羅斯 (4)中國大陸 (山東省除外) (5)喬治亞 (6)印度 (7)以色列 (8)約旦 (9)哈薩克 (10)韓國 (11)吉爾吉斯 (12)黎巴嫩 (13)摩爾多瓦 (14)紐西蘭 (15)俄羅斯 (16)沙烏地阿拉伯 (17)塔吉克 (18)土耳其 (19)土庫曼	火傷病 (<i>Erwinia amylovora</i> (Burrill) Winslow <i>et al.</i>)	50. 下列植物生植株之全部、部分(果實及種子除外)： (1) 唐棣屬 (<i>Amelanchier</i> spp.) (2) 山楸梅屬 (<i>Aronia</i> spp.) (3) 木瓜屬 (<i>Chaenomeles</i> spp.) (4) 車輪棠屬 (<i>Cotoneaster</i> spp.) (5) 薔薇科之一屬 (<i>Crataegomespilus</i> spp.) (6) 山楂屬 (<i>Crataegus</i> spp.) (7) 榲桲屬 (<i>Cydonia</i> spp.) (8) 牛筋條屬 (<i>Dichotomanthes</i> spp.) (9) 柊依屬(<i>Docynia</i>	亞洲及太平洋地區 (1)亞美尼亞 (2)亞塞拜然 (3)白俄羅斯 (4)中國大陸 (山東省除外) (5)喬治亞 (6)印度 (7)以色列 (8)約旦 (9)哈薩克 (10)韓國 (11)吉爾吉斯 (12)黎巴嫩 (13)摩爾多瓦 (14)紐西蘭 (15)俄羅斯 (16)沙烏地阿拉伯 (17)塔吉克 (18)土耳其 (19)土庫曼	火傷病 (<i>Erwinia amylovora</i> (Burrill) Winslow <i>et al.</i>)	

(<i>Docynia</i> spp.) (10) 枇杷 (<i>Eriobotrya japonica</i>) (11) 蘋果屬 (<i>Malus</i> spp.) (12) 山楂子屬 (<i>Mespilus</i> spp.) (13) 小石積屬 (<i>Osteomeles</i> spp.) (14) 酸果木屬 (<i>Peraphyllum</i> spp.) (15) 石楠屬 (<i>Photinia</i> spp. 、 <i>Heteromeles</i> spp.) (16) 李屬 (<i>Prunus</i> spp.) (17) 火刺屬 (<i>Pyracantha</i> spp.) (18) 梨屬 (<i>Pyrus</i> spp.) (19) 車輪梅屬 (<i>Raphiolepis</i> spp.) (20) 懸鈎子屬 (<i>Rubus</i> spp.) (21) 花楸屬 (<i>Sorbus</i> spp.) (22) 繡線菊屬 (<i>Spiraea</i> spp.) (23) 紅果樹屬 (<i>Stranvaesia</i> spp.)	(20)烏茲別克 (21)越南 非洲 (22)埃及 歐洲 (23)阿爾巴尼亞 (24)奧地利 (25)比利時 (26)波士尼亞赫塞哥維納 (27)保加利亞 (28)克羅埃西亞 (29)賽普勒斯 (30)捷克 (31)丹麥 (32)愛沙尼亞 (33)法國 (34)德國 (35)希臘 (36)匈牙利 (37)愛爾蘭 (38)義大利 (39)拉脫維亞 (40)立陶宛 (41)盧森堡 (42)馬其頓 (43)荷蘭 (44)挪威 (45)波蘭 (46)羅馬尼亞 (47)塞爾維亞與蒙特內哥羅 (48)斯洛伐克 (49)西班牙 (50)瑞典 (51)瑞士 (52)烏克蘭 (53)英國 北美 (54)加拿大 (55)墨西哥 (56)美國			spp.) (10) 枇杷 (<i>Eriobotrya japonica</i>) (11) 蘋果屬 (<i>Malus</i> spp.) (12) 山楂子屬 (<i>Mespilus</i> spp.) (13) 小石積屬 (<i>Osteomeles</i> spp.) (14) 酸果木屬 (<i>Peraphyllum</i> spp.) (15) 石楠屬 (<i>Photinia</i> spp. 、 <i>Heteromeles</i> spp.) (16) 李屬 (<i>Prunus</i> spp.) (17) 火刺屬 (<i>Pyracantha</i> spp.) (18) 梨屬 (<i>Pyrus</i> spp.) (19) 車輪梅屬 (<i>Raphiolepis</i> spp.) (20) 懸鈎子屬 (<i>Rubus</i> spp.) (21) 花楸屬 (<i>Sorbus</i> spp.) (22) 繡線菊屬 (<i>Spiraea</i> spp.) (23) 紅果樹屬 (<i>Stranvaesia</i> spp.)	(20)烏克蘭 (21)烏茲別克 (22)越南 非洲 (23)埃及 歐洲 (24)阿爾巴尼亞 (25)奧地利 (26)比利時 (27)波士尼亞赫塞哥維納 (28)保加利亞 (29)克羅埃西亞 (30)捷克 (31)賽普勒斯 (32)丹麥 (33)愛沙尼亞 (34)法國 (35)德國 (36)希臘 (37)匈牙利 (38)愛爾蘭 (39)義大利 (40)拉脫維亞 (41)立陶宛 (42)盧森堡 (43)馬其頓 (44)荷蘭 (45)挪威 (46)波蘭 (47)羅馬尼亞 (48)塞爾維亞與蒙特內哥羅 (49)斯洛伐克 (50)西班牙 (51)瑞典 (52)瑞士 (53)英國 北美 (54)加拿大 (55)墨西哥 (56)美國		
---	--	--	--	---	--	--	--

	中南美 (57)百慕達(英屬) (58)巴西 (59)瓜地馬拉 (60)委內瑞拉				中南美 (57)百慕達(英屬) (58)巴西 (59)瓜地馬拉 (60)委內瑞拉			
乙、有條件輸入植物或植物產品之檢疫條件 依據：植物防疫檢疫法第十四條第一項第二款、第三款規定。 一、植物或植物產品之名稱及其部位、國家或地區及其輸入檢疫條件如下表：				乙、有條件輸入植物或植物產品之檢疫條件 依據：植物防疫檢疫法第十四條第一項第二款、第三款規定。 一、植物或植物產品之名稱及其部位、國家或地區及其輸入檢疫條件如下表：				經查我國外交部將賽普勒斯及烏克蘭歸列於歐洲地區，爰刪除原列於亞洲及太平洋地區之項目，將其歸列於歐洲國家、地區，並酌予遞移其他國家或地區排序。
植物名稱及其部位	國家或地區	病蟲害名稱	檢疫條件	植物名稱及其部位	國家或地區	病蟲害名稱	檢疫條件	
1. 下列植物之鮮果實： (1) 榲桲 (Cydonia oblonga) (2) 胡桃果 (Juglans regia) (3) 蘋果屬 (Malus spp.) (4) 杏 (Prunus armeniaca) (5) 櫻桃 (Prunus avium) (6) 歐洲李 (Prunus domestica) (7) 杏仁 (Prunus dulcis) (8) 油桃 (Prunus persica var. nucipersica) (9) 桃 (Prunus persica var. persica) (10) 日本李 (Prunus salicina) (11) 石榴 (Punica granatum) (12) 梨屬 (Pyrus spp.)	亞洲及太平洋地區 (1)阿富汗 (2)亞美尼亞 (3)澳大利亞 (4)亞塞拜然 (5)白俄羅斯 (6)喬治亞 (7)印度 (8)伊朗 (9)伊拉克 (10)以色列 (11)約旦 (12)哈薩克 (13)吉爾吉斯 (14)黎巴嫩 (15)中國大陸 (16)摩爾多瓦 (17)緬甸 (18)紐西蘭 (19)巴基斯坦 (20)俄羅斯聯邦 (21)沙烏地阿拉伯 (22)敘利亞 (23)塔吉克 (24)土耳其 (25)土庫曼 (26)烏茲別克 非洲 (27)非洲國家、地區	蘋果蠹蛾 (Cydia pomonella L.)	1.蘋果應依下列規定辦理輸入： (1)紐西蘭產蘋果依紐西蘭產蘋果輸入檢疫條件辦理輸入。 (2)智利產蘋果依智利產蘋果輸入檢疫條件辦理輸入。 (3)法國產蘋果依法國產蘋果輸入檢疫條件辦理輸入。 (4) 澳大利亞產蘋果依澳大利亞產蘋果鮮果實輸入檢疫條件辦理輸入。 (5)美國產蘋果依美國產蘋果鮮果實輸入檢疫條件辦理輸入。 (6)德國產蘋果依德國產蘋果輸入檢疫條件辦理輸入。 (7)波蘭產蘋果依波蘭產蘋果輸入檢疫條件辦理輸入。	1. 下列植物之鮮果實： (1) 榲桲 (Cydonia oblonga) (2) 胡桃果 (Juglans regia) (3) 蘋果屬 (Malus spp.) (4) 杏 (Prunus armeniaca) (5) 櫻桃 (Prunus avium) (6) 歐洲李 (Prunus domestica) (7) 杏仁 (Prunus dulcis) (8) 油桃 (Prunus persica var. nucipersica) (9) 桃 (Prunus persica var. persica) (10) 日本李 (Prunus salicina) (11) 石榴 (Punica granatum) (12) 梨屬 (Pyrus spp.)	亞洲及太平洋地區 (1)阿富汗 (2)亞美尼亞 (3)澳大利亞 (4)亞塞拜然 (5)白俄羅斯 (6)賽普勒斯 (7)喬治亞 (8)印度 (9)伊朗 (10)伊拉克 (11)以色列 (12)約旦 (13)哈薩克 (14)吉爾吉斯 (15)黎巴嫩 (16)中國大陸 (17)摩爾多瓦 (18)緬甸 (19)紐西蘭 (20)巴基斯坦 (21)俄羅斯聯邦 (22)沙烏地阿拉伯 (23)敘利亞 (24)塔吉克 (25)土耳其 (26)土庫曼 (27)烏克蘭 (28)烏茲別克 非洲	蘋果蠹蛾 (Cydia pomonella L.)	1.蘋果應依下列規定辦理輸入： (1)紐西蘭產蘋果依紐西蘭產蘋果輸入檢疫條件辦理輸入。 (2)智利產蘋果依智利產蘋果輸入檢疫條件辦理輸入。 (3)法國產蘋果依法國產蘋果輸入檢疫條件辦理輸入。 (4) 澳大利亞產蘋果依澳大利亞產蘋果鮮果實輸入檢疫條件辦理輸入。 (5)美國產蘋果依美國產蘋果鮮果實輸入檢疫條件辦理輸入。 (6)德國產蘋果依德國產蘋果輸入檢疫條件辦理輸入。 (7)波蘭產蘋果依波蘭產蘋果輸入檢疫條件辦理輸入。	

			(8)義大利產蘋果 依義大利產蘋果輸入檢疫條件辦理輸入。 (9)加拿大產蘋果 依加拿大產蘋果鮮果實輸入檢疫條件辦理輸入。 (10)其他國家產蘋果依蘋果蠹蛾發生國家或地區蘋果輸入檢疫條件辦理輸入。 2.本項所定鮮果實除蘋果外,應檢附輸出國植物檢疫機關(構)簽發之植物檢疫證明書,證明經檢疫未染蘋果蠹蛾或於輸出前經適當之檢疫處理。		(29)非洲國家、地區 歐洲 (30)歐洲國家、地區 北美 (31)加拿大 (32)美國(夏威夷除外) 中南美 (33)阿根廷 (34)玻利維亞 (35)巴西 (36)智利 (37)哥倫比亞 (38)秘魯 (39)烏拉圭		(8)義大利產蘋果 依義大利產蘋果輸入檢疫條件辦理輸入。 (9)加拿大產蘋果 依加拿大產蘋果鮮果實輸入檢疫條件辦理輸入。 (10)其他國家產蘋果依蘋果蠹蛾發生國家或地區蘋果輸入檢疫條件辦理輸入。 2.本項所定鮮果實除蘋果外,應檢附輸出國植物檢疫機關(構)簽發之植物檢疫證明書,證明經檢疫未染蘋果蠹蛾或於輸出前經適當之檢疫處理。	
植物名稱及其部位	國家或地區	病蟲害名稱	檢疫條件	植物名稱及其部位	國家或地區	病蟲害名稱	檢疫條件	經查我國外交部將烏克蘭歸列於歐洲地區,爰刪除原列於亞洲及太平洋地區之項目,將其移列於歐洲,並酌予遞移其他國家或地區排序。
8. 茄科 (Solanaceae) 生植株之莖、葉	亞洲及太平洋地區 (1)亞美尼亞 (2)亞塞拜然 (3)白俄羅斯 (4)中國大陸 (5)喬治亞 (6)伊朗 (7)伊拉克 (8)哈薩克 (9)吉爾吉斯 (10)摩爾多瓦 (11)俄羅斯 (12)塔吉克 (13)土耳其 (14)土庫曼	柯羅拉多金花蟲 (<i>Leptinotarsa decemlineata</i> Say)	應檢附輸出國植物檢疫機關(構)簽發之植物檢疫證明書,證明經檢疫未染本害蟲或在輸出前先經適當之檢疫處理。	8. 茄科 (Solanaceae) 生植株之莖、葉	亞洲及太平洋地區 (1)亞美尼亞 (2)亞塞拜然 (3)白俄羅斯 (4)中國大陸 (5)喬治亞 (6)伊朗 (7)伊拉克 (8)哈薩克 (9)吉爾吉斯 (10)摩爾多瓦 (11)俄羅斯 (12)塔吉克 (13)土耳其 (14)土庫曼	柯羅拉多金花蟲 (<i>Leptinotarsa decemlineata</i> Say)	應檢附輸出國植物檢疫機關(構)簽發之植物檢疫證明書,證明經檢疫未染本害蟲或在輸出前先經適當之檢疫處理。	

	(15)烏茲別克 歐洲 (16)阿爾巴尼亞 (17)安道爾 (18)奧地利 (19)比利時 (20)波士尼亞赫塞哥維納 (21)保加利亞 (22)克羅埃西亞 (23)捷克 (24)丹麥 (25)愛沙尼亞 (26)法國 (27)德國 (28)希臘 (39)匈牙利 (30)義大利 (31)拉脫維亞 (32)立陶宛 (33)盧森堡 (34)馬其頓 (35)蒙特內哥羅 (36)荷蘭 (37)波蘭 (38)葡萄牙 (39)羅馬尼亞 (40)塞爾維亞 (41)斯洛伐克 (42)斯洛維尼亞 (43)西班牙 (44)瑞士 (45)烏克蘭 (46)英國 北美 (47)加拿大 (48)墨西哥 (49)美國 中南美 (50)古巴 (51)瓜地馬拉				(15)烏克蘭 (16)烏茲別克 歐洲 (17)阿爾巴尼亞 (18)安道爾 (19)奧地利 (20)比利時 (21)波士尼亞赫塞哥維納 (22)保加利亞 (23)克羅埃西亞 (24)捷克 (25)丹麥 (26)愛沙尼亞 (27)法國 (28)德國 (29)希臘 (30)匈牙利 (31)義大利 (32)拉脫維亞 (33)立陶宛 (34)盧森堡 (35)馬其頓 (36)蒙特內哥羅 (37)荷蘭 (38)波蘭 (39)葡萄牙 (40)羅馬尼亞 (41)塞爾維亞 (42)斯洛伐克 (43)斯洛維尼亞 (44)西班牙 (45)瑞士 (46)英國 北美 (47)加拿大 (48)墨西哥 (49)美國 中南美 (50)古巴 (51)瓜地馬拉			
--	--	--	--	--	--	--	--	--

植物名稱及其部位	國家或地區	病蟲害名稱	檢疫條件	植物名稱及其部位	國家或地區	病蟲害名稱	檢疫條件	經查我國外交部將烏克蘭歸列於歐洲地區，爰刪除原列於亞洲及太平洋地區之項目，將其歸列於歐洲國家、地區，並酌予遞移其他國家或地區排序。
11.下列植物生植株之全部、部分(種子除外)： (1) 榲桲 (<i>Cydonia oblonga</i>) (2) 蘋果屬 (<i>Malus</i> spp.) (3) 李屬 (<i>Prunus</i> spp.) (4) 梨屬 (<i>Pyrus</i> spp.)	亞洲及太平洋地區 (1)亞美尼亞 (2)亞塞拜然 (3)白俄羅斯 (4)中國大陸 (5)喬治亞 (6)印度 (7)伊朗 (8)伊拉克 (9)以色列 (10)哈薩克 (11)吉爾吉斯 (12)黎巴嫩 (13)摩爾多瓦 (14)緬甸 (15)巴基斯坦 (16)俄羅斯 (17)敘利亞 (18)塔吉克 (19)土耳其 (20)土庫曼 (21)烏茲別克 非洲 (22) 阿爾及利亞 (23) 埃及 (24) 利比亞 (25) 摩洛哥 (26) 突尼西亞 歐洲 (27) 歐洲國家、地區 北美 (28) 加拿大 (29) 美國	桃蚜蛾 (<i>Anarsia lineatella</i> Zeller)	應檢附輸出國植物檢疫機關(構)簽發之植物檢疫證明書，證明未染本害蟲或在輸出前先經適當之檢疫處理。	11.下列植物生植株之全部、部分(種子除外)： (1) 榲桲 (<i>Cydonia oblonga</i>) (2) 蘋果屬 (<i>Malus</i> spp.) (3) 李屬 (<i>Prunus</i> spp.) (4) 梨屬 (<i>Pyrus</i> spp.)	亞洲及太平洋地區 (1)亞美尼亞 (2)亞塞拜然 (3)白俄羅斯 (4)中國大陸 (5)喬治亞 (6)印度 (7)伊朗 (8)伊拉克 (9)以色列 (10)哈薩克 (11)吉爾吉斯 (12)黎巴嫩 (13)摩爾多瓦 (14)緬甸 (15)巴基斯坦 (16)俄羅斯 (17)敘利亞 (18)塔吉克 (19)土耳其 (20)土庫曼 (21)烏克蘭 (22)烏茲別克 非洲 (23)阿爾及利亞 (24)埃及 (25)利比亞 (26)摩洛哥 (27)突尼西亞 歐洲 (28)歐洲國家、地區 北美 (29)加拿大 (30)美國	桃蚜蛾 (<i>Anarsia lineatella</i> Zeller)	應檢附輸出國植物檢疫機關(構)簽發之植物檢疫證明書，證明未染本害蟲或在輸出前先經適當之檢疫處理。	
植物名稱及其部位	國家或地區	病蟲害名稱	檢疫條件	植物名稱及其部位	國家或地區	病蟲害名稱	檢疫條件	一、依據 CABI、EPPO 及最新疫情資料等相關文獻，新增越南、亞美尼亞、亞塞拜然、白俄羅斯、伊朗、緬甸、新喀里多尼亞、菲律賓、卡達、阿爾
14.下列植物生植株之全部、部分(種子及地下部除外)	亞洲及太平洋地區 (1)亞美尼亞	西方花薊馬 (<i>Frankliniella occidentalis</i> Pergande))	1.應檢附輸出國植物檢疫機關(構)簽發之植物檢疫證	14.下列植物生植株之全部、部分(種子及地下部除外)	亞洲及太平洋地區 (1) 澳大利亞	西方花薊馬 (<i>Frankliniella occidentalis</i> Pergande))	1.應檢附輸出國植物檢疫機關(構)簽發之植物檢疫證	

(1) 七葉樹屬(<i>Aesculus</i> spp.) (2) 蔥屬(<i>Allium</i> spp.) (3) 赤楊屬(<i>Alnus</i> spp.) (4) 孤挺花屬(<i>Amaryllis</i> spp. = <i>Hippeastrum</i> spp.) (5) 百合水仙屬(<i>Alstroemeria</i> spp.) (6) 蜀葵屬(<i>Althaea</i> spp.) (7) 莧屬(<i>Amaranthus</i> spp.) (8) 琉璃繁縷(<i>Anagallis arvensis</i>) (9) 火鶴花屬(<i>Anthurium</i> spp.) (10) 金魚草(<i>Antirrhinum majus</i>) (11) 馬利筋屬(<i>Asclepias</i> spp.) (12) 蘆筍(<i>Asparagus officinalis</i>) (13) 秋海棠屬(<i>Begonia</i> spp.) (14) 布魯尼亞科之一屬(<i>Berzelia</i> spp.) (15) 九重葛(<i>Bougainvillea spectabilis</i>) (16) 寒丁子屬(<i>Bouvardia</i> spp.) (17) 十字花科(<i>Brassicaceae</i>) (18) 布魯尼亞屬之一種(<i>Brunia laevis</i>) (19) 荷包花屬(<i>Calceolaria</i> spp.) (20) 歐石楠(<i>Calluna</i>	(2)澳大利亞 (3)亞塞拜然 (4)白俄羅斯 (5)中國大陸 (6)喬治亞 (7)印度 (8)印尼 (9)伊朗 (10)以色列 (11)日本 (12)北韓 (13)南韓 (14)科威特 (15)黎巴嫩 (16)馬來西亞 (17)緬甸 (18)新喀里多尼亞 (19)紐西蘭 (20)菲律賓 (21)卡達 (22)俄羅斯 (23)斯里蘭卡 (24)泰國 (25)土耳其 (26)越南 非洲 (27)阿爾及利亞 (28)布吉納法索 (29)卡那利群島(西班牙屬) (30)埃及 (31)史瓦帝尼 (32)肯亞 (33)賴索托 (34)摩洛哥 (35)留尼旺島(法屬) (36)南非 (37)突尼西亞 (38)烏干達		明書，證明經檢疫未染西方花薊馬或在輸出前先經適當之檢疫處理。 2. 波蘭產藍莓依波蘭產藍莓鮮果實輸入檢疫條件辦理輸入。	(1) 七葉樹屬(<i>Aesculus</i> spp.) (2) 蔥屬(<i>Allium</i> spp.) (3) 赤楊屬(<i>Alnus</i> spp.) (4) 孤挺花屬(<i>Amaryllis</i> spp. = <i>Hippeastrum</i> spp.) (5) 百合水仙屬(<i>Alstroemeria</i> spp.) (6) 蜀葵屬(<i>Althaea</i> spp.) (7) 莧屬(<i>Amaranthus</i> spp.) (8) 琉璃繁縷(<i>Anagallis arvensis</i>) (9) 火鶴花屬(<i>Anthurium</i> spp.) (10) 金魚草(<i>Antirrhinum majus</i>) (11) 馬利筋屬(<i>Asclepias</i> spp.) (12) 蘆筍(<i>Asparagus officinalis</i>) (13) 秋海棠屬(<i>Begonia</i> spp.) (14) 布魯尼亞科之一屬(<i>Berzelia</i> spp.) (15) 九重葛(<i>Bougainvillea spectabilis</i>) (16) 寒丁子屬(<i>Bouvardia</i> spp.) (17) 十字花科(<i>Brassicaceae</i>) (18) 布魯尼亞屬之一種(<i>Brunia laevis</i>) (19) 荷包花屬(<i>Calceolaria</i> spp.) (20) 歐石楠(<i>Calluna</i>	(2) 中國大陸 (3) 喬治亞 (4) 印度 (5) 印尼 (6) 以色列 (7) 日本 (8) 北韓 (9) 南韓 (10) 科威特 (11) 馬來西亞 (12) 紐西蘭 (13) 俄羅斯 (14) 黎巴嫩 (15) 斯里蘭卡 (16) 泰國 (17) 土耳其 非洲 (18) 卡那利群島(西班牙屬) (19) 肯亞 (20) 賴索托 (21) 留尼旺島(法屬) (22) 南非 (23) 史瓦濟蘭 (24) 辛巴威 歐洲 (25) 歐洲國家、地區 北美 (26) 加拿大 (27) 墨西哥 (28) 美國 中南美 (29) 阿根廷 (30) 巴西 (31) 智利 (32) 多明尼加 (33) 厄瓜多 (34) 瓜地馬拉 (35) 哥倫比亞		明書，證明經檢疫未染西方花薊馬或在輸出前先經適當之檢疫處理。 2. 波蘭產藍莓依波蘭產藍莓鮮果實輸入檢疫條件辦理輸入。	及利亞、布吉納法索、埃及、摩洛哥、突尼西亞、烏干達、宏都拉斯及巴拿馬等國為西方花薊馬疫區。另史瓦濟蘭業已改稱為史瓦帝尼，爰依英文國名字首，酌予調整黎巴嫩及史瓦帝尼等國家排序，並遞移其他國家或地區排序。 二、另酌修部分植物學名或其格式。
--	--	--	--	--	--	--	--	--

<i>vulgaris</i>=<i>Erica vulgaris</i>) (21) 牛角瓜屬之一種 (<i>Calotropis gigantea</i>) (22) 長山核桃(<i>Carya illinoensis</i>) (23) 南蛇藤屬 (<i>Celastrus</i> spp.) (24) 青葙屬(<i>Celosia</i> spp.) (25) 球序卷耳 (<i>Cerastium glomeratum</i>) (26) 風蠟花屬 (<i>Chamelaucium</i> spp.) (27) 藜科 (<i>Chenopodiaceae</i>) (28) 柑桔屬 (<i>Citrus</i> spp.) (29) 鐵線蓮屬 (<i>Clematis</i> spp.) (30) 變葉木屬 (<i>Codiaeum</i> spp.) (31) 菊科(<i>Compositae</i> = <i>Asteraceae</i>) (32) 葫蘆科 (<i>Cucurbitaceae</i>) (33) 仙客來屬 (<i>Cyclamen</i> spp.) (34) 石竹屬(<i>Dianthus</i> spp.) (35) 升馬唐(<i>Digitaria ciliaris</i>) (36) 柿(<i>Diospyros kaki</i>) (37) 稗草(<i>Echinochloa crusgalli</i>) (38) 藍薊(<i>Echium plantagineum</i>) (39) 獨尾草屬	(39)辛巴威 歐洲 (40)歐洲國家、地區 北美 (41)加拿大 (42)墨西哥 (43)美國 中南美 (44)阿根廷 (45)巴西 (46)智利 (47)哥倫比亞 (48)哥斯大黎加 (49)多明尼加 (50)厄瓜多 (51)法屬圭亞納 (52)瓜地馬拉 (53)蓋亞納 (54)宏都拉斯 (55)馬丁尼克島 (法屬) (56)巴拿馬 (57)秘魯 (58)波多黎各 (59)烏拉圭 (60)委內瑞拉			<i>vulgaris</i>=<i>Erica vulgaris</i>) (21) 牛角瓜屬之一種 (<i>Calotropis gigantea</i>) (22) 長山核桃(<i>Carya illinoensis</i>) (23) 南蛇藤屬 (<i>Celastrus</i> spp.) (24) 青葙屬(<i>Celosia</i> spp.) (25) 球序卷耳 (<i>Cerastium glomeratum</i>) (26) 風蠟花屬 (<i>Chamelaucium</i> spp.) (27) 藜科 (<i>Chenopodiaceae</i>) (28) 柑桔屬 (<i>Citrus</i> spp.) (29) 鐵線蓮屬 (<i>Clematis</i> spp.) (30) 變葉木屬 (<i>Codiaeum</i> spp.) (31) 菊科(<i>Compositae</i> = <i>Asteraceae</i>) (32) 葫蘆科 (<i>Cucurbitaceae</i>) (33) 仙客來屬 (<i>Cyclamen</i> spp.) (34) 石竹屬(<i>Dianthus</i> spp.) (35) 升馬唐(<i>Digitaria ciliaris</i>) (36) 柿(<i>Diospyros kaki</i>) (37) 稗草(<i>Echinochloa crusgalli</i>) (38) 藍薊(<i>Echium plantagineum</i>) (39) 獨尾草屬	(36)哥斯大黎加 (37)法屬圭亞納 (38)蓋亞納 (39)馬丁尼克島 (法屬) (40)秘魯 (41)波多黎各 (42)烏拉圭 (43)委內瑞拉			
--	---	--	--	--	---	--	--	--

(<i>Eremurus</i> spp.) (40) 花菱草 (<i>Eschscholzia californica</i>) (41) 大戟屬 (<i>Euphorbia</i> spp.) (42) 洋桔梗屬 (<i>Eustoma</i> spp. = <i>Lisianthus</i> spp.) (43) 榕屬(<i>Ficus</i> spp.) (44) 小蒼蘭屬(<i>Freesia</i> spp.) (45) 吊金鐘屬(<i>Fuchsia</i> spp.) (46) 龍膽屬(<i>Gentiana</i> spp.) (47) 牻牛兒苗屬 (<i>Geranium</i> spp.) (48) 苦苣苔科 (<i>Gesneriaceae</i>) (49) 唐菖蒲屬 (<i>Gladiolus</i> spp.) (50) 棉屬(<i>Gossypium</i> spp.) (51) 霞草屬 (<i>Gypsophila</i> spp.) (52) 天芥菜 (<i>Heliotropium europaeum</i>) (53) 萱草屬 (<i>Hemerocallis</i> spp.) (54) 木槿屬(<i>Hibiscus</i> spp.) (55) 大麥屬(<i>Hordeum</i> spp.) (56) 繡球花屬 (<i>Hydrangea</i> spp.) (57) 金絲桃屬 (<i>Hypericum</i> spp.) (58) 鳳仙花屬 (<i>Impatiens</i> spp.)					(<i>Eremurus</i> spp.) (40) 花菱草 (<i>Eschscholzia californica</i>) (41) 大戟屬(<i>Euphorbia</i> spp.) (42) 洋桔梗屬 <i>Eustoma</i> spp. = <i>Lisianthus</i> spp.) (43) 榕屬(<i>Ficus</i> spp.) (44) 小蒼蘭屬(<i>Freesia</i> spp.) (45) 吊金鐘屬(<i>Fuchsia</i> spp.) (46) 龍膽屬(<i>Gentiana</i> spp.) (47) 牻牛兒苗屬 (<i>Geranium</i> spp.) (48) 苦苣苔科 (<i>Gesneriaceae</i>) (49) 唐菖蒲屬 (<i>Gladiolus</i> spp.) (50) 棉屬(<i>Gossypium</i> spp.) (51) 霞草(<i>Gypsophila</i> spp.) (52) 天芥菜 (<i>Heliotropium europaeum</i>) (53) 萱草屬 (<i>Hemerocallis</i> spp.) (54) 木槿屬(<i>Hibiscus</i> spp.) (55) 大麥屬(<i>Hordeum</i> spp.) (56) 繡球花屬 (<i>Hydrangea</i> spp.) (57) 金絲桃屬 (<i>Hypericum</i> spp.) (58) 鳳仙花屬 (<i>Impatiens</i> spp.)				
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(59) 牽牛花屬(<i>Ipomoea</i> spp.) (60) 鳶尾屬(<i>Iris</i> spp.) (61) 茉莉花(<i>Jasminum sambac</i>) (62) 厚葉屬(<i>Kalanchoe</i> spp.) (63) 唇形花科 (Labiatae) (64) 馬 <u>纓</u> 丹屬(<i>Lantana</i> spp.) (65) 月桂樹屬(<i>Laurus</i> spp.) (66) 豆科 (Leguminosae =Fabaceae) (67) 薄子屬 (<i>Leptospermum</i> spp.) (68) 黎可斯帕屬 (<i>Leucospermum</i> spp.) (69) 百合屬(<i>Lilium</i> spp.) (70) 補血草屬 (<i>Limonium</i> spp.) (71) 北極林耐花 (<i>Linnaea borealis</i>) (72) 錦葵屬(<i>Malva</i> spp.) (73) 欖果(<i>Mangifera indica</i>) (74) 光葉粟米草 (<i>Mollugo verticillata</i>) (75) 月見草屬 (<i>Oenothera</i> spp.) (76) 蘭科(Orchidaceae) (77) 天鵝絨屬 (<i>Ornithogalum</i> spp.)				(59) 牽牛花屬(<i>Ipomoea</i> spp.) (60) 鳶尾屬(<i>Iris</i> spp.) (61) 茉莉花(<i>Jasminum sambac</i>) (62) 厚葉屬(<i>Kalanchoe</i> spp.) (63) 唇形花科 (Labiatae) (64) 馬 <u>櫻</u> 丹屬(<i>Lantana</i> spp.) (65) 月桂樹屬(<i>Laurus</i> spp.) (66) 豆科 (Leguminosae =Fabaceae) (67) 薄子屬 (<i>Leptospermum</i> spp.) (68) 黎可斯帕屬 (<i>Leucospermum</i> spp.) (69) 百合屬(<i>Lilium</i> spp.) (70) 補血草屬 (<i>Limonium</i> spp.) (71) 北極林耐花 (<i>Linnaea borealis</i>) (72) 錦葵屬(<i>Malva</i> spp.) (73) 欖果(<i>Mangifera indica</i>) (74) 光葉粟米草 (<i>Mollugo verticillata</i>) (75) 月見草屬 (<i>Oenothera</i> spp.) (76) 蘭科(Orchidaceae) (77) 天鵝絨屬 (<i>Ornithogalum</i> spp.)				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

(78) 酢漿草屬(<i>Oxalis</i> spp.)				(78) 酢漿草屬(<i>Oxalis</i> spp.)				
(79) 芍藥屬(<i>Paeonia</i> spp.)				(79) 芍藥屬(<i>Paeonia</i> spp.)				
(80) 虞美人(<i>Papaver rhoeas</i>)				(80) 虞美人(<i>Papaver rhoeas</i>)				
(81) 天竺葵屬(<i>Pelargonium</i> spp.)				(81) 天竺葵屬(<i>Pelargonium</i> spp.)				
(82) 酪梨屬(<i>Persea</i> spp.)				(82) 酪梨屬(<i>Persea</i> spp.)				
(83) 阿月渾子(<i>Pistacia vera</i>)				(83) 阿月渾子(<i>Pistacia vera</i>)				
(84) 晚香玉屬(<i>Polianthes</i> spp.)				(84) 晚香玉屬(<i>Polianthes</i> spp.)				
(85) 松葉牡丹(<i>Portulaca grandiflora</i>)				(85) 松葉牡丹(<i>Portulaca grandiflora</i>)				
(86) 櫻草屬(<i>Primula</i> spp.)				(86) 櫻草屬(<i>Primula</i> spp.)				
(87) 帝王花屬(<i>Protea</i> spp.)				(87) 帝王花屬(<i>Protea</i> spp.)				
(88) 石榴(<i>Punica granatum</i>)				(88) 石榴(<i>Punica granatum</i>)				
(89) 櫟屬(<i>Quercus</i> spp.)				(89) 櫟屬(<i>Quercus</i> spp.)				
(90) 菜豆樹屬(<i>Radermachera</i> spp.)				(90) 菜豆樹屬(<i>Radermachera</i> spp.)				
(91) 毛茛屬(<i>Ranunculus</i> spp.)				(91) 毛茛屬(<i>Ranunculus</i> spp.)				
(92) 杜鵑花屬(<i>Rhododendron</i> spp.)				(92) 杜鵑花屬(<i>Rhododendron</i> spp.)				
(93) 漆樹屬(<i>Rhus</i> spp.)				(93) 漆樹屬(<i>Rhus</i> spp.)				
(94) 薔薇科(<i>Rosaceae</i>)				(94) 薔薇科(<i>Rosaceae</i>)				
(95) 假葉樹屬(<i>Ruscus</i> spp.)				(95) 假葉樹屬(<i>Ruscus</i> spp.)				
(96) 柳屬(<i>Salix</i> spp.)				(96) 柳屬(<i>Salix</i> spp.)				
(97) 宮燈百合(<i>Sandersonia aurantiaca</i>)				(97) 宮燈百合(<i>Sandersonia aurantiaca</i>)				

(98) 蟹爪蘭屬 (<i>Schlumbergera</i> spp.)				(98) 蟹爪蘭屬 (<i>Schlumbergera</i> spp.)				
(99) 裸麥(<i>Secale cereale</i>)				(99) 裸麥(<i>Secale cereale</i>)				
(100) 六月雪(<i>Serissa foetida</i> = <i>Serissa japonica</i>)				(100) 六月雪 (<i>Serissa foetida</i> = <i>Serissa japonica</i>)				
(101) 狗尾草(<i>Setaria viridis</i>)				(101) 狗尾草(<i>Setaria viridis</i>)				
(102) 布法羅莓 (<i>Shepherdia canadensis</i>)				(102) 布法羅莓 (<i>Shepherdia canadensis</i>)				
(103) 茄科(<i>Solanaceae</i>)				(103) 茄科(<i>Solanaceae</i>)				
(104) 繁縷屬(<i>Stellaria spp.</i>)				(104) 繁縷屬(<i>Stellaria spp.</i>)				
(105) 蒲桃(<i>Syzygium jambos</i> = <i>Eugenia jambos</i>)				(105) 蒲桃(<i>Syzygium jambos</i> = <i>Eugenia jambos</i>)				
(106) 雪花屬 (<i>Thryptomene</i> spp.)				(106) 雪花屬 (<i>Thryptomene</i> spp.)				
(107) 綿毛木屬 (<i>Tibouchina</i> spp.)				(107) 綿毛木屬 (<i>Tibouchina</i> spp.)				
(108) 鐘草屬 (<i>Trachelium</i> spp.)				(108) 鐘草屬 (<i>Trachelium</i> spp.)				
(109) 蒺藜(<i>Tribulus terrestris</i>)				(109) 蒺藜(<i>Tribulus terrestris</i>)				
(110) 小麥(<i>Triticum aestivum</i>)				(110) 小麥(<i>Triticum aestivum</i>)				
(111) 金蓮花 (<i>Tropaeolum majus</i>)				(111) 金蓮花 (<i>Tropaeolum majus</i>)				
(112) 繖形花科 (<i>Umbelliferae</i>)				(112) 繖形花科 (<i>Umbelliferae</i>)				
(113) 越桔屬 (<i>Vaccinium</i> spp.)				(113) 越桔屬 (<i>Vaccinium</i> spp.)				
(114) 馬鞭草屬 (<i>Verbena</i> spp.)				(114) 馬鞭草屬 (<i>Verbena</i> spp.)				
(115) 婆婆納屬 (<i>Veronica</i> spp.)				(115) 婆婆納屬 (<i>Veronica</i> spp.)				
(116) 英薔屬(<i>Viburnum spp.</i>)				(116) 英薔屬(<i>Viburnum spp.</i>)				

(117) 三色堇(<i>Viola tricolor</i>) (118) 葡萄屬(<i>Vitis</i> spp.) (119) 絲蘭屬(<i>Yucca</i> spp.) (120) 馬蹄蓮屬(<i>Zantedeschia</i> spp.) (121) 玉米(<i>Zea mays</i>)				(117) 三色堇(<i>Viola tricolor</i>) (118) 葡萄屬(<i>Vitis</i> spp.) (119) 絲蘭屬(<i>Yucca</i> spp.) (120)馬蹄蓮屬(<i>Zantedeschia</i> spp.) (121) 玉米(<i>Zea mays</i>)				
植物名稱及其部位	國 家 或 地 區	病 蟲 害 名 稱	檢 疫 條 件	植物名稱及其部位	國 家 或 地 區	病 蟲 害 名 稱	檢 疫 條 件	經查我國外交部將烏克蘭歸列於歐洲地區，爰刪除原列於亞洲及太平洋地區之項目，將其歸列於歐洲國家、地區。另史瓦濟蘭業已改稱為史瓦帝尼，爰依英文國名字首，酌予調整史瓦帝尼排序，並遞移其他國家或地區排序。
19.植物名稱及其部位： I. 除下列植物外，其他植物生植株之根、莖、葉、花及草莓果實之輸入，應符合本項檢疫條件： (1) 番杏科(Aizoaceae; <i>Mollugo</i> spp.除外) (2) 天南星科(Araceae) (3) 鳳仙花科(Balsaminaceae) (4) 木棉科(Bombacaceae) (5) 苔蘚植物(Bryophyta) (6) 仙人掌科(Cactaceae) (7) 山茱萸科(Cornaceae; <i>Aucuba</i> spp.除外) (8) 景天科(Crassulaceae) (9) 食用菌類(擔子菌門及子囊菌門)(Edible fungus (Basidiomycota and Ascomycota)) (10) 杜英科(Elaeocarpaceae) (11) 杜鵑花科(Ericaceae)	亞洲及太平洋地區 (1) 亞美尼亞 (2) 亞塞拜然 (3) 澳大利亞 (4) 白俄羅斯 (5) 中國大陸 (6) 喬治亞 (7) 印度 (8) 伊朗 (9) 伊拉克 (10) 以色列 (11) 日本 (12) 約旦 (13) 哈薩克 (14) 北韓 (15) 南韓 (16) 吉爾吉斯 (17) 黎巴嫩 (18) 摩爾多瓦 (19) 蒙古 (20) 紐西蘭 (21) 阿曼 (22) 巴基斯坦 (23) 俄羅斯 (24) 敘利亞 (25) 塔吉克 (26) 土耳其 (27) 土庫曼 (28) 泰國 (29) 烏茲別克 (30) 葉門	莖線蟲(<i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuhn)Filipjev)	應檢附輸出國植物檢疫機關(構)簽發之植物檢疫證明書，證明經檢疫未染莖線蟲或在輸出前經適當之檢疫處理。	19.植物名稱及其部位： I. 除下列植物外，其他植物生植株之根、莖、葉、花及草莓果實之輸入，應符合本項檢疫條件： (1) 番杏科(Aizoaceae; <i>Mollugo</i> spp.除外) (2) 天南星科(Araceae) (3) 鳳仙花科(Balsaminaceae) (4) 木棉科(Bombacaceae) (5) 苔蘚植物(Bryophyta) (6) 仙人掌科(Cactaceae) (7) 山茱萸科(Cornaceae; <i>Aucuba</i> spp.除外) (8) 景天科(Crassulaceae) (9) 食用菌類(擔子菌門及子囊菌門)(Edible fungus (Basidiomycota and Ascomycota)) (10) 杜英科(Elaeocarpaceae) (11) 杜鵑花科(Ericaceae)	亞洲及太平洋地區 (1) 亞美尼亞 (2) 亞塞拜然 (3) 澳大利亞 (4) 白俄羅斯 (5) 中國大陸 (6) 喬治亞 (7) 印度 (8) 伊朗 (9) 伊拉克 (10) 以色列 (11) 日本 (12) 約旦 (13) 哈薩克 (14) 北韓 (15) 南韓 (16) 吉爾吉斯 (17) 黎巴嫩 (18) 摩爾多瓦 (19) 蒙古 (20) 紐西蘭 (21) 阿曼 (22) 巴基斯坦 (23) 俄羅斯 (24) 敘利亞 (25) 塔吉克 (26) 土耳其 (27) 土庫曼 (28) 泰國 (29) 烏克蘭 (30) 烏茲別克	莖線蟲(<i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuhn)Filipjev)	應檢附輸出國植物檢疫機關(構)簽發之植物檢疫證明書，證明經檢疫未染莖線蟲或在輸出前經適當之檢疫處理。	

(12) 大戟科 (Euphorbiaceae; <i>Manihot</i> spp.除外) (13) 殼斗科 (Fagaceae) (14) 裸子植物 (Gymnospermae) (15) 樟科 (Lauraceae) (16) 桑科 (Moraceae) (17) 睡蓮科 (Nymphaeaceae) (18) 木犀科 (Oleaceae; <i>Syringa</i> spp.除外) (19) 蘭科 (Orchidaceae) (20) 棕櫚科 (Palmaceae) (21) 露兜樹科 (Pandanaaceae) (22) 車前科 (Plantaginaceae; <i>Plantago</i> spp.除外) (23) 眼子菜科 (Potamogetonaceae; <i>Potamogeton</i> spp. 除外) (24) 蕨類 (Pteridophyte; <i>Equisetum</i> spp.除外) (25) 梨屬 (<i>Pyrus</i> spp.) (26) 茜草科 (Rubiaceae; <i>Galium</i> spp.除外) (27) 虎耳草科 (Saxifragaceae; <i>Hydrangea</i> spp.除外) (28) 玄參科 (Scrophulariaceae; <i>Veronica</i> spp.除外)	非洲 (31) 阿爾及利亞 (32) 埃及 (33) 史瓦帝尼 (34) 肯亞 (35) 賴索托 (36) 利比亞 (37) 摩洛哥 (38) 留尼旺島 (法屬) (39) 南非 (40) 突尼西亞 歐洲 (41) 歐洲國家、 地區 北美 (42) 加拿大 (43) 墨西哥 (44) 美國 中南美 (45) 中南美洲國 家、地區			(12) 大戟科 (Euphorbiaceae; <i>Manihot</i> spp.除外) (13) 殼斗科 (Fagaceae) (14) 裸子植物 (Gymnospermae) (15) 樟科 (Lauraceae) (16) 桑科 (Moraceae) (17) 睡蓮科 (Nymphaeaceae) (18) 木犀科 (Oleaceae; <i>Syringa</i> spp.除外) (19) 蘭科 (Orchidaceae) (20) 棕櫚科 (Palmaceae) (21) 露兜樹科 (Pandanaaceae) (22) 車前科 (Plantaginaceae; <i>Plantago</i> spp.除外) (23) 眼子菜科 (Potamogetonaceae; <i>Potamogeton</i> spp. 除外) (24) 蕨類 (Pteridophyte; <i>Equisetum</i> spp.除外) (25) 梨屬 (<i>Pyrus</i> spp.) (26) 茜草科 (Rubiaceae; <i>Galium</i> spp.除外) (27) 虎耳草科 (Saxifragaceae; <i>Hydrangea</i> spp.除外) (28) 玄參科 (Scrophulariaceae; <i>Veronica</i> spp.除外)	(31) 葉門 非洲 (32) 阿爾及利亞 (33) 埃及 (34) 肯亞 (35) 賴索托 (36) 利比亞 (37) 摩洛哥 (38) 留尼旺島(法 屬) (39) 南非 (40) 史瓦濟蘭 (41) 突尼西亞 歐洲 (42) 歐洲國家、 地區 北美 (43) 加拿大 (44) 墨西哥 (45) 美國 中南美 (46) 中南美洲國 家、地區			
--	--	--	--	--	---	--	--	--

(29) 梧桐科 (Sterculiaceae) (30) 蕁麻科 (Urticaceae; <i>Urtica</i> spp.除外) (31) 堇菜科 (Violaceae; <i>Viola</i> spp.除外) (32) 葡萄科 (Vitaceae; <i>Vitis</i> <i>vinifera</i> 除外) II. 下列種子（食用及飼 料用除外）之輸入應 符合本項檢疫條件： (1) 蔥屬 (<i>Allium</i> spp.) (2) 甜菜 (<i>Beta vulgaris</i>) (3) 甜瓜 (<i>Cucumis melo</i>) (4) 胡蘿蔔 (<i>Daucus carota</i>) (5) 起絨草 (<i>Dipsacus fullonum</i>) (6) 紫花苜蓿 (<i>Medicago sativa</i>) (7) 花豆 (<i>Phaseolus</i> <i>coccineus</i>) (8) 敏豆 (<i>Phaseolus vulgaris</i>) (9) 福祿考 (<i>Phlox drummondii</i>) (10) 豌豆 (<i>Pisum sativum</i>) (11) 裸麥 (<i>Secale cereale</i>) (12) 菠菜 (<i>Spinacea oleracea</i> = <i>Spinacia</i> <i>oleracea</i>) (13) 瑞典三葉草 (<i>Trifolium</i> <i>hybridum</i>)				(29) 梧桐科 (Sterculiaceae) (30) 蕁麻科 (Urticaceae; <i>Urtica</i> spp.除外) (31) 堇菜科 (Violaceae; <i>Viola</i> spp.除外) (32) 葡萄科 (Vitaceae; <i>Vitis</i> <i>vinifera</i> 除外) II. 下列種子（食用及飼 料用除外）之輸入應 符合本項檢疫條件： (1) 蔥屬 (<i>Allium</i> spp.) (2) 甜菜 (<i>Beta vulgaris</i>) (3) 甜瓜 (<i>Cucumis melo</i>) (4) 胡蘿蔔 (<i>Daucus carota</i>) (5) 起絨草 (<i>Dipsacus fullonum</i>) (6) 紫花苜蓿 (<i>Medicago sativa</i>) (7) 花豆 (<i>Phaseolus</i> <i>coccineus</i>) (8) 敏豆 (<i>Phaseolus vulgaris</i>) (9) 福祿考 (<i>Phlox drummondii</i>) (10) 豌豆 (<i>Pisum sativum</i>) (11) 裸麥 (<i>Secale cereale</i>) (12) 菠菜 (<i>Spinacea oleracea</i> = <i>Spinacia</i> <i>oleracea</i>) (13) 瑞典三葉草 (<i>Trifolium</i> <i>hybridum</i>)				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

(<i>Camassia</i> spp.) (16) 茶樹 (<i>Camellia sinensis</i>) (17) 美人蕉屬 (<i>Canna</i> spp.) (18) 薺菜 (<i>Capsella bursa-pastoris</i>) (19) 番椒 (<i>Capsicum annuum</i>) (20) 小葉灰藿 (<i>Chenopodium album</i>) (21) 雪光花屬 (<i>Chionodoxa</i> spp.) (22) 虎尾草 (<i>Chloris virgata</i>) (23) 牛眼雛菊 (<i>Chrysanthemum leucanthemum</i>) (24) 菊花 (<i>Chrysanthemum morifolium</i>) (25) 小藜豆 (<i>Cicer arietinum</i>) (26) 黑升麻 (<i>Cimicifuga racemosa</i>) (27) 加拿大薊 (<i>Cirsium arvense</i>) (28) 西瓜 (<i>Citrullus lanatus</i>) (29) 柑橙 (<i>Citrus sinensis</i>) (30) 秋水仙屬 (<i>Colchicum</i> spp.) (31) 紫番紅花 (<i>Crocus vernus</i>) (32) 胡瓜 (<i>Cucumis sativus</i>) (33) 南瓜 (<i>Cucurbita moschata</i>) (34) 美國南瓜	(32)利比亞 (33)摩洛哥 (34)南非 (35)突尼西亞 歐洲 (36)歐洲國家、地區 北美 (37)加拿大 (38)墨西哥 (39)美國 中南美 (40)厄瓜多 (41)秘魯				(<i>Camassia</i> spp.) (16) 茶樹 (<i>Camellia sinensis</i>) (17) 美人蕉屬 (<i>Canna</i> spp.) (18) 薺菜 (<i>Capsella bursa-pastoris</i>) (19) 番椒 (<i>Capsicum annuum</i>) (20) 小葉灰藿 (<i>Chenopodium album</i>) (21) 雪光花屬 (<i>Chionodoxa</i> spp.) (22) 虎尾草 (<i>Chloris virgata</i>) (23) 牛眼雛菊 (<i>Chrysanthemum leucanthemum</i>) (24) 菊花 (<i>Chrysanthemum morifolium</i>) (25) 小藜豆 (<i>Cicer arietinum</i>) (26) 黑升麻 (<i>Cimicifuga racemosa</i>) (27) 加拿大薊 (<i>Cirsium arvense</i>) (28) 西瓜 (<i>Citrullus lanatus</i>) (29) 柑橙 (<i>Citrus sinensis</i>) (30) 秋水仙屬 (<i>Colchicum</i> spp.) (31) 紫番紅花 (<i>Crocus vernus</i>) (32) 胡瓜 (<i>Cucumis sativus</i>) (33) 南瓜 (<i>Cucurbita moschata</i>) (34) 美國南瓜	(32)利比亞 (33)摩洛哥 (34)南非 (35)史瓦濟蘭 (36)突尼西亞 歐洲 (37)歐洲國家、地區 北美 (38)加拿大 (39)墨西哥 (40)美國 中南美 (41)厄瓜多 (42)秘魯			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(<i>Cucurbita pepo</i>) (35) 香附子 (<i>Cyperus rotundus</i>) (36) 大理花屬 (<i>Dahlia</i> spp.) (37) 曼陀羅 (<i>Datura stramonium</i>) (38) 胡蘿蔔 (<i>Daucus carota</i>) (39) 石竹屬 (<i>Dianthus</i> spp.) (40) 牛筋草 (<i>Eleusine indica</i>) (41) 鵝觀草 (<i>Elymus repens</i> = <i>Agropyron repens</i>) (42) 狗牙堇 (<i>Erythronium denscanis</i>) (43) 高狐草 (<i>Festuca pratensis</i>) (44) 草莓屬 (<i>Fragaria</i> spp.) (45) 球果紫堇 (<i>Fumaria officinalis</i>) (46) 唐菖蒲屬 (<i>Gladiolus</i> spp.) (47) 大豆 (<i>Glycine max</i>) (48) 向日葵 (<i>Helianthus annuus</i>) (49) 大麥 (<i>Hordeum vulgare</i>) (50) 蛇麻 (<i>Humulus lupulus</i>) (51) 風信子屬 (<i>Hyacinthus</i> spp.) (52) 甘藷 (<i>Ipomoea batatas</i>) (53) 鳶尾屬 (<i>Iris</i> spp.)				(<i>Cucurbita pepo</i>) (35) 香附子 (<i>Cyperus rotundus</i>) (36) 大理花屬 (<i>Dahlia</i> spp.) (37) 曼陀羅 (<i>Datura stramonium</i>) (38) 胡蘿蔔 (<i>Daucus carota</i>) (39) 石竹屬 (<i>Dianthus</i> spp.) (40) 牛筋草 (<i>Eleusine indica</i>) (41) 鵝觀草 (<i>Elymus repens</i> = <i>Agropyron repens</i>) (42) 狗牙堇 (<i>Erythronium denscanis</i>) (43) 高狐草 (<i>Festuca pratensis</i>) (44) 草莓屬 (<i>Fragaria</i> spp.) (45) 球果紫堇 (<i>Fumaria officinalis</i>) (46) 唐菖蒲屬 (<i>Gladiolus</i> spp.) (47) 大豆 (<i>Glycine max</i>) (48) 向日葵 (<i>Helianthus annuus</i>) (49) 大麥 (<i>Hordeum vulgare</i>) (50) 蛇麻 (<i>Humulus lupulus</i>) (51) 風信子屬 (<i>Hyacinthus</i> spp.) (52) 甘藷 (<i>Ipomoea batatas</i>) (53) 鳶尾屬 (<i>Iris</i> spp.)				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

(54) 草豆 (<i>Lathyrus hirsutus</i>)				(54) 草豆 (<i>Lathyrus hirsutus</i>)				
(55) 廣葉小鰲豆 (<i>Lathyrus latifolius</i>)				(55) 廣葉小鰲豆 (<i>Lathyrus latifolius</i>)				
(56) 松傘菊 (<i>Liatris spicata</i>)				(56) 松傘菊 (<i>Liatris spicata</i>)				
(57) 柳穿魚 (<i>Linaria vulgaris</i>)				(57) 柳穿魚 (<i>Linaria vulgaris</i>)				
(58) 番茄 (<i>Solanum lycopersicum</i> = <i>Lycopersicon esculentum</i>)				(58) 番茄 (<i>Lycopersicon esculentum</i>)				
(59) 狼紫草屬之一種 (<i>Lycopsis arvensis</i>)				(59) 狼紫草屬之一種 (<i>Lycopsis arvensis</i>)				
(60) 母菊 (<i>Matricaria inodora</i> = <i>M. perforata</i>)				(60) 母菊 (<i>Matricaria inodora</i> = <i>M. perforata</i>)				
(61) 紫花苜蓿 (<i>Medicago sativa</i>)				(61) 紫花苜蓿 (<i>Medicago sativa</i>)				
(62) 黃香草木犀 (<i>Melilotus officinalis</i>)				(62) 黃香草木犀 (<i>Melilotus officinalis</i>)				
(63) 薄荷 (<i>Mentha arvensis</i>)				(63) 薄荷 (<i>Mentha arvensis</i>)				
(64) 水仙屬 (<i>Narcissus</i> spp.)				(64) 水仙屬 (<i>Narcissus</i> spp.)				
(65) 蜜蒜屬 (<i>Nectaroscordum</i> spp.)				(65) 蜜蒜屬 (<i>Nectaroscordum</i> spp.)				
(66) 菸草 (<i>Nicotiana tabacum</i>)				(66) 菸草 (<i>Nicotiana tabacum</i>)				
(67) 人蔘 (<i>Panax ginseng</i>)				(67) 人蔘 (<i>Panax ginseng</i>)				
(68) 防風草 (<i>Pastinaca sativa</i>)				(68) 防風草 (<i>Pastinaca sativa</i>)				
(69) 敏豆 (<i>Phaseolus vulgaris</i>)				(69) 敏豆 (<i>Phaseolus vulgaris</i>)				
(70) 車前 (<i>Plantago major</i>)				(70) 車前 (<i>Plantago major</i>)				
(71) 馬齒莧屬				(71) 馬齒莧屬 (<i>Portulaca</i> spp.)				
				(72) 鵝絨委陵菜				

(<i>Portulaca</i> spp.)				(<i>Potentilla</i> <i>anserina</i>)				
(72) 鵝絨委陵菜				(73) 蘿蔔				
(<i>Potentilla</i> <i>anserina</i>)				(<i>Raphanus sativus</i>)				
(73) 蘿蔔				(74) 圓葉大黃				
(<i>Raphanus sativus</i>)				(<i>Rheum</i> <i>rhaponticum</i>)				
(74) 圓葉大黃				(75) 酸模屬				
(<i>Rheum</i> <i>rhaponticum</i>)				(<i>Rumex</i> spp.)				
(75) 酸模屬				(76) 甘蔗				
(<i>Rumex</i> spp.)				(<i>Saccharum</i> <i>officinarum</i>)				
(76) 甘蔗				(77) 庭菖蒲				
(<i>Saccharum</i> <i>officinarum</i>)				(<i>Sisyrinchium</i> <i>angustifolium</i>)				
(77) 庭菖蒲				(78) 茄屬				
(<i>Sisyrinchium</i> <i>angustifolium</i>)				(<i>Solanum</i> spp.)				
(78) 茄屬				(79) 一枝黃花				
(<i>Solanum</i> spp.)				(<i>Solidago</i> <i>graminifolia</i> = <i>S. anceolata</i> = <i>Euthamia</i> <i>graminifolia</i>)				
(79) 一枝黃花				(80) 苦苣菜屬				
(<i>Solidago</i> <i>graminifolia</i> = <i>S. anceolata</i> = <i>Euthamia</i> <i>graminifolia</i>)				(<i>Sonchus</i> spp.)				
(80) 苦苣菜屬				(81) 水蘇				
(<i>Sonchus</i> spp.)				(<i>Stachys palustris</i>)				
(81) 水蘇				(82) 奧古斯丁草				
(<i>Stachys palustris</i>)				(<i>Stenotaphrum</i> <i>secundatum</i>)				
(82) 奧古斯丁草				(83) 丁香				
(<i>Stenotaphrum</i> <i>secundatum</i>)				(<i>Syringa vulgaris</i>)				
(83) 丁香				(84) 萬壽菊				
(<i>Syringa vulgaris</i>)				(<i>Tagetes minuta</i>)				
(84) 萬壽菊				(85) 蒲公英				
(<i>Tagetes minuta</i>)				(<i>Taraxacum</i> <i>officinale</i> = <i>Leontoden</i> <i>taraxacum</i>)				
(85) 蒲公英				(86) 虎斑花屬				
(<i>Taraxacum</i> <i>officinale</i> = <i>Leontoden</i> <i>taraxacum</i>)				(<i>Tigridia</i> spp.)				
(86) 虎斑花屬				(87) 三葉草屬				
(<i>Tigridia</i> spp.)				(<i>Trifolium</i> spp.)				
(87) 三葉草屬				(88) 三肋果屬之一種				
(<i>Trifolium</i> spp.)				(<i>Tripleurospermum</i>				

(88) 三肋果屬之一種 (<i>Tripleurospermum maritimum</i>) (89) 小麥 (<i>Triticum aestivum</i>) (90) 金蓮花 (<i>Tropaeolum polyphyllum</i>) (91) 鬱金香屬 (<i>Tulipa</i> spp.) (92) 款冬 (<i>Tussilago farfara</i>) (93) 野豌豆 (<i>Vicia sativa</i>) (94) 豇豆 (<i>Vigna unguiculata</i> = <i>V. sinensis</i>) (95) 蒼耳 (<i>Xanthium strumarium</i>) (96) 玉米 (<i>Zea mays</i>)				<i>maritimum</i>) (89) 小麥 (<i>Triticum aestivum</i>) (90) 金蓮花 (<i>Tropaeolum polyphyllum</i>) (91) 鬱金香屬 (<i>Tulipa</i> spp.) (92) 款冬 (<i>Tussilago farfara</i>) (93) 野豌豆 (<i>Vicia sativa</i>) (94) 豇豆 (<i>Vigna unguiculata</i> = <i>V. sinensis</i>) (95) 蒼耳 (<i>Xanthium strumarium</i>) (96) 玉米 (<i>Zea mays</i>)				
植物名稱及其部位	國家或地區	病蟲害名稱	檢疫條件	植物名稱及其部位	國家或地區	病蟲害名稱	檢疫條件	一、經查我國外交部將烏克蘭歸列於歐洲地區，爰刪除原列於亞洲及太平洋地區之項目，將其移列於歐洲，另依英文國名字首，酌予調整愛沙尼亞等國家排序，並遞移其他國家或地區排序。 二、另依現行科學文獻所載植物學名，增列並酌修番茄之同物異名。
21. 下列植物生植株之莖、葉、芽、塊莖及果實： (1) 番茄 (<i>Solanum lycopersicum</i> = <i>Lycopersicon esculentum</i>) (2) 茄屬 (<i>Solanum</i> spp.)	亞洲及太平洋地區 (1)亞美尼亞 (2)亞塞拜然 (3)白俄羅斯 (4)中國大陸 (5)喬治亞 (6)印度 (7)印尼 (8)以色列 (9)日本 (10)哈薩克 (11)南韓 (12)吉爾吉斯 (13)摩爾多瓦 (14)尼泊爾 (15)巴基斯坦 (16)俄羅斯 (17)塔吉克	馬鈴薯晚疫病菌 A ² 型 (<i>Phytophthora infestans</i> A ² Mating Type)	應檢附輸出國植物檢疫機關(構)簽發之植物檢疫證明書，證明未染馬鈴薯晚疫病菌 A ² 型，且非產自馬鈴薯晚疫病菌 A ² 型發生地區，否則銷燬或退運。	21. 下列植物生植株之莖、葉、芽、塊莖及果實： (3) 番茄 (<i>Lycopersicum esculentum</i>) (4) 茄屬 (<i>Solanum</i> spp.)	亞洲及太平洋地區 (1)亞美尼亞 (2)亞塞拜然 (3)白俄羅斯 (4)中國大陸 (5)喬治亞 (6)印度 (7)印尼 (8)以色列 (9)日本 (10)哈薩克 (11)南韓 (12)吉爾吉斯 (13)摩爾多瓦 (14)尼泊爾 (15)巴基斯坦 (16)俄羅斯 (17)塔吉克	馬鈴薯晚疫病菌 A ² 型 (<i>Phytophthora infestans</i> A ² Mating Type)	應檢附輸出國植物檢疫機關(構)簽發之植物檢疫證明書，證明未染馬鈴薯晚疫病菌 A ² 型，且非產自馬鈴薯晚疫病菌 A ² 型發生地區，否則銷燬或退運。	

	(18)泰國 (19)土庫曼 (20)烏茲別克 非洲 (21)埃及 (22)摩洛哥 (23)盧安達 歐洲 (24)奧地利 (25)比利時 (26)捷克 (27)丹麥 (28)愛沙尼亞 (29)芬蘭 (30)法國 (31)德國 (32)匈牙利 (33)愛爾蘭 (34)義大利 (35)拉脫維亞 (36)立陶宛 (37)荷蘭 (38)挪威 (39)波蘭 (40)瑞典 (41)瑞士 (42)烏克蘭 (43)英國 北美 (44)加拿大 (45)墨西哥 (46)美國 中南美 (47)阿根廷 (48)玻利維亞 (49)巴西 (50)哥倫比亞 (51)厄瓜多 (52)巴拉圭 (53)烏拉圭				(18)泰國 (19)土庫曼 (20)烏克蘭 (21)烏茲別克 非洲 (22)埃及 (23)摩洛哥 (24)盧安達 歐洲 (25)奧地利 (26)比利時 (27)捷克 (28)丹麥 (29)芬蘭 (30)法國 (31)德國 (32)愛沙尼亞 (33)匈牙利 (34)愛爾蘭 (35)義大利 (36)拉脫維亞 (37)立陶宛 (38)荷蘭 (39)挪威 (40)波蘭 (41)瑞典 (42)瑞士 (43)英國 北美 (44)加拿大 (45)墨西哥 (46)美國 中南美 (47)阿根廷 (48)玻利維亞 (49)巴西 (50)哥倫比亞 (51)厄瓜多 (52)巴拉圭 (53)烏拉圭			

植物名稱及其部位	國家或地區	病蟲害名稱	檢疫條件	植物名稱及其部位	國家或地區	病蟲害名稱	檢疫條件	
22. 下列植物之鮮果實： (1) 唐棣屬 (<i>Amelanchier</i> spp.) (2) 山楸梅屬 (<i>Aronia</i> spp.) (3) 木瓜屬 (<i>Chaenomeles</i> spp.) (4) 車輪棠屬 (<i>Cotoneaster</i> spp.) (5) 薔薇科之一屬 (<i>Crataegomespilus</i> spp.) (6) 山楂屬 (<i>Crataegus</i> spp.) (7) 榲桲屬 (<i>Cydonia</i> spp.) (8) 牛筋條屬 (<i>Dichotomanthes</i> spp.) (9) 柘依屬 (<i>Docynia</i> spp.) (10) 枇杷 (<i>Eriobotrya japonica</i>) (11) 蘋果屬 (<i>Malus</i> spp.) (12) 山楂子屬 (<i>Mespilus</i> spp.) (13) 小石積屬 (<i>Osteomeles</i> spp.) (14) 酸果木屬 (<i>Peraphyllum</i> spp.) (15) 石楠屬 (<i>Photinia</i> spp. = <i>Heteromeles</i> spp.) (16) 李屬 (<i>Prunus</i> spp.) (17) 火刺屬 (<i>Pyracantha</i> spp.) (18) 梨屬 (<i>Pyrus</i> spp.) (19) 車輪梅屬	亞洲及太平洋地區 (1)亞美尼亞 (2)亞塞拜然 (3)白俄羅斯 (4)中國大陸 (山東省除外) (5)喬治亞 (6)印度 (7)以色列 (8)約旦 (9)哈薩克 (10)韓國 (11)吉爾吉斯 (12)黎巴嫩 (13)摩爾多瓦 (14)紐西蘭 (15)俄羅斯 (16)沙烏地阿拉伯 (17)塔吉克 (18)土耳其 (19)土庫曼 (20)烏茲別克 (21)越南 非洲 (22)埃及 歐洲 (23)阿爾巴尼亞 (24)奧地利 (25)比利時 (26)波士尼亞赫塞哥維納 (27)保加利亞 (28)克羅埃西亞 (29)賽普勒斯 (30)捷克 (31)丹麥 (32)愛沙尼亞 (33)法國	火傷病 (<i>Erwinia amylovora</i> (Burrill) Winslow <i>et al.</i>)	應檢附輸出國植物檢疫機關(構)簽發之植物檢疫證明書,證明未染火傷病,否則銷燬或退運。	22. 下列植物之鮮果實： (1) 唐棣屬 (<i>Amelanchier</i> spp.) (2) 山楸梅屬 (<i>Aronia</i> spp.) (3) 木瓜屬 (<i>Chaenomeles</i> spp.) (4) 車輪棠屬 (<i>Cotoneaster</i> spp.) (5) 薔薇科之一屬 (<i>Crataegomespilus</i> spp.) (6) 山楂屬 (<i>Crataegus</i> spp.) (7) 榲桲屬 (<i>Cydonia</i> spp.) (8) 牛筋條屬 (<i>Dichotomanthes</i> spp.) (9) 柘依屬 (<i>Docynia</i> spp.) (10) 枇杷 (<i>Eriobotrya japonica</i>) (11) 蘋果屬 (<i>Malus</i> spp.) (12) 山楂子屬 (<i>Mespilus</i> spp.) (13) 小石積屬 (<i>Osteomeles</i> spp.) (14) 酸果木屬 (<i>Peraphyllum</i> spp.) (15) 石楠屬 (<i>Photinia</i> spp. = <i>Heteromeles</i> spp.) (16) 李屬 (<i>Prunus</i> spp.) (17) 火刺屬 (<i>Pyracantha</i> spp.) (18) 梨屬 (<i>Pyrus</i> spp.) (19) 車輪梅屬	亞洲及太平洋地區 (1)亞美尼亞 (2)亞塞拜然 (3)白俄羅斯 (4)中國大陸 (山東省除外) (5)喬治亞 (6)印度 (7)以色列 (8)約旦 (9)哈薩克 (10)韓國 (11)吉爾吉斯 (12)黎巴嫩 (13)摩爾多瓦 (14)紐西蘭 (15)俄羅斯 (16)沙烏地阿拉伯 (17)塔吉克 (18)土耳其 (19)土庫曼 (20)烏克蘭 (21)烏茲別克 (22)越南 非洲 (23)埃及 歐洲 (24)阿爾巴尼亞 (25)奧地利 (26)比利時 (27)波士尼亞赫塞哥維納 (28)保加利亞 (29)克羅埃西亞 (30)賽普勒斯 (31)捷克 (32)丹麥 (33)愛沙尼亞	火傷病 (<i>Erwinia amylovora</i> (Burrill) Winslow <i>et al.</i>)	應檢附輸出國植物檢疫機關(構)簽發之植物檢疫證明書,證明未染火傷病,否則銷燬或退運。	經查我國外交部將烏克蘭歸列於歐洲地區，爰刪除原列於亞洲及太平洋地區之項目，將其移列於歐洲，並遞移其他國家或地區排序。

(Raphiolepis spp.) (20) 懸鈎子屬 (Rubus spp.) (21) 花楸屬 (Sorbus spp.) (22) 繡線菊屬 (Spiraea spp.) (23) 紅果樹屬 (Stranvaesia spp.)		(34)德國 (35)希臘 (36)匈牙利 (37)愛爾蘭 (38)義大利 (39)拉脫維亞 (40)立陶宛 (41)盧森堡 (42)馬其頓 (43)荷蘭 (44)挪威 (45)波蘭 (46)羅馬尼亞 (47)塞爾維亞與 蒙特內哥羅 (48)斯洛伐克 (49)西班牙 (50)瑞典 (51)瑞士 (52)烏克蘭 (53)英國 北美 (54)加拿大 (55)墨西哥 (56)美國 中南美 (57)巴西 (58)百慕達(英屬) (59)瓜地馬拉 (60)委內瑞拉						(Raphiolepis spp.) (20) 懸鈎子屬 (Rubus spp.) (21) 花楸屬 (Sorbus spp.) (22) 繡線菊屬 (Spiraea spp.) (23) 紅果樹屬 (Stranvaesia spp.)		(34)法國 (35)德國 (36)希臘 (37)匈牙利 (38)愛爾蘭 (39)義大利 (40)拉脫維亞 (41)立陶宛 (42)盧森堡 (43)馬其頓 (44)荷蘭 (45)挪威 (46)波蘭 (47)羅馬尼亞 (48)塞爾維亞與 蒙特內哥羅 (49)斯洛伐克 (50)西班牙 (51)瑞典 (52)瑞士 (53)英國 北美 (54)加拿大 (55)墨西哥 (56)美國 中南美 (57)巴西 (58)百慕達(英屬) (59)瓜地馬拉 (60)委內瑞拉						
植物名稱及其部位		國 家 或 地 區		病 蟲 害 名 稱		檢 疫 條 件		植物名稱及其部位		國 家 或 地 區		病 蟲 害 名 稱		檢 疫 條 件		一、經查我國外交部將烏克蘭歸列於歐洲地區，爰刪除原列於亞洲及太平洋地區之項目，將其移列於歐洲，並遞移其他國家或地區排序。 二、酌修番茄學名。
26. 下列植物生植株之全部、部分(種子除外)： (1) 蔥屬 (Allium spp.) (2) 牛蒡 (Arctium lappa) (3) 甘藍 (Brassica oleracea var. capitata)		亞洲及太平洋地區 (1)亞美尼亞 (2)亞塞拜然 (3)白俄羅斯 (4)中國大陸 (5)喬治亞 (6)哈薩克 (7)印度		刺足根蟎 (Rhizoglyphus echinopus Fumouze and Robin)		應檢附輸出國植物檢疫機關(構)簽發之植物檢疫證明書，證明經檢疫未染刺足根蟎或在輸出前經適當之檢疫處理。		26. 下列植物生植株之全部、部分(種子除外)： (1) 蔥屬 (Allium spp.) (2) 牛蒡 (Arctium lappa) (3) 甘藍 (Brassica oleracea var. capitata)		亞洲及太平洋地區 (1)亞美尼亞 (2)亞塞拜然 (3)白俄羅斯 (4)中國大陸 (5)喬治亞 (6)哈薩克 (7)印度		刺足根蟎 (Rhizoglyphus echinopus Fumouze and Robin)		應檢附輸出國植物檢疫機關(構)簽發之植物檢疫證明書，證明經檢疫未染刺足根蟎或在輸出前經適當之檢疫處理。		

(4) 黃楊木 (<i>Buxus microphylla</i> var. <i>intermedia</i>) (5) 番椒屬 (<i>Capsicum</i> spp.) (6) 薑黃 (<i>Curcuma longa</i> = <i>C. domestica</i>) (7) 大理花屬 (<i>Dahlia</i> spp.) (8) 胡蘿蔔 (<i>Daucus carota</i> var. <i>sativa</i>) (9) 亞馬遜百合 (<i>Eucharis</i> <i>grandiflora</i>) (10) 小蒼蘭屬 (<i>Freesia</i> spp.) (11) 龍膽 (<i>Gentiana scabra</i> Bunge var. <i>buergeri</i>) (12) 唐菖蒲屬 (<i>Gladiolus</i> spp.) (13) 蔓百合屬 (<i>Gloriosa</i> spp.) (14) 大豆 (<i>Glycine max</i>) (15) 萱草 (<i>Heimerocallis</i> <i>hybrida</i>) (16) 孤挺花 (<i>Hippeastrum</i> spp.) (17) 風信子屬 (<i>Hyacinthus</i> spp.) (18) 甘藷 (<i>Ipomoea batatas</i>) (19) 鳶尾屬 (<i>Iris</i> spp.) (20) 長筒非洲蓮香 (<i>Lachenalia</i> <i>pendula</i>) (21) 百合 (<i>Lilium</i> spp.) (22) 水仙屬	(8)伊朗 (9)以色列 (10)日本 (11)北韓 (12)南韓 (13)吉爾吉斯 (14)紐西蘭 (15)摩爾多瓦 (16)俄羅斯 (17)塔吉克 (18)泰國 (19)土庫曼 (20)烏茲別克 (21)越南 非洲 (22)阿爾及利 亞 (23)埃及 (24)利比亞 歐洲 (25)比利時 (26)丹麥 (27)愛沙尼亞 (28)法國 (29)德國 (30)匈牙利 (31)義大利 (32)拉脫維亞 (33)立陶宛 (34)荷蘭 (35)波蘭 (36)羅馬尼亞 (37)西班牙 (38)瑞士 (39)烏克蘭 (40)英國 北美 (41)加拿大 (42)美國(加利 福尼亞州及 德克薩斯 州)			(4) 黃楊木 (<i>Buxus microphylla</i> var. <i>intermedia</i>) (5) 番椒屬 (<i>Capsicum</i> spp.) (6) 薑黃 (<i>Curcuma longa</i> = <i>C. domestica</i>) (7) 大理花屬 (<i>Dahlia</i> spp.) (8) 胡蘿蔔 (<i>Daucus carota</i> var. <i>sativa</i>) (9) 亞馬遜百合 (<i>Eucharis</i> <i>grandiflora</i>) (10) 小蒼蘭屬 (<i>Freesia</i> spp.) (11) 龍膽 (<i>Gentiana scabra</i> Bunge var. <i>buergeri</i>) (12) 唐菖蒲屬 (<i>Gladiolus</i> spp.) (13) 蔓百合屬 (<i>Gloriosa</i> spp.) (14) 大豆 (<i>Glycine max</i>) (15) 萱草 (<i>Heimerocallis</i> <i>hybrida</i>) (16) 孤挺花 (<i>Hippeastrum</i> spp.) (17) 風信子屬 (<i>Hyacinthus</i> spp.) (18) 甘藷 (<i>Ipomoea batatas</i>) (19) 鳶尾屬 (<i>Iris</i> spp.) (20) 長筒非洲蓮香 (<i>Lachenalia</i> <i>pendula</i>) (21) 百合 (<i>Lilium</i> spp.) (22) 水仙屬	(8)伊朗 (9)以色列 (10)日本 (11)北韓 (12)南韓 (13)吉爾吉斯 (14)紐西蘭 (15)摩爾多瓦 (16)俄羅斯 (17)塔吉克 (18)泰國 (19)土庫曼 (20)烏克蘭 (21)烏茲別克 (22)越南 非洲 (23)阿爾及利 亞 (24)埃及 (25)利比亞 歐洲 (26)比利時 (27)丹麥 (28)愛沙尼亞 (29)法國 (30)德國 (31)荷蘭 (32)匈牙利 (33)義大利 (34)拉脫維亞 (35)立陶宛 (36)波蘭 (37)羅馬尼亞 (38)西班牙 (39)瑞士 (40)英國 北美 (41)加拿大 (42)美國(加利福 尼亞州及德 克薩斯州) 中南美			
---	--	--	--	---	---	--	--	--

(<i>Narcissus</i> spp.) (23) 牡丹 (<i>Paeonia suffruticosa</i>) (24) 人蔘屬 (<i>Panax</i> spp.) (25) 半夏 (<i>Pinellia ternata</i>) (26) 鮑魚菇 (<i>Pleurotus sajor-caju</i> and <i>P. ostreatus</i>) (27) 蘿蔔 (<i>Raphanus sativus</i>) (28) 裸麥 (<i>Secale cereale</i>) (29) 大岩桐屬 (<i>Sinningia</i> spp.) (30) 茄屬 (<i>Solanum</i> spp.) (番茄 (<i>Solanum lycopersicum</i> = <i>Lycopersicon esculentum</i>) 除外) (31) 鬱金香屬 (<i>Tulipa</i> spp.) (32) 馬鞭草 (<i>Verbena officinalis</i>) (33) 蠶豆 (<i>Vicia faba</i>)	中南美 (43)阿根廷 (44)智利			(<i>Narcissus</i> spp.) (23) 牡丹 (<i>Paeonia suffruticosa</i>) (24) 人蔘屬 (<i>Panax</i> spp.) (25) 半夏 (<i>Pinellia ternata</i>) (26) 鮑魚菇 (<i>Pleurotus sajor-caju</i> and <i>P. ostreatus</i>) (27) 蘿蔔 (<i>Raphanus sativus</i>) (28) 裸麥 (<i>Secale cereale</i>) (29) 大岩桐屬 (<i>Sinningia</i> spp.) (30) 茄屬 (<i>Solanum</i> spp.) (番茄 (<i>Solanum lycopersicum</i> = <i>Lycopersicum esculentum</i>) 除外) (31) 鬱金香屬 (<i>Tulipa</i> spp.) (32) 馬鞭草 (<i>Verbena officinalis</i>) (33) 蠶豆 (<i>Vicia faba</i>)	(43)阿根廷 (44)智利			
植物名稱及其部位	國家或地區	病蟲害名稱	檢疫條件	植物名稱及其部位	國家或地區	病蟲害名稱	檢疫條件	一、依據 CBAI 及國際種子協會 (ISF) 檢疫有害生物名單，新增伊拉克、哈薩克、越南及挪威為梨花枯病疫區，並遞移其他國家或地區排序。 二、增列萵苣 (<i>Lactuca sativa</i>) 之繁殖用生植株為寄主，並遞移其他植物排序。另酌修番茄學名。
37.植物名稱及其部位 I.下列繁殖用生植株 (種子除外)： (1)黃秋葵(<i>Abelmoschus esculentus</i> = <i>Hibiscus esculentus</i>) (2)烏頭屬 (<i>Aconitum</i> spp.) (3)臺灣羊桃 (<i>Actinidia chinensis</i>) (4)奇異果	亞洲及太平洋地區 (1)阿富汗 (2)澳大利亞 (3)亞塞拜然 (2)孟加拉 (3)白俄羅斯 (4)中國大陸 (5)喬治亞 (6)印度	梨花枯病 (<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>syringae</i>)	1. 應檢附輸出國植物檢疫機關 (構) 簽發之植物檢疫證明書，證明經田間檢疫未罹染 <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>syringae</i> ，或於輸出前經實驗室檢測未罹染 <i>Pseudomonas</i>	37.植物名稱及其部位 I.下列繁殖用生植株 (種子除外)： (1)黃秋葵(<i>Abelmoschus esculentus</i> = <i>Hibiscus esculentus</i>) (2) 烏頭屬 (<i>Aconitum</i> spp.) (3) 臺灣羊桃 (<i>Actinidia chinensis</i>) (4) 奇異果	亞洲及太平洋地區 (1)阿富汗 (2)亞塞拜然 (3)澳大利亞 (4)孟加拉 (5)白俄羅斯 (6)中國大陸 (7)喬治亞 (8)印度	梨花枯病 (<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>syringae</i>)	1. 應檢附輸出國植物檢疫機關 (構) 簽發之植物檢疫證明書，證明經田間檢疫未罹染 <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>syringae</i> ，或於輸出前經實驗室檢測未罹染 <i>Pseudomonas</i>	

(<i>Actinidia deliciosa</i>) (5) 赤楊屬之一種(<i>Alnus glutinosa</i>) (6) 梔木屬(<i>Aralia</i> spp.) (7) 漿果鵝屬(<i>Arbutus</i> spp.) (8) 歐洲白樺(<i>Betula pendula</i>) (9) 旋花科之一種(<i>Calystegia sepium</i>) (10) 番椒(<i>Capsicum annuum</i>) (11) 紅花(<i>Carthamus tinctorius</i>) (12) 矢車菊屬之一種(<i>Centaurea stoebe</i>) (13) 野菊(<i>Chrysanthemum indicum</i>) (14) 樟樹(<i>Cinnamomum camphora</i>) (15) 柑橘屬(<i>Citrus</i> spp.) (16) 阿拉比卡咖啡(<i>Coffea arabica</i>) (17) 胡瓜(<i>Cucumis sativus</i>) (18) 南瓜屬(<i>Cucurbita</i> spp.) (19) 瓜爾豆(<i>Cyamopsis tetra-gonoloba</i>) (20) 榲桲(<i>Cydonia oblonga</i>) (21) 大理花(<i>Dahlia pinnata</i>) (22) 瑞香(<i>Daphne odora</i>) (23) 柿(<i>Diospyros kaki</i>) (24) 連翹屬之一種(<i>Forsythia intermedia</i>) (25) 金柑屬(<i>Fortunella</i> spp.)	(7) 伊朗 (10) 伊拉克 (11) 以色列 (12) 日本 (13) 哈薩克 (14) 北韓 (15) 南韓 (16) 吉爾吉斯 (17) 黎巴嫩 (18) 紐西蘭 (19) 巴基斯坦 (20) 俄羅斯聯邦 (21) 斯里蘭卡 (22) 泰國 (23) 土耳其 (24) 烏茲別克 (25) 越南 非洲 (26) 阿爾及利亞 (27) 埃及 (28) 衣索比亞 (29) 肯亞 (30) 賴索托 (31) 利比亞 (32) 馬拉威 (33) 摩洛哥 (34) 奈及利亞 (35) 南非 (36) 坦尚尼亞 (37) 突尼西亞 (38) 烏干達 (39) 辛巴威 歐洲 (40) 奧地利 (41) 比利時 (42) 波士尼亞赫塞哥維納 (43) 保加利亞 (44) 賽普勒斯 (45) 捷克		<i>syringae</i> pv. <i>syringae</i>，否則銷燬或退運。 2. 日本產梨接穗依「日本產梨接穗輸入檢疫條件」辦理輸入。 3. 中國大陸產梨接穗依「中國大陸產梨接穗輸入檢疫條件」辦理輸入。	(<i>Actinidia deliciosa</i>) (5) 赤楊屬之一種(<i>Alnus glutinosa</i>) (6) 梔木屬(<i>Aralia</i> spp.) (7) 漿果鵝屬(<i>Arbutus</i> spp.) (8) 歐洲白樺(<i>Betula pendula</i>) (9) 旋花科之一種(<i>Calystegia sepium</i>) (10) 番椒(<i>Capsicum annuum</i>) (11) 紅花(<i>Carthamus tinctorius</i>) (12) 矢車菊屬之一種(<i>Centaurea stoebe</i>) (13) 野菊(<i>Chrysanthemum indicum</i>) (14) 樟樹(<i>Cinnamomum camphora</i>) (15) 柑橘屬(<i>Citrus</i> spp.) (16) 阿拉比卡咖啡(<i>Coffea arabica</i>) (17) 胡瓜(<i>Cucumis sativus</i>) (18) 南瓜屬(<i>Cucurbita</i> spp.) (19) 瓜爾豆(<i>Cyamopsis tetra-gonoloba</i>) (20) 榲桲(<i>Cydonia oblonga</i>) (21) 大理花(<i>Dahlia pinnata</i>) (22) 瑞香(<i>Daphne odora</i>) (23) 柿(<i>Diospyros kaki</i>) (24) 連翹屬之一種(<i>Forsythia intermedia</i>)	(9) 伊朗 (10) 以色列 (11) 日本 (12) 北韓 (13) 南韓 (14) 吉爾吉斯 (15) 黎巴嫩 (16) 紐西蘭 (17) 俄羅斯聯邦 (18) 巴基斯坦 (19) 斯里蘭卡 (20) 泰國 (21) 土耳其 (22) 烏茲別克 非洲 (23) 阿爾及利亞 (24) 埃及 (25) 衣索比亞 (26) 肯亞 (27) 賴索托 (28) 利比亞 (29) 馬拉威 (30) 摩洛哥 (31) 奈及利亞 (32) 南非 (33) 坦尚尼亞 (34) 突尼西亞 (35) 烏干達 (36) 辛巴威 歐洲 (37) 奧地利 (38) 比利時 (39) 波士尼亞赫塞哥維納 (40) 保加利亞 (41) 賽普勒斯 (42) 捷克 (43) 丹麥 (44) 法國 (45) 德國 (46) 希臘		<i>syringae</i> pv. <i>syringae</i>，否則銷燬或退運。 2. 日本產梨接穗依「日本產梨接穗輸入檢疫條件」辦理輸入。 3. 中國大陸產梨接穗依「中國大陸產梨接穗輸入檢疫條件」辦理輸入。	
--	--	--	---	--	---	--	---	--

(26) 歐洲草莓(<i>Fragaria vesca</i>) (27) 大豆 (<i>Glycine max</i>) (28) 木槿屬(<i>Hibiscus</i> spp.) (29) 大麥 (<i>Hordeum vulgare</i>) (30) 胡桃 (<i>Juglans regia</i>) (31) 萵苣 (<i>Lactuca sativa</i>) (32) 白花鵲豆 (<i>Lablab purpureus</i>) (33) 女貞屬之一種 (<i>Ligustrum ovalifolium</i>) (34) 荔枝 (<i>Litchi chinensis</i>) (35) 木蘭屬(<i>Magnolia</i> spp.) (36) 檬果(<i>Mangifera indica</i>) (37) 蘋果 (<i>Malus domestica</i>) (38) 虎爪豆(<i>Mucuna pruriens</i>) (39) 芭蕉屬之一種 (<i>Musa paradisiaca</i>) (40) 歐洲夾竹桃 (<i>Nerium oleander</i>) (41) 菸草 (<i>Nicotiana tabacum</i>) (42) 橄欖 (<i>Olea europaea</i>) (43) 稻 (<i>Oryza sativa</i>) (44) 百香果(<i>Passiflora edulis</i>) (45) 酪梨 (<i>Persea americana</i>) (46) 花豆(<i>Phaseolus coccineus</i>)	(46) 丹麥 (47) 法國 (48) 德國 (49) 希臘 (50) 匈牙利 (51) 愛爾蘭 (52) 義大利 (53) 拉脫維亞 (54) 立陶宛 (55) 摩爾多瓦 (56) 荷蘭 (57) 馬其頓 (58) 挪威 (59) 波蘭 (60) 葡萄牙 (61) 羅馬尼亞 (62) 塞爾維亞 (63) 斯洛維尼亞 (64) 西班牙 (65) 瑞典 (66) 瑞士 (67) 烏克蘭 (68) 英國 北美 (69) 加拿大 (70) 墨西哥 (71) 美國 中南美 (72) 阿根廷 (73) 巴貝多 (74) 巴西 (75) 智利 (76) 薩爾瓦多 (77) 瓜地馬拉 (78) 宏都拉斯 (79) 巴拿馬 (80) 波多黎各 (81) 烏拉圭 (82) 委內瑞拉			(25) 金柑屬(<i>Fortunella</i> spp.) (26) 歐洲草莓 (<i>Fragaria vesca</i>) (27) 大豆 (<i>Glycine max</i>) (28) 木槿屬(<i>Hibiscus</i> spp.) (29) 大麥 (<i>Hordeum vulgare</i>) (30) 胡桃 (<i>Juglans regia</i>) (31) 白花鵲豆 (<i>Lablab purpureus</i>) (32) 女貞屬之一種 (<i>Ligustrum ovalifolium</i>) (33) 荔枝 (<i>Litchi chinensis</i>) (34) 木蘭屬 (<i>Magnolia</i> spp.) (35) 檬果 (<i>Mangifera indica</i>) (36) 蘋果 (<i>Malus domestica</i>) (37) 虎爪豆(<i>Mucuna pruriens</i>) (38) 芭蕉屬之一種 (<i>Musa paradisiaca</i>) (39) 歐洲夾竹桃 (<i>Nerium oleander</i>) (40) 菸草 (<i>Nicotiana tabacum</i>) (41) 橄欖 (<i>Olea europaea</i>) (42) 稻 (<i>Oryza sativa</i>) (43) 百香果 (<i>Passiflora edulis</i>) (44) 酪梨 (<i>Persea americana</i>) (45) 花豆 (<i>Phaseolus coccineus</i>) (46) 菜豆	(47) 匈牙利 (48) 愛爾蘭 (49) 義大利 (50) 拉脫維亞 (51) 立陶宛 (52) 馬其頓 (53) 摩爾多瓦 (54) 荷蘭 (55) 波蘭 (56) 葡萄牙 (57) 羅馬尼亞 (58) 塞爾維亞 (59) 斯洛維尼亞 (60) 西班牙 (61) 瑞典 (62) 瑞士 (63) 英國 (64) 烏克蘭 北美 (65) 加拿大 (66) 墨西哥 (67) 美國 中南美 (68) 阿根廷 (69) 巴貝多 (70) 巴西 (71) 智利 (72) 薩爾瓦多 (73) 瓜地馬拉 (74) 宏都拉斯 (75) 巴拿馬 (76) 波多黎各 (77) 烏拉圭 (78) 委內瑞拉			
---	---	--	--	---	--	--	--	--

(47)菜豆(<i>Phaseolus lunatus</i>)				(<i>Phaseolus lunatus</i>)				
(48)敏豆(<i>Phaseolus vulgaris</i>)				(47) 敏豆 (<i>Phaseolus vulgaris</i>)				
(49)山梅花屬 (<i>Philadelphus</i> spp.)				(48) 山梅花屬 (<i>Philadelphus</i> spp.)				
(50)放射松 (<i>Pinus radiata</i>)				(49) 放射松 (<i>Pinus radiata</i>)				
(51)胡椒 (<i>Piper nigrum</i>)				(50) 胡椒 (<i>Piper nigrum</i>)				
(52)豌豆 (<i>Pisum sativum</i>)				(51) 豌豆 (<i>Pisum sativum</i>)				
(53)楊屬 (<i>Populus</i> spp.)				(52) 楊屬 (<i>Populus</i> spp.)				
(54)李屬 (<i>Prunus</i> spp.)				(53) 李屬 (<i>Prunus</i> spp.)				
(55)梨屬 (<i>Pyrus</i> spp.)				(54) 梨屬 (<i>Pyrus</i> spp.)				
(56)杜鵑花屬 (<i>Rhododendron</i> spp.)				(55) 杜鵑花屬 (<i>Rhododendron</i> spp.)				
(57)薔薇屬 (<i>Rosa</i> spp.)				(56) 薔薇屬 (<i>Rosa</i> spp.)				
(58)柳屬 (<i>Salix</i> spp.)				(57) 柳屬 (<i>Salix</i> spp.)				
(59)樹番茄(<i>Solanum betaceum</i> = <i>Cyphomandra betacea</i>)				(58) 樹番茄(<i>Solanum betaceum</i> = <i>Cyphomandra betacea</i>)				
(60)番茄 (<i>Solanum lycopersicum</i> = <i>Lycopersicon</i> <i>esculentum</i>)				(59) 番茄 (<i>Solanum lycopersicum</i> = <i>Lycopersium</i> <i>esculentum</i>)				
(61)高粱 (<i>Sorghum bicolor</i>)				(60) 高粱 (<i>Sorghum bicolor</i>)				
(62)小麥 (<i>Triticum aestivum</i>)				(61) 小麥 (<i>Triticum aestivum</i>)				
(63)油桐 (<i>Vernicia fordii</i> = <i>Aleurites fordii</i>)				(62) 油桐 (<i>Vernicia fordii</i> = <i>Aleurites fordii</i>)				
(64)蠶豆屬 (<i>Vicia</i> spp.)				(63) 蠶豆屬 (<i>Vicia</i> spp.)				
(65)豇豆屬 (<i>Vigna</i> spp.)				(64) 豇豆屬 (<i>Vigna</i> spp.)				
(66)葡萄屬				(65) 葡萄屬 (<i>Vitis</i> spp.)				

(<i>Vitis</i> spp.) (67)玉米 (<i>Zea mays</i>) II. 下列繁殖用種子： (1) 瓜爾豆 (<i>Cyamopsis tetra- gonoloba</i>) (2) 大豆 (<i>Glycine max</i>) (3) 白花鵲豆(<i>Lablab purpureus</i>) (4) 稻 (<i>Oryza sativa</i>) (5) 花豆(<i>Phaseolus coccineus</i>) (6) 菜豆 (<i>Phaseolus lunatus</i>) (7) 敏豆 (<i>Phaseolus vulgaris</i>) (8) 豌豆 (<i>Pisum sativum</i>) (9) 高粱 (<i>Sorghum bicolor</i>) (10) 小麥 (<i>Triticum aestivum</i>) (11) 蠶豆屬 (<i>Vicia</i> spp.) (12) 豇豆屬 (<i>Vigna</i> spp.)				(66) 玉米 (<i>Zea mays</i>) II. 下列繁殖用種子： (1)瓜爾豆 (<i>Cyamopsis tetra- gonoloba</i>) (2)大豆 (<i>Glycine max</i>) (3)白花鵲豆 (<i>Lablab purpureus</i>) (4)稻 (<i>Oryza sativa</i>) (5)花豆(<i>Phaseolus coccineus</i>) (6)菜豆 (<i>Phaseolus lunatus</i>) (7)敏豆 (<i>Phaseolus vulgaris</i>) (8) 豌豆 (<i>Pisum sativum</i>) (9)高粱 (<i>Sorghum bicolor</i>) (10)小麥 (<i>Triticum aestivum</i>) (11)蠶豆屬 (<i>Vicia</i> spp.) (12)豇豆屬 (<i>Vigna</i> spp.)				
植物名稱及其部位	國家或地區	病蟲害名稱	檢疫條件	植物名稱及其部位	國家或地區	病蟲害名稱	檢疫條件	經查我國外交部將烏克蘭歸列於歐洲地區、白俄羅斯歸列於亞洲地區，然現行本點重複登載烏克蘭於亞洲及歐洲地區，故爰予刪除重複項目，並將白俄羅斯移列於亞洲。另依英文國名字首，酌予調整克羅埃西亞、芬蘭、科索沃、拉脫維亞、盧森堡、挪威及英國等國家排序，並遞移其他國家或地區排序。
39.下列繁殖用生植株： (1) 西洋芹 (<i>Apium graveolens</i>) (2) 辣根 (<i>Armoracia rusticana</i>) (3) 甜菜 (<i>Beta vulgaris</i>) (4) 胡瓜 (<i>Cucumis sativus</i>) (5) 紅藜 (<i>Chenopodium giganteum</i> = <i>C. album subsp.</i>	亞洲及太平洋地區 (1)澳大利亞 (2)白俄羅斯 (3)日本 (4)印度 (5)伊朗 (6)哈薩克 (7)黎巴嫩 (8)紐西蘭 (9)敘利亞 (10)俄羅斯聯邦 (11)土耳其	南芥嵌紋病毒 (<i>Arabis mosaic virus</i> (Nepovirus))	應檢附輸出國植物 檢疫機關(構)簽發 之植物檢疫證明書， 證明經田間檢疫或 於輸出前經實驗室 檢測未罹染南芥嵌 紋病毒，否則銷燬或 退運。	39.下列繁殖用生植株： (1) 西洋芹 (<i>Apium graveolens</i>) (2) 辣根 (<i>Armoracia rusticana</i>) (3) 甜菜 (<i>Beta vulgaris</i>) (4) 胡瓜 (<i>Cucumis sativus</i>) (5) 紅藜 (<i>Chenopodium giganteum</i> = <i>C. album subsp.</i>	亞洲及太平洋地區 (1) 澳大利亞 (2) 日本 (3) 印度 (4) 伊朗 (5) 哈薩克 (6) 黎巴嫩 (7) 紐西蘭 (8) 敘利亞 (9) 俄羅斯聯邦 (10) 土耳其 (11)烏克蘭	南芥嵌紋病毒 (<i>Arabis mosaic virus</i> (Nepovirus))	應檢附輸出國植物 檢疫機關(構)簽發 之植物檢疫證明書， 證明經田間檢疫或 於輸出前經實驗室 檢測未罹染南芥嵌 紋病毒，否則銷燬或 退運。	

<i>amaranticolor</i>) (6) 白藜 (<i>Chenopodium quinoa</i>) (7) 胡蘿蔔 (<i>Daucus carota</i>) (8) 康乃馨 (<i>Dianthus caryophyllus</i>) (9) 豆科 (<i>Fabaceae</i>) (10) 連翹 (<i>Forsythia suspense</i>) (11) 草莓 (<i>Fragaria × ananassa</i>) (12) 唐菖蒲 (<i>Gladiolus hybridus</i>) (13) 蛇麻 (<i>Humulus lupulus</i>) (14) 萵苣 (<i>Lactuca sativa</i>) (15) 百合屬 (<i>Lilium spp.</i>) (16) 水仙屬 (<i>Narcissus spp.</i>) (17) 橄欖 (<i>Olea europaea</i>) (18) 矮牽牛屬 (<i>Petunia spp.</i>) (19) 敏豆 (<i>Phaseolus vulgaris</i>) (20) 甜櫻桃 (<i>Prunus avium</i>) (21) 杏 (<i>Prunus armeniaca</i>) (22) 歐洲酸櫻桃 (<i>Prunus cerasus</i>) (23) 歐洲李 (<i>Prunus domestica</i>) (24) 扁桃 (<i>Prunus dulcis</i>) (25) 桂櫻 (<i>Prunus laurocerasus</i>) (26) 桃	非洲 (12)埃及 (13)南非 歐洲 (14)奧地利 (15)比利時 (16)保加利亞 (17)克羅埃西亞 (18)捷克 (19)丹麥 (20)芬蘭 (21)法國 (22)德國 (23)匈牙利 (24)愛爾蘭 (25)義大利 (26)科索沃 (27)拉脫維亞 (28)盧森堡 (29)摩爾達維亞 (30)蒙特內哥羅 (31)荷蘭 (32)挪威 (33)波蘭 (34)羅馬尼亞 (35)塞爾維亞 (36)斯洛維尼亞 (37)西班牙 (38)瑞典 (39)瑞士 (40)烏克蘭 (41)英國 北美 (42)加拿大 (43)墨西哥 (44)美國 中南美 (45)智利			<i>amaranticolor</i>) (6)白藜 (<i>Chenopodium quinoa</i>) (7)胡蘿蔔 (<i>Daucus carota</i>) (8)康乃馨 (<i>Dianthus caryophyllus</i>) (9)豆科 (<i>Fabaceae</i>) (10)連翹 (<i>Forsythia suspense</i>) (11)草莓 (<i>Fragaria × ananassa</i>) (12)唐菖蒲 (<i>Gladiolus hybridus</i>) (13)蛇麻 (<i>Humulus lupulus</i>) (14)萵苣 (<i>Lactuca sativa</i>) (15)百合屬 (<i>Lilium spp.</i>) (16)水仙屬 (<i>Narcissus spp.</i>) (17)橄欖 (<i>Olea europaea</i>) (18)矮牽牛屬 (<i>Petunia spp.</i>) (19)敏豆 (<i>Phaseolus vulgaris</i>) (20)甜櫻桃 (<i>Prunus avium</i>) (21)杏 (<i>Prunus armeniaca</i>) (22)歐洲酸櫻桃 (<i>Prunus cerasus</i>) (23)歐洲李 (<i>Prunus domestica</i>) (24)扁桃 (<i>Prunus dulcis</i>) (25)桂櫻 (<i>Prunus laurocerasus</i>) (26)桃	非洲 (12)埃及 (13)南非 歐洲 (14)奧地利 (15)比利時 (16)保加利亞 (17)白俄羅斯 (18)捷克 (19)丹麥 (20)法國 (21)德國 (22)挪威 (23)克羅埃西亞 (24)匈牙利 (25)愛爾蘭 (26)義大利 (27)盧森堡 (28)拉脫維亞 (29)摩爾達維亞 (30)蒙特內哥羅 (31)荷蘭 (32)波蘭 (33)羅馬尼亞 (34)科索沃 (35)塞爾維亞 (36)斯洛維尼亞 (37)西班牙 (38)瑞典 (39)瑞士 (40)芬蘭 (41)英國 (42)烏克蘭 北美 (43)加拿大 (44)墨西哥 (45)美國 中南美 (46)智利			
---	--	--	--	--	--	--	--	--

(<i>Prunus persica</i>) (27) 大黃 (<i>Rheum palmatum</i>) (28) 薔薇屬 (<i>Rosa</i> spp.) (29) 覆盆子 (<i>Rubus idaeus</i>) (30) 西洋接骨木 (<i>Sambucus nigra</i>) (31) 白花苜蓿 (<i>Trifolium repens</i>) (32) 馬鞭草屬 (<i>Verbena</i> spp.) (33) 葡萄 (<i>Vitis vinifera</i>)				(<i>Prunus persica</i>) (27) 大黃 (<i>Rheum palmatum</i>) (28) 薔薇屬 (<i>Rosa</i> spp.) (29) 覆盆子 (<i>Rubus idaeus</i>) (30) 西洋接骨木 (<i>Sambucus nigra</i>) (31) 白花苜蓿 (<i>Trifolium repens</i>) (32) 馬鞭草屬 (<i>Verbena</i> spp.) (33) 葡萄 (<i>Vitis vinifera</i>)				
植物名稱及其部位	國 家 或 地 區	病 蟲 害 名 稱	檢 疫 條 件	植物名稱及其部位	國 家 或 地 區	病 蟲 害 名 稱	檢 疫 條 件	一、依據 CABI 及最新疫情資料等相關文獻，新增越南及瑞士為馬鈴薯紡錘形塊莖類病毒疫區。 二、查我國外交部將白俄羅斯歸列於亞洲地區，爰將白俄羅斯移列至亞洲，並依英文國名字首，酌予調整哈薩克、巴基斯坦、土耳其、烏克蘭及英國等國家排序，並遞移其他國家或地區排序。
40.植物名稱及其部位： I. 下列繁殖用生植株 （種子除外）： (1) 曼陀羅木屬 （ <i>Brugmansia</i> spp.） (2) 夜香木屬 （ <i>Cestrum</i> spp.） (3) 大理花屬 （ <i>Dahlia</i> spp.） (4) 曼陀羅屬 （ <i>Datura</i> spp.） (5) 藍花茄 （ <i>Lycianthes rantonnetii</i> ） (6) 酪梨 （ <i>Persea americana</i> ） (7) 好望角醋 （ <i>Physalis peruviana</i> ） (8) 果醬木 （ <i>Streptosolen jamesonii</i> ） II. 下列繁殖用生植株： (1) 番椒屬(<i>Capsicum</i> spp.) (2) 矮牽牛屬 （ <i>Petunia</i> spp.） (3) 茄屬(<i>Solanum</i> spp.)	亞洲及太平洋地區 (1)阿富汗 (2)澳大利亞 (3)亞塞拜然 (4)白俄羅斯 (5)孟加拉 (6)中國大陸 (7)喬治亞 (8)印度 (9)伊朗 (10)以色列 (11)日本 (12)哈薩克 (13)巴基斯坦 (14)土耳其 (15)越南 非洲 (16)埃及 (17)奈及利亞 (18)迦納 (19)烏干達 (20)肯亞 歐洲 (21)奧地利 (22)比利時	馬鈴薯紡錘形塊莖類病毒 (<i>Potato spindle tuber viroid</i> , PSTVd)	應檢附輸出國植物檢疫機關(構)簽發之植物檢疫證明書，證明於輸出前經實驗室檢測未罹染馬鈴薯紡錘形塊莖類病毒，否則銷燬或退運。	40.植物名稱及其部位： I. 下列繁殖用生植株 （種子除外）： (1) 曼陀羅木屬 （ <i>Brugmansia</i> spp.） (2) 夜香木屬 （ <i>Cestrum</i> spp.） (3) 大理花屬 （ <i>Dahlia</i> spp.） (4) 曼陀羅屬 （ <i>Datura</i> spp.） (5) 藍花茄 （ <i>Lycianthes rantonnetii</i> ） (6) 酪梨 （ <i>Persea americana</i> ） (7) 好望角醋栗 （ <i>Physalis peruviana</i> ） (8) 果醬木 （ <i>Streptosolen jamesonii</i> ） II. 下列繁殖用生植株： (1) 番椒屬 （ <i>Capsicum</i> spp.） (2) 矮牽牛屬 （ <i>Petunia</i> spp.） (3) 茄屬	亞洲及太平洋地區 (1)阿富汗 (2)澳大利亞 (3)亞塞拜然 (4)孟加拉 (5)中國大陸 (6)喬治亞 (7)印度 (8)伊朗 (9)以色列 (10)日本 (11)土耳其 (12)哈薩克 (13)巴基斯坦 非洲 (14)埃及 (15)奈及利亞 (16)迦納 (17)烏干達 (18)肯亞 歐洲 (19)奧地利 (20)白俄羅斯 (21)比利時 (22)克羅埃西亞	馬鈴薯紡錘形塊莖類病毒 (<i>Potato spindle tuber viroid</i> , PSTVd)	應檢附輸出國植物檢疫機關(構)簽發之植物檢疫證明書，證明於輸出前經實驗室檢測未罹染馬鈴薯紡錘形塊莖類病毒，否則銷燬或退運。	

				(<i>Solanum</i> spp.)	(23)捷克 (24)德國 (25)希臘 (26)匈牙利 (27)義大利 (28)馬爾他 (29)蒙特內哥羅 (30)荷蘭 (31)波蘭 (32)俄羅斯聯邦 (33)斯洛維尼亞 (34)西班牙 (35)英國 (36)烏克蘭 北美 (37)墨西哥 中南美 (38)巴西 (39)哥斯大黎加 (40)多明尼加 (41)秘魯 (42)委內瑞拉			
植物名稱及其部位	國家或地區	病蟲害名稱	檢疫條件	植物名稱及其部位	國家或地區	病蟲害名稱	檢疫條件	依據 CABI 及最新疫情資料等相關文獻，新增紐西蘭、南韓及加拿大(亞伯達省及魁北克省)為香瓜茄嵌紋病毒疫區，並依英文國名字首排序，酌予調整塞爾維亞及烏克蘭等國家排序，並遞移其他國家或地區排序。
41.下列繁殖用生植株： (1) 曼陀羅 (<i>Datura stramonium</i>) (2) 羅勒 (<i>Ocimum basilicum</i>) (3) 茄屬 (<i>Solanum</i> spp.)	亞洲及太平洋地區 (1) 中國大陸 (2) 以色列 (3) 紐西蘭 (4) 南韓 (5) 敘利亞 (6) 土耳其 非洲 (7) 卡那利群島(西班牙屬) (8) 南非 (9) 埃及 (10) 摩洛哥 歐洲	香瓜茄嵌紋病毒 (<i>Pepino mosaic virus</i> (Potexvirus))	1. 繁殖用生植株應檢附輸出國植物檢疫機關(構)簽發之植物檢疫證明書，證明經田間檢疫或於輸出前經實驗室檢測未染香瓜茄嵌紋病毒，否則銷燬或退運。 2. 繁殖用種子應檢附輸出國植物檢疫機關(構)簽發之植物檢疫證明書，證明下列條	41.下列繁殖用生植株： (1) 曼陀羅 (<i>Datura stramonium</i>) (2) 羅勒 (<i>Ocimum basilicum</i>) (3) 茄屬 (<i>Solanum</i> spp.)	亞洲及太平洋地區 (1)敘利亞 (2)土耳其 (3)中國大陸 (4)以色列 (5)土耳其 非洲 (6) 卡那利群島(西班牙屬) (7) 南非 (8) 埃及 (9) 摩洛哥 歐洲 (10) 奧地利	香瓜茄嵌紋病毒 (<i>Pepino mosaic virus</i> (Potexvirus))	1. 繁殖用生植株應檢附輸出國植物檢疫機關(構)簽發之植物檢疫證明書，證明經田間檢疫或於輸出前經實驗室檢測未染香瓜茄嵌紋病毒，否則銷燬或退運。 2. 繁殖用種子應檢附輸出國植物檢疫機關(構)簽發之植物檢疫證明書，證明下列條	

	(11) 奧地利 (12) 比利時 (13) 保加利亞 (14) 賽普勒斯 (15) 丹麥 (16) 法國 (17) 德國 (18) 希臘 (19) 匈牙利 (20) 愛爾蘭 (21) 義大利 (22) 立陶宛 (23) 荷蘭 (24) 波蘭 (25) 塞爾維亞 (26) 西班牙 (27) 瑞士 (28) 烏克蘭 (29) 英國 北美 (30) 加拿大(亞伯達省、英屬哥倫比亞省、安大略省及魁北克省) (31) 墨西哥 (32) 美國(阿拉巴馬州、亞利桑那州、加利福尼亞州、科羅拉多州、佛羅里達州、馬里蘭州、明尼蘇達州、奧克拉荷馬州、德克薩斯州) 中南美 (33) 智利 (34) 厄瓜多		件之一，否則銷燬或退運： (1) 經田間檢疫未染香瓜茄嵌紋病毒，並於採種後經磷酸三鈉檢疫處理。 (2) 輸出前經實驗室檢測未染香瓜茄嵌紋病毒。		(11) 比利時 (12) 保加利亞 (13) 賽普勒斯 (14) 丹麥 (15) 法國 (16) 德國 (17) 希臘 (18) 匈牙利 (19) 愛爾蘭 (20) 義大利 (21) 立陶宛 (22) 荷蘭 (23) 波蘭 (24) 西班牙 (25) 瑞士 (26) 烏克蘭 (27) 塞爾維亞 (28) 英國 北美 (29) 加拿大(英屬哥倫比亞省及安大略省) (30) 墨西哥 (31) 美國(阿拉巴馬州、亞利桑那州、加利福尼亞州、科羅拉多州、佛羅里達州、馬里蘭州、明尼蘇達州、奧克拉荷馬州、德克薩斯州) 中南美 (32) 智利 (33) 厄瓜多 (34) 秘魯		件之一，否則銷燬或退運： (1) 經田間檢疫未染香瓜茄嵌紋病毒，並於採種後經磷酸三鈉檢疫處理。 (2) 輸出前經實驗室檢測未染香瓜茄嵌紋病毒。	
--	--	--	--	--	---	--	--	--

	(35) 秘魯							
植物名稱及其部位	國家或地區	病蟲害名稱	檢疫條件	植物名稱及其部位	國家或地區	病蟲害名稱	檢疫條件	一、依據 CABI、EPPO 及最新疫情資料等相關文獻，番茄褐皺果病毒除由種子傳播，亦可能透過種苗傳播，爰將寄主部位修正為「繁殖用生植株之全部或部分」。 二、新增澳大利亞、伊朗、伊拉克、黎巴嫩、俄羅斯聯邦、沙烏地阿拉伯、敘利亞、烏茲別克、埃及、摩洛哥、阿爾巴尼亞、奧地利、保加利亞、克羅埃西亞、愛沙尼亞、芬蘭、匈牙利、愛爾蘭、澤西島(英屬)、拉脫維亞、立陶宛、馬爾他、挪威、葡萄牙、斯洛伐克、斯洛維尼亞、瑞士、加拿大、阿根廷及哥倫比亞為番茄褐皺果病毒疫區，並遞移其他國家或地區排序。
42.下列繁殖用 <u>生植株之全部或部分</u> ： (1) 番椒屬 (<i>Capsicum</i> spp.) (2) 番茄 (<i>Solanum lycopersicum</i> = <i>Lycopersicon esculentum</i>)	亞洲及太平洋地區 (1)澳大利亞 (2)中國大陸 (3)印度 (4)伊朗 (5)伊拉克 (6)以色列 (7)日本 (8)約旦 (9)黎巴嫩 (10)巴勒斯坦 (11)俄羅斯聯邦 (12)沙烏地阿拉伯 (13)敘利亞 (14)泰國 (15)土耳其 (16)烏茲別克 非洲 (17)埃及 (18)衣索比亞 (19)摩洛哥 歐洲 (20)阿爾巴尼亞 (21)奧地利 (22)比利時 (23)保加利亞 (24)克羅埃西亞 (25)賽普勒斯 (26)捷克 (27)愛沙尼亞 (28)芬蘭 (29)法國 (30)德國 (31)希臘 (32)匈牙利 (33)愛爾蘭	番茄褐皺果病毒 (<i>Tomato brown rugose fruit virus</i> (Tobamovirus))	應檢附輸出國植物檢疫機關(構)簽發之植物檢疫證明書，證明於輸出前經實驗室檢測未罹染番茄褐皺果病毒，否則銷燬或退運。	42.下列繁殖用種子： (1) 番椒屬 (<i>Capsicum</i> spp.) (2) 番茄 (<i>Solanum lycopersicum</i> = <i>Lycopersicon esculentum</i>)	亞洲及太平洋地區 (1) 中國大陸 (2) 印度 (3) 以色列 (4) 日本 (5) 約旦 (6) 巴勒斯坦 (7) 泰國 (8) 土耳其 非洲 (9) 衣索比亞 歐洲 (10) 比利時 (11) 賽普勒斯 (12) 捷克 (13) 法國 (14) 德國 (15) 希臘 (16) 義大利 (17) 荷蘭 (18) 波蘭 (19) 西班牙 (20) 英國 北美 (21) 墨西哥 (22) 美國 中南美 (23) 多明尼加 (24) 瓜地馬拉 (25) 秘魯	番茄褐皺果病毒 (<i>Tomato brown rugose fruit virus</i> (Tobamovirus))	應檢附輸出國植物檢疫機關(構)簽發之植物檢疫證明書，證明於輸出前經實驗室檢測未罹染番茄褐皺果病毒，否則銷燬或退運。	

	(34)義大利 (35)澤西島(英屬) (36)拉脫維亞 (37)立陶宛 (38)馬爾他 (39)荷蘭 (40)挪威 (41)波蘭 (42)葡萄牙 (43)斯洛伐克 (44)斯洛維尼亞 (45)西班牙 (46)瑞士 (47)英國 北美 (48)加拿大 (49)墨西哥 (50)美國 中南美 (51)阿根廷 (52)哥倫比亞 (53)多明尼加 (54)瓜地馬拉 (55)秘魯							
植物名稱及其部位	國家或地區	病蟲害名稱	檢疫條件	植物名稱及其部位	國家或地區	病蟲害名稱	檢疫條件	依據 CABI 資料及最新疫情資料等相關文獻，新增敘利亞、喀麥隆、衣索比亞、肯亞、馬拉威、納米比亞、尚比亞及千里達及托巴哥為番茄黃化捲葉病疫區。另依我國外交部資料，將亞塞拜然移列至亞洲地區，並遞移其他國家或地區排序。
43.下列繁殖用種子： (1) 番椒屬 (<i>Capsicum</i> spp.) (2) 茄屬 (<i>Solanum</i> spp.)	亞洲及太平洋地區 (1)澳大利亞 (2)亞塞拜然 (3)巴林 (4)孟加拉 (5)中國大陸 (6)法屬玻里尼西亞 (7)喬治亞 (8)印度 (9)伊朗 (10)伊拉克 (11)以色列 (12)日本 (13)約旦 (14)科威特	番茄黃化捲葉病毒 (<i>Tomato yellow leaf curl virus</i> (Begomovirus))	應檢附輸出國植物檢疫機關(構)簽發之植物檢疫證明書，證明輸出前經實驗室檢測未罹染番茄黃化捲葉病毒，否則銷燬或退運。	43.下列繁殖用種子： (1) 番椒屬 (<i>Capsicum</i> spp.) (2) 茄屬 (<i>Solanum</i> spp.)	亞洲及太平洋地區 (1)澳大利亞 (2)巴林 (3)孟加拉 (4)中國大陸 (5)法屬玻里尼西亞 (6)喬治亞 (7)印度 (8)伊朗 (9)伊拉克 (10)以色列 (11)日本 (12)約旦 (13)科威特 (14)寮國	番茄黃化捲葉病毒 (<i>Tomato yellow leaf curl virus</i> (Begomovirus))	應檢附輸出國植物檢疫機關(構)簽發之植物檢疫證明書，證明輸出前經實驗室檢測未罹染番茄黃化捲葉病毒，否則銷燬或退運。	

	(15)寮國 (16)緬甸 (17)黎巴嫩 (18)尼泊爾 (19)新喀里多尼亞 (20)阿曼 (21)巴基斯坦 (22)沙烏地阿拉伯 (23)南韓 (24)敘利亞 (25)泰國 (26)土耳其 (27)阿拉伯聯合大公國 (28)葉門 非洲 (29)阿爾及利亞 (30)貝南 (31)布吉納法索 (32)維德角 (33)喀麥隆 (34)象牙海岸 (35)埃及 (36)衣索比亞 (37)迦納 (38)肯亞 (39)利比亞 (40)馬拉威 (41)馬利 (42)模里西斯 (43)摩洛哥 (44)納米比亞 (45)奈及利亞 (46)留尼旺 (47)塞內加爾 (48)蘇丹 (49)坦尚尼亞 (50)突尼西亞 (51)烏干達 (52)尚比亞 歐洲 (53)賽普勒斯				(15) 緬甸 (16) 黎巴嫩 (17) 尼泊爾 (18) 新喀里多尼亞 (19) 阿曼 (20) 巴基斯坦 (21) 沙烏地阿拉伯 (22) 南韓 (23) 泰國 (24) 土耳其 (25) 阿拉伯聯合大公國 (26) 葉門 非洲 (27) 阿爾及利亞 (28) 貝南 (29) 布吉納法索 (30) 維德角 (31) 象牙海岸 (32) 埃及 (33) 迦納 (34) 利比亞 (35) 馬利 (36) 模里西斯 (37) 摩洛哥 (38) 奈及利亞 (39) 留尼旺 (40) 塞內加爾 (41) 蘇丹 (42) 坦尚尼亞 (43) 突尼西亞 (44) 烏干達 (45) 亞塞拜然 歐洲 (46) 賽普勒斯 (47) 法國 (48) 希臘 (49) 義大利 (50) 馬爾他 (51) 葡萄牙 (52) 西班牙			
--	---	--	--	--	---	--	--	--

	(54)法國 (55)希臘 (56)義大利 (57)馬爾他 (58)葡萄牙 (59)西班牙 (60)瑞士 北美 (61)墨西哥 (62)美國 中南美 (63)巴哈馬 (64)哥斯大黎加 (65)古巴 (66)多米尼克 (67)多明尼加 (68)格瑞那達 (69)瓜地洛普 (70)瓜地馬拉 (71)牙買加 (72)馬丁尼克 (73)波多黎各 (74)聖克里斯多福 及尼維斯 (75)千里達及托巴 哥 (76)委內瑞拉				(53) 瑞士 北美 (54) 墨西哥 (55) 美國 中南美 (56) 巴哈馬 (57) 哥斯大黎加 (58) 古巴 (59) 多米尼克 (60) 多明尼加 (61) 格瑞那達 (62) 瓜地洛普 (63) 瓜地馬拉 (64) 牙買加 (65) 馬丁尼克 (66) 波多黎各 (67) 聖克里斯多福 及尼維斯 (68) 委內瑞拉			
植物名稱及其部位	國 家 或 地 區	病 蟲 害 名 稱	檢 疫 條 件	植物名稱及其部位	國 家 或 地 區	病 蟲 害 名 稱	檢 疫 條 件	依據 CABI 及最新疫情資料等相關文獻，新增印度、模里西斯、德國及荷蘭為番茄斑駁嵌紋病毒疫區，並遞移其他國家或地區排序。
44.下列繁殖用種子： (1) 番椒屬 (Capsicum spp.) (2) 茄屬 (Solanum spp.)	亞洲及太平洋地區 (1)中國大陸 (2)印度 (3)伊朗 (4)以色列 (5)越南 非洲 (6)模里西斯 歐洲 (7)捷克 (8)德國 (9)荷蘭 (10)西班牙	番茄斑駁嵌紋病毒 (Tomato mottle mosaic virus)	應檢附輸出國植物 檢疫機關(構)簽發 之植物檢疫證明書， 證明輸出前經實驗 室檢測未罹染番茄 斑駁嵌紋病毒，否則 銷燬或退運。	44.下列繁殖用種子： (1) 番椒屬 (Capsicum spp.) (2) 茄屬 (Solanum spp.)	亞洲及太平洋地區 (1) 中國大陸 (2) 伊朗 (3) 以色列 (4) 越南 歐洲 (5) 捷克 (6) 西班牙 北美 (7) 墨西哥 (8) 美國 中南美 (9) 巴西	番茄斑駁嵌紋病毒 (Tomato mottle mosaic virus)	應檢附輸出國植物 檢疫機關(構)簽發 之植物檢疫證明書， 證明輸出前經實驗 室檢測未罹染番茄 斑駁嵌紋病毒，否則 銷燬或退運。	

	北美 (11)墨西哥 (12)美國 中南美 (13)巴西							
植物名稱及其部位	國 家 或 地 區	病 蟲 害 名 稱	檢 疫 條 件	植物名稱及其部位	國 家 或 地 區	病 蟲 害 名 稱	檢 疫 條 件	依據 CABI、EPPO 及最新疫情資料等相關文獻，新增土耳其為番 椒小果類病毒疫區，並遞移其他 國家或地區排序。
45.下列繁殖用種子： (1) 番椒 (<i>Capsicum annuum</i>) (2) 茄屬 (<i>Solanum</i> spp.)	亞洲及太平洋地 區 (1)緬甸 (2)泰國 (3)土耳其 (4)越南 歐洲 (5)荷蘭 北美 (6)加拿大	番椒小果類病毒 (<i>Pepper chat fruit viroid</i> , PCFVd)	應檢附輸出國植物 檢疫機關(構)簽發 之植物檢疫證明書， 證明輸出前經實驗 室檢測未罹染番椒 小果類病毒，否則銷 燬或退運。	45.下列繁殖用種子： (1) 番椒 (<i>Capsicum annuum</i>) (2) 茄屬 (<i>Solanum</i> spp.)	亞洲及太平洋地 區 (1) 緬甸 (2) 泰國 (3) 越南 歐洲 (4) 荷蘭 北美 (5) 加拿大	番椒小果類病毒 (<i>Pepper chat fruit viroid</i> , PCFVd)	應檢附輸出國植物 檢疫機關(構)簽發 之植物檢疫證明書， 證明輸出前經實驗 室檢測未罹染番椒 小果類病毒，否則銷 燬或退運。	
植物名稱及其部位	國 家 或 地 區	病 蟲 害 名 稱	檢 疫 條 件	植物名稱及其部位	國 家 或 地 區	病 蟲 害 名 稱	檢 疫 條 件	依據 CABI 及最新疫情資料等相 關文獻，新增捷克為番茄莖頂矮 化類病毒疫區，另依我國外交部 資料修正斯洛維尼亞之國名，並 遞移其他國家或地區排序。
47.下列繁殖用種子： (1) 番椒 (<i>Capsicum annuum</i>) (2) 茄屬 (<i>Solanum</i> spp.)	亞洲及太平洋地區 (1)印尼 (2)以色列 (3)日本 (4)約旦 (5)巴勒斯坦 (6)泰國 (7)土耳其 非洲 (8)迦納 (9)塞內加爾 (10)突尼西亞 (11)象牙海岸 歐洲 (12)奧地利 (13)比利時 (14)克羅埃西亞 (15)捷克 (16)愛沙尼亞 (17)芬蘭 (18)法國 (19)德國 (20)義大利 (21)荷蘭	番茄莖頂矮化類 病毒 (<i>Tomato apical stunt viroid</i> , TASVd)	應檢附輸出國植物 檢疫機關(構)簽發 之植物檢疫證明書， 證明輸出前經實驗 室檢測未罹染番茄 莖頂矮化類病毒，否 則銷燬或退運。	47.下列繁殖用種子： (1) 番椒 (<i>Capsicum annuum</i>) (2) 茄屬 (<i>Solanum</i> spp.)	亞洲及太平洋地區 (1) 印尼 (2) 以色列 (3) 日本 (4) 約旦 (5) 巴勒斯坦 (6) 泰國 (7) 土耳其 非洲 (8) 迦納 (9) 塞內加爾 (10) 突尼西亞 (11) 象牙海岸 歐洲 (12) 奧地利 (13) 比利時 (14) 克羅埃西亞 (15) 愛沙尼亞 (16) 芬蘭 (17) 法國 (18) 德國 (19) 義大利 (20) 荷蘭 (21) 波蘭	番茄莖頂矮化類 病毒 (<i>Tomato apical stunt viroid</i> , TASVd)	應檢附輸出國植物 檢疫機關(構)簽發 之植物檢疫證明書， 證明輸出前經實驗 室檢測未罹染番茄 莖頂矮化類病毒，否 則銷燬或退運。	

	(22)波蘭 (23)斯洛維尼亞				(22)斯洛伐尼亞			
植物名稱及其部位	國家或地區	病蟲害名稱	檢疫條件	植物名稱及其部位	國家或地區	病蟲害名稱	檢疫條件	依據 CABI 及最新疫情資料等相關文獻，新增澳大利亞及中國大陸為番茄褪綠矮化類病毒疫區，另依我國外交部資料修正斯洛維尼亞國名，及依英文國名字首排序，酌予調整芬蘭及法國等國家排序，並遞移其他國家或地區排序。
49.下列繁殖用種子： (1) 番椒 (<i>Capsicum annuum</i>) (2) 茄屬 (<i>Solanum</i> spp.)	亞洲及太平洋地區 (1)澳大利亞 (2)中國大陸 (3)印度 歐洲 (4)捷克 (5)芬蘭 (6)法國 (7)斯洛維尼亞 (8)英國 北美 (9)墨西哥 (10)美國	番茄褪綠矮化類病毒 (<i>Tomato chlorotic dwarf viroid</i> , TCDVd)	應檢附輸出國植物檢疫機關(構)簽發之植物檢疫證明書，證明輸出前經實驗室檢測未罹染番茄褪綠矮化類病毒，否則銷燬或退運。	49.下列繁殖用種子： (1) 番椒 (<i>Capsicum annuum</i>) (2) 茄屬 (<i>Solanum</i> spp.)	亞洲及太平洋地區 (1) 印度 歐洲 (2) 捷克 (3) 法國 (4) 芬蘭 (5) 斯洛伐尼亞 (6) 英國 北美 (7) 墨西哥 (8) 美國	番茄褪綠矮化類病毒 (<i>Tomato chlorotic dwarf viroid</i> , TCDVd)	應檢附輸出國植物檢疫機關(構)簽發之植物檢疫證明書，證明輸出前經實驗室檢測未罹染番茄褪綠矮化類病毒，否則銷燬或退運。	
植物名稱及其部位	國家或地區	病蟲害名稱	檢疫條件	植物名稱及其部位	國家或地區	病蟲害名稱	檢疫條件	一、依據 CABI、EPPO 及最新疫情資料等相關文獻，新增澳大利亞、南韓、埃及、波士尼亞赫塞哥維納、芬蘭、希臘、立陶宛、塞爾維亞、瑞典、瓜地馬拉、巴拿馬及哥倫比亞為鳳仙花壤疽斑點病毒疫區。另英文國名字首排序，酌予調整烏克蘭及英國等國家排序，並遞移其他國家或地區排序。 二、增列火鶴花屬（ <i>Anthurium</i> spp.）及天竺葵屬（ <i>Pelargonium</i> spp.）之繁殖用生植株為寄主，及酌修番茄、海芋等學名或其格式。
51.下列繁殖用生植株（種子除外）： (1)烏頭屬 (<i>Aconitum</i> spp.) (2)百合水仙屬 (<i>Alstroemeria</i> spp.) (3)白頭翁屬 (<i>Anemone</i> spp.) (4)火鶴花屬 (<i>Anthurium</i> spp.) (5)金魚草屬 (<i>Antirrhinum</i> spp.) (6)花生 (<i>Arachis hypogaea</i>) (7)臺灣山蘇花 (<i>Asplenium nidus</i>) (8)秋海棠屬 (<i>Begonia</i> spp.) (9)寒丁子屬 (<i>Bouvardia</i> spp.) (10)翠菊屬 (<i>Callistephus</i> spp.) (11)番椒屬 (<i>Capsicum</i> spp.) (12)菊苣	亞洲及太平洋地區 (1)澳大利亞 (2)中國大陸 (3)伊朗 (4)以色列 (5)日本 (6)南韓 (7)紐西蘭 非洲 (8)埃及 (9)烏干達 歐洲 (10)奧地利 (11)比利時 (12)波士尼亞赫塞哥維納 (13)保加利亞 (14)捷克 (15)芬蘭 (16)法國 (17)德國 (18)希臘 (19)匈牙利 (20)義大利	鳳仙花壤疽斑點病毒(<i>Impatiens necrotic spot virus</i> , Tospovirus)	應檢附輸出國植物檢疫機關（構）簽發之植物檢疫證明書，證明經田間檢疫未染鳳仙花壤疽斑點病毒，或於輸出前經實驗室檢測未染鳳仙花壤疽斑點病毒，否則銷燬或退運。	51.下列繁殖用生植株（種子除外）： (1) 烏頭屬 (<i>Aconitum</i> spp.) (2) 百合水仙屬 (<i>Alstroemeria</i> spp.) (3) 白頭翁屬 (<i>Anemone</i> spp.) (4) 金魚草屬 (<i>Antirrhinum</i> spp.) (5) 花生 (<i>Arachis hypogaea</i>) (6) 臺灣山蘇花 (<i>Asplenium nidus</i>) (7) 秋海棠屬 (<i>Begonia</i> spp.) (8) 寒丁子屬 (<i>Bouvardia</i> spp.) (9) 翠菊屬 (<i>Callistephus</i> spp.) (10) 番椒屬 (<i>Capsicum</i> spp.) (11) 菊苣 (<i>Cichorium endivia</i>)	亞洲及太平洋地區 (1) 中國大陸 (2) 伊朗 (3) 以色列 (4) 日本 (5) 紐西蘭 非洲 (6) 烏干達 歐洲 (7) 奧地利 (8) 比利時 (9) 保加利亞 (10) 捷克 (11) 法國 (12) 德國 (13) 匈牙利 (14) 義大利 (15) 馬其頓 (16) 荷蘭 (17) 波蘭 (18) 葡萄牙 (19) 斯洛維尼亞 (20) 西班牙	鳳仙花壤疽斑點病毒(<i>Impatiens necrotic spot virus</i> , Tospovirus)	應檢附輸出國植物檢疫機關（構）簽發之植物檢疫證明書，證明經田間檢疫未染鳳仙花壤疽斑點病毒，或於輸出前經實驗室檢測未染鳳仙花壤疽斑點病毒，否則銷燬或退運。	

(<i>Cichorium endivia</i>) (13) 菊屬 (<i>Chrysanthemum</i> spp. = <i>Dendranthema</i> spp.) (14) 鯨魚花屬 (<i>Columnea</i> spp.) (15) 胡瓜 (<i>Cucumis sativus</i>) (16) 仙客來(<i>Cyclamen persicum</i>) (17) 大理花屬 (<i>Dahlia</i> spp.) (18) 石斛蘭屬 (<i>Dendrobium</i> spp.) (19) 洋桔梗 (<i>Eustoma grandiflorum</i>) (20) 紫芳草 (<i>Exacum affine</i>) (21) 八角金盤 (<i>Fatsia japonica</i>) (22) 唐菖蒲屬 (<i>Gladiolus</i> spp.) (23) 大丁草屬 (<i>Gerbera</i> spp.) (24) 蜘蛛百合屬 (<i>Hymenocallis</i> spp.) (25) 鳳仙花屬 (<i>Impatiens</i> spp.) (26) 萵苣 (<i>Lactuca sativa</i>) (27) 補血草屬 (<i>Limonium</i> spp.) (28) 山梗菜屬 (<i>Lobelia</i> spp.) (29) 囊距花屬 (<i>Nemesia</i> spp.) (30) 菸草 (<i>Nicotiana tabacum</i>) (31) 羅勒 (<i>Ocimum</i>	(21) 立陶宛 (22) 荷蘭 (23) 馬其頓 (24) 波蘭 (25) 葡萄牙 (26) 塞爾維亞 (27) 斯洛維尼亞 (28) 西班牙 (29) 瑞典 (30) 烏克蘭 (31) 英國 北美 (32) 加拿大 (33) 瓜地馬拉 (34) 墨西哥 (35) 巴拿馬 (36) 美國 中南美 (37) 智利 (38) 哥倫比亞 (39) 哥斯大黎加			(12) 菊屬 (<i>Chrysanthemum</i> spp. = <i>Dendranthema</i> spp.) (13) 鯨魚花屬 (<i>Columnea</i> spp.) (14) 胡瓜 (<i>Cucumis sativus</i>) (15) 仙客來(<i>Cyclamen persicum</i>) (16) 大理花屬 (<i>Dahlia</i> spp.) (17) 石斛蘭屬 (<i>Dendrobium</i> spp.) (18) 洋桔梗 (<i>Eustoma grandiflorum</i>) (19) 紫芳草 (<i>Exacum affine</i>) (20) 八角金盤 (<i>Fatsia japonica</i>) (21) 唐菖蒲屬 (<i>Gladiolus</i> spp.) (22) 大丁草屬 (<i>Gerbera</i> spp.) (23) 蜘蛛百合屬 (<i>Hymenocallis</i> spp.) (24) 鳳仙花屬 (<i>Impatiens</i> spp.) (25) 萵苣 (<i>Lactuca sativa</i>) (26) 補血草屬 (<i>Limonium</i> spp.) (27) 山梗菜屬 (<i>Lobelia</i> spp.) (28) 囊距花屬 (<i>Nemesia</i> spp.) (29) 菸草 (<i>Nicotiana tabacum</i>) (30) 羅勒 (<i>Ocimum basilicum</i>) (31) 蝴蝶蘭屬	(21) 英國 (22) 烏克蘭 北美 (23) 加拿大 (24) 墨西哥 (25) 美國 中南美 (26) 智利 (27) 哥斯大黎加			
---	---	--	--	---	---	--	--	--

basilicum) (32)天竺葵屬 (Pelargonium spp.) (33)蝴蝶蘭屬 (Phalaenopsis spp.) (34)墨西哥酸漿 (Physalis ixocarpa) (35)海桐花屬 (Pittosporum spp.) (36)櫻草屬 (Primula spp.) (37)毛茛屬 (Ranunculus spp.) (38)懸鉤子屬 (Rubus spp.) (39)長生草屬 (Sempervivum spp.) (40)瓜葉菊 (Senecio cruentus) (41)大岩桐 (Sinningia speciosa = Gloxinia speciosa) (42)番茄 (Solanum lycopersicum = Lycopersicon esculentum) (43)馬鈴薯 (Solanum tuberosum) (44)芭葉芋屬 (Spathiphyllum spp.) (45)菠菜 (Spinacea oleracea = Spinacia oleracea) (46)萵苣纈草 (Valerianella olitoria) (47)海芋 (Zantedeschia aethiopica)				(Phalaenopsis spp.) (32)墨西哥酸漿 (Physalis ixocarpa) (33)海桐花屬 (Pittosporum spp.) (34)櫻草屬 (Primula spp.) (35)毛茛屬 (Ranunculus spp.) (36)懸鉤子屬 (Rubus spp.) (37)長生草屬 (Sempervivum spp.) (38)瓜葉菊 (Senecio cruentus) (39)大岩桐 (Sinningia speciosa = Gloxinia speciosa) (40)番茄 (Solanum lycopersicum = Lycopersicum esculentum) (41)馬鈴薯 (Solanum tuberosum) (42)芭葉芋屬 (Spathiphyllum spp.) (43)菠菜 (Spinacea oleracea = Spinacia oleracea) (44)萵苣纈草 (Valerianella olitoria) (45)海芋 (Zantedeschia aethiopica)				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

十、輸入之植物或植物產品經檢疫結果證明有下列<u>檢疫</u>有害生物存在，應經適當之檢疫處理，確定<u>檢疫</u>有害生物完全滅除後，始得輸入。無適當之檢疫處理方式可滅除該<u>檢疫</u>有害生物時，應予退運或銷燬。農業部動植物防疫檢疫署得對下列<u>檢疫</u>有害生物之上一分類群（Taxa）有害生物採取檢疫處理措施。 昆蟲類(366 種) <i>Acalolepta cervina</i> <i>Acanthoscelides obtectus</i> <i>Acanthoscelides pallidipennis</i> <i>Acleris gloverana</i> <i>Acleris variana</i> <i>Acrogonia terminalis</i> <i>Acrolepiopsis assectella</i> <i>Acropolitis rudisana</i> <i>Adoxophyes orana</i> <i>Aeolesthes sarta</i> <i>Aeolothrips fasciatus</i> <i>Aethina tumida</i> <i>Affirmaspis socotrana</i> <i>Agrilus mali</i> <i>Amorbia emigratella</i> <i>Anaphothrips obscurus</i> <i>Anastrepha grandis</i> <i>Anastrepha striata</i> <i>Anastrepha suspensa</i> <i>Anchastus swezeyi</i> <i>Anomala sulcatula</i> <i>Anthonomus bisignifer</i> <i>Anthonomus eugenii</i> <i>Anthonomus grandis</i> <i>Aonidiella lauretorum</i> <i>Aonidiella orientalis</i> <i>Aonidiella tinerfensis</i> <i>Aphis fabae</i> <i>Aphis sedi</i> <i>Apis mellifera capensis</i> <i>Apis mellifera scutellate</i> <i>Apomyelois ceratoniae</i> <i>Archips micaceana</i> <i>Argyrotaenia ljugiana</i> <i>Artitropa comus</i> <i>Aspidiotus nerii</i> <i>Aspidiotus spinosus</i> <i>Asterolecanium spp.</i> <i>Atta cephalotes</i> <i>Bactrocera albistrigata</i>	十、輸入之植物或植物產品經檢疫結果證明有下列有害生物存在，應經適當之檢疫處理，確定該有害生物完全滅除後，始得輸入。無適當之檢疫處理方式可滅除該有害生物時，應予退運或銷燬。農業部動植物防疫檢疫署得對下列有害生物之上一分類群（Taxa）有害生物採取檢疫處理措施。 昆蟲類(373 種) <i>Acalolepta cervina</i> <i>Acanthoscelides obtectus</i> <i>Acanthoscelides pallidipennis</i> <i>Acleris gloverana</i> <i>Acleris variana</i> <i>Acrogonia terminalis</i> <i>Acrolepiopsis assectella</i> <i>Acropolitis rudisana</i> <u><i>Adelges tsugae</i></u> <i>Adoxophyes orana</i> <i>Aeolesthes sarta</i> <i>Aeolothrips fasciatus</i> <i>Aethina tumida</i> <i>Affirmaspis socotrana</i> <i>Agrilus mali</i> <i>Amorbia emigratella</i> <i>Anaphothrips obscurus</i> <i>Anastrepha grandis</i> <i>Anastrepha striata</i> <i>Anastrepha suspensa</i> <i>Anchastus swezeyi</i> <i>Anomala sulcatula</i> <i>Anthonomus bisignifer</i> <i>Anthonomus eugenii</i> <i>Anthonomus grandis</i> <i>Aonidiella lauretorum</i> <i>Aonidiella orientalis</i> <i>Aonidiella tinerfensis</i> <i>Aphis fabae</i> <i>Aphis sedi</i> <i>Apis mellifera capensis</i> <i>Apis mellifera scutellate</i> <i>Apomyelois ceratoniae</i> <i>Archips micaceana</i> <i>Argyrotaenia ljugiana</i> <i>Artitropa comus</i> <i>Aspidiotus nerii</i> <i>Aspidiotus spinosus</i> <i>Asterolecanium spp.</i> <i>Atta cephalotes</i> <i>Bactrocera albistrigata</i>	一、本點所稱「有害生物」指我國關切之高檢疫風險物種，為與植物防疫檢疫法第三條第三款所定「有害生物」之廣義名詞區隔，爰修正改以「檢疫有害生物」稱之，避免民眾因混淆而誤解法規，並杜絕不肖人士臨訟卸責，完備違規輸入行為之裁罰依據。 二、依據動植物防疫檢疫署植物防檢疫諮議委員會第五十三次會議決議，經評估下列物種係為我國原生種、歸化種或已於我國廣泛分布，對該等物種持續採取檢疫管制措施已無實質效益，且為符合WTO SPS 國際規範，爰予刪除： （一）昆蟲類七種：<i>Adelges tsugae</i>、<i>Bactrocera latifrons</i>、<i>Cacopsylla chinensis</i>、<i>Grapholita molesta</i>、<i>Hypothenemus hampei</i>、<i>Leptocybe invasa</i>、<i>Spodoptera frugiperda</i>。 （二）真菌類一種：<i>Macrophomina phaseolina</i>。 （三）病毒類四種：<i>Broad bean wilt virus</i> (BBWV) (<i>Comoviridae</i>, <i>fabavirus</i>)、<i>Carnation mottle virus</i> (CarMV) (<i>Carmovirus</i>)、<i>Cucumber green mottle mosaic virus</i> (CGMMV) (<i>Tobamovirus</i>)、<i>Cucumber mosaic virus</i> subgroup II (CMV-II)(<i>Bromoviridae</i>, <i>Cucumovirus</i>) （四）雜草類二十四種：
---	--	--

<i>Bactrocera aquilonis</i> <i>Bactrocera cucumis</i> <i>Bactrocera decipiens</i> <i>Bactrocera diversa</i> <i>Bactrocera facialis</i> <i>Bactrocera frauenfeldi</i> <i>Bactrocera jarvisi</i> <i>Bactrocera kirki</i> <i>Bactrocera melanotus</i> <i>Bactrocera musae</i> <i>Bactrocera neohumeralis</i> <i>Bactrocera occipitalis</i> <i>Bactrocera oleae</i> <i>Bactrocera passiflorae</i> <i>Bactrocera psidii</i> <i>Bactrocera trivialis</i> <i>Bactrocera tuberculata</i> <i>Bactrocera umbrosa</i> <i>Bagrada hilaris</i> <i>Bactrocera xanthodes</i> <i>Bemisia cordylinidis</i> <i>Blitopertha orientalis</i> <i>Brachycaudus cardui</i> <i>Brachycaudus persicae</i> <i>Brachycerus</i> spp. <i>Brachydactyla discoidea</i> <i>Bruchophagus roddi</i> <i>Bruchus pisorum</i> <i>Bruchus rufimanus</i> <i>Bulbifer homeorhynchus</i> <i>Cacoecimorpha pronubana</i> <i>Cacyreus marshalli</i> <i>Cadra figulilella</i> <i>Callipogon relictus</i> <i>Callosobruchus analis</i> <i>Callosobruchus phaseoli</i> <i>Camponotus consobrinus</i> <i>Camponotus gigas</i> <i>Camponotus floridanus</i> <i>Camponotus herculeanus</i> <i>Camponotus japonicus</i> <i>Camponotus kiusiuensis</i> <i>Camponotus nicobarensis</i> <i>Camponotus noveboracensis</i> <i>Camponotus obscuripes</i>	<i>Bactrocera aquilonis</i> <i>Bactrocera cucumis</i> <i>Bactrocera decipiens</i> <i>Bactrocera diversa</i> <i>Bactrocera facialis</i> <i>Bactrocera frauenfeldi</i> <i>Bactrocera jarvisi</i> <i>Bactrocera kirki</i> <u><i>Bactrocera latifrons</i></u> <i>Bactrocera melanotus</i> <i>Bactrocera musae</i> <i>Bactrocera neohumeralis</i> <i>Bactrocera occipitalis</i> <i>Bactrocera oleae</i> <i>Bactrocera passiflorae</i> <i>Bactrocera psidii</i> <i>Bactrocera trivialis</i> <i>Bactrocera tuberculata</i> <i>Bactrocera umbrosa</i> <i>Bagrada hilaris</i> <i>Bactrocera xanthodes</i> <i>Bemisia cordylinidis</i> <i>Blitopertha orientalis</i> <i>Brachycaudus cardui</i> <i>Brachycaudus persicae</i> <i>Brachycerus</i> spp. <i>Brachydactyla discoidea</i> <i>Bruchophagus roddi</i> <i>Bruchus pisorum</i> <i>Bruchus rufimanus</i> <i>Bulbifer homeorhynchus</i> <i>Cacoecimorpha pronubana</i> <u><i>Cacopsylla chinensis</i></u> <i>Cacyreus marshalli</i> <i>Cadra figulilella</i> <i>Callipogon relictus</i> <i>Callosobruchus analis</i> <i>Callosobruchus phaseoli</i> <i>Camponotus consobrinus</i> <i>Camponotus gigas</i> <i>Camponotus floridanus</i> <i>Camponotus herculeanus</i> <i>Camponotus japonicus</i> <i>Camponotus kiusiuensis</i> <i>Camponotus nicobarensis</i> <i>Camponotus noveboracensis</i> <i>Camponotus obscuripes</i>	<i>Alternanthera philoxeroides</i> 、 <i>Amaranthus patulus</i> 、 <i>Ambrosia artemisiifolia</i> 、 <i>Ardisia elliptica</i> 、 <i>Aster subulatus</i> 、 <i>Bidens pilosa</i> 、 <i>Brachiaria mutica</i> 、 <i>Centrosema pubescens</i> 、 <i>Chromolaena odorata</i> 、 <i>Digitaria sanguinalis</i> 、 <i>Echinochloa crus-galli</i> 、 <i>Eichhornia crassipes</i> 、 <i>Lantana camara</i> 、 <i>Leucaena leucocephala</i> 、 <i>Mikania micrantha</i> 、 <i>Mimosa diplotrich</i> 、 <i>Nicandra physalodes</i> 、 <i>Panicum maximum</i> 、 <i>Parthenium hysterophorus</i> 、 <i>Pennisetum purpureum</i> 、 <i>Pluchea sagittalis</i> 、 <i>Portulaca oleracea</i> 、 <i>Sanvitalia procumbens</i> 、 <i>Taraxacum officinale</i> 。 (五)軟體動物一種： <i>Achatina fulica</i> 。 三、另依科學文獻，修正 <i>Solenopsis invicta</i> × <i>Solenopsis richter</i> 學名，並酌修部分屬名格式。
---	---	--

<i>Camponotus pennsylvanicus</i> <i>Camponotus sylvaticus</i> <i>Camponotus turkestanus</i> <i>Capitophorus horni</i> <i>Capua tortrix</i> <i>Cataenococcus hispidus</i> <i>Catamacta lotinana</i> <i>Ceratitis</i> spp. <i>Ceroplastes rusci</i> <i>Chaetanaphothrips signipennis</i> <i>Chalcophora japonica</i> <i>Chalcosoma</i> spp. <i>Choristoneura conflictana</i> <i>Choristoneura fumiferana</i> <i>Choristoneura occidentalis</i> <i>Choristoneura rosaceana</i> <i>Chrysomphalus diversicolor</i> <i>Chrysomphalus pinnulifer</i> <i>Cillaeopeplus swezeyi</i> <i>Citripestis eutraphera</i> <i>Citripestis sagittiferella</i> <i>Coccidohystrix insolita</i> <i>Coccus</i> spp. <i>Conoderus eveillardi</i> <i>Conoderus rufangulus</i> <i>Conopia hector</i> <i>Conotrachelus aguacatae</i> <i>Contarinia maculipennis</i> <i>Contarinia nasturtii</i> <i>Contarinia sorghicola</i> <i>Coptotermes curvignathus</i> <i>Copturus aguacatae</i> <i>Coscinoptycha improbana</i> <i>Crematogaster matsumurai</i> <i>Crematogaster teranishii</i> <i>Cryptophlebia leucotreta</i> <i>Cryptorhynchus lapathi</i> <i>Curculio davidi</i> <i>Curculio elephas</i> <i>Curculio nucum</i> <i>Cydia latiferreana</i> <i>Cydia splendana</i> <i>Dacus bivittatus</i> <i>Dacus vertebrates</i> <i>Daktulosphaira vitifoliae</i> <i>Dasineura mali</i> <i>Dendroctonus adjunctus</i>	<i>Camponotus pennsylvanicus</i> <i>Camponotus sylvaticus</i> <i>Camponotus turkestanus</i> <i>Capitophorus horni</i> <i>Capua tortrix</i> <i>Cataenococcus hispidus</i> <i>Catamacta lotinana</i> <i>Ceratitis</i> spp. <i>Ceroplastes rusci</i> <i>Chaetanaphothrips signipennis</i> <i>Chalcophora japonica</i> <i>Chalcosoma</i> spp. <i>Choristoneura conflictana</i> <i>Choristoneura fumiferana</i> <i>Choristoneura occidentalis</i> <i>Choristoneura rosaceana</i> <i>Chrysomphalus diversicolor</i> <i>Chrysomphalus pinnulifer</i> <i>Cillaeopeplus swezeyi</i> <i>Citripestis eutraphera</i> <i>Citripestis sagittiferella</i> <i>Coccidohystrix insolita</i> <i>Coccus</i> spp. <i>Conoderus eveillardi</i> <i>Conoderus rufangulus</i> <i>Conopia hector</i> <i>Conotrachelus aguacatae</i> <i>Contarinia maculipennis</i> <i>Contarinia nasturtii</i> <i>Contarinia sorghicola</i> <i>Coptotermes curvignathus</i> <i>Copturus aguacatae</i> <i>Coscinoptycha improbana</i> <i>Crematogaster matsumurai</i> <i>Crematogaster teranishii</i> <i>Cryptophlebia leucotreta</i> <i>Cryptorhynchus lapathi</i> <i>Curculio davidi</i> <i>Curculio elephas</i> <i>Curculio nucum</i> <i>Cydia latiferreana</i> <i>Cydia splendana</i> <i>Dacus bivittatus</i> <i>Dacus vertebrates</i> <i>Daktulosphaira vitifoliae</i> <i>Dasineura mali</i> <i>Dendroctonus adjunctus</i>	
--	--	--

<i>Dendroctonus ponderosae</i> <i>Dendroctonus rufipennis</i> <i>Dendrolimus sibiricus</i> <i>Delia antique</i> <i>Delia platura</i> <i>Diabrotica barberi</i> <i>Diabrotica speciosa</i> <i>Diabrotica undecimpunctata</i> <i>Diabrotica virgifera virgifera</i> <i>Diaprepes abbreviatus</i> <i>Diaspidiotus gigas</i> <i>Diaspidiotus ostreaeformis</i> <i>Diaspidiotus pyri</i> <i>Diatraea saccharalis</i> <i>Dilobopterus costalimai</i> <i>Dociostaurus maroccanus</i> <i>Dorcus parallelipipedus</i> <i>Draeculacephala minerva</i> <i>Dreyfusia piceae</i> <i>Drosophila suzukii</i> <i>Dryocoetes confusus</i> <i>Dryocosmus kuriphilus</i> <i>Dysmicoccus nesophilus</i> <i>Dyspessa ulula</i> <i>Earias vittella</i> <i>Echinothrips americanus</i> <i>Elytroteinus subtruncatus</i> <i>Epitrix cucumeris</i> <i>Epitrix tuberis</i> <i>Eriosoma lanigerum</i> <i>Eublemma rufimixta</i> <i>Eucalymnatus tessellatus</i> <i>Euproctis chrysorrhoea</i> <i>Eurytoma laricis</i> <i>Eustalodes anthivora</i> <i>Exosoma lusitanica</i> <i>Frankliniella spp.</i> <i>Furcaspis oceanica</i> <i>Glaucothrips glaucus</i> <i>Gnathotrichus sulcatus</i> <i>Gonipterus gibberus</i> <i>Graphocephala atropunctata</i> <i>Grapholita dimorpha</i> <i>Grapholita funebrana</i> <i>Grapholita inopinata</i>	<i>Dendroctonus ponderosae</i> <i>Dendroctonus rufipennis</i> <i>Dendrolimus sibiricus</i> <i>Delia antique</i> <i>Delia platura</i> <i>Diabrotica barberi</i> <i>Diabrotica speciosa</i> <i>Diabrotica undecimpunctata</i> <i>Diabrotica virgifera virgifera</i> <i>Diaprepes abbreviatus</i> <i>Diaspidiotus gigas</i> <i>Diaspidiotus ostreaeformis</i> <i>Diaspidiotus pyri</i> <i>Diatraea saccharalis</i> <i>Dilobopterus costalimai</i> <i>Dociostaurus maroccanus</i> <i>Dorcus parallelipipedus</i> <i>Draeculacephala minerva</i> <i>Dreyfusia piceae</i> <i>Drosophila suzukii</i> <i>Dryocoetes confusus</i> <i>Dryocosmus kuriphilus</i> <i>Dysmicoccus nesophilus</i> <i>Dyspessa ulula</i> <i>Earias vittella</i> <i>Echinothrips americanus</i> <i>Elytroteinus subtruncatus</i> <i>Epitrix cucumeris</i> <i>Epitrix tuberis</i> <i>Eriosoma lanigerum</i> <i>Eublemma rufimixta</i> <i>Eucalymnatus tessellatus</i> <i>Euproctis chrysorrhoea</i> <i>Eurytoma laricis</i> <i>Eustalodes anthivora</i> <i>Exosoma lusitanica</i> <i>Frankliniella spp.</i> <i>Furcaspis oceanica</i> <i>Glaucothrips glaucus</i> <i>Gnathotrichus sulcatus</i> <i>Gonipterus gibberus</i> <i>Graphocephala atropunctata</i> <i>Grapholita dimorpha</i> <i>Grapholita funebrana</i> <i>Grapholita inopinata</i> <u><i>Grapholita molesta</i></u>	
--	--	--

<i>Grapholita packardi</i> <i>Grapholita prunivora</i> <i>Heilipus lauri</i> <i>Helicoverpa zea</i> <i>Hemiberlesia cyanophylli</i> <i>Hemiberlesia palmae</i> <i>Hemimene juliana</i> <i>Hesperophanes campestris</i> <i>Heterobostrychus aequalis</i> <i>Heterogomphus</i> spp. <i>Heteronychus arator</i> <i>Holotrichia mindanaona</i> <i>Homalodisca coagulata</i> <i>Howardia biclavis</i> <i>Hylastes ater</i> <i>Hylurgopinus rufipes</i> <i>Hyphantria cunea</i> <i>Insulaspis orsoni</i> <i>Ips calligraphus</i> <i>Ips confusus</i> <i>Ips grandicollis</i> <i>Ips lecontei</i> <i>Ips pini</i> <i>Ips plastographus</i> <i>Ips typographus</i> <i>Iridomyrmex cordatus</i> <i>Iridomyrmex humilis</i> = <i>Linepithema humile</i> <i>Iridomyrmex purpureus</i> <i>Ischnaspis longirostris</i> <i>Kandyosilis cochleata</i> <i>Kytorhinus immixtus</i> <i>Laspeyresia</i> spp. <i>Lepidosaphes salicina</i> <i>Lepidosaphes tokionis</i> <i>Leucoptera malifoliella</i> <i>Limenius californicus</i> <i>Liposcelis decolor</i> <i>Listroderes subcinctus</i> <i>Listrionotus bonariensis</i> <i>Lobesia botrana</i> <i>Locusta migratoria</i> <i>Lopholeucaspis cockerelli</i> <i>Lymantria dispar</i> <i>Lymantria monacha</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i>	<i>Grapholita packardi</i> <i>Grapholita prunivora</i> <i>Heilipus lauri</i> <i>Helicoverpa zea</i> <i>Hemiberlesia cyanophylli</i> <i>Hemiberlesia palmae</i> <i>Hemimene juliana</i> <i>Hesperophanes campestris</i> <i>Heterobostrychus aequalis</i> <i>Heterogomphus</i> spp. <i>Heteronychus arator</i> <i>Holotrichia mindanaona</i> <i>Homalodisca coagulata</i> <i>Howardia biclavis</i> <i>Hylastes ater</i> <i>Hylurgopinus rufipes</i> <i>Hyphantria cunea</i> <u><i>Hypothenemus hampei</i></u> <i>Insulaspis orsoni</i> <i>Ips calligraphus</i> <i>Ips confusus</i> <i>Ips grandicollis</i> <i>Ips lecontei</i> <i>Ips pini</i> <i>Ips plastographus</i> <i>Ips typographus</i> <i>Iridomyrmex cordatus</i> <i>Iridomyrmex humilis</i> = <i>Linepithema humile</i> <i>Iridomyrmex purpureus</i> <i>Ischnaspis longirostris</i> <i>Kandyosilis cochleata</i> <i>Kytorhinus immixtus</i> <i>Laspeyresia</i> spp. <i>Lepidosaphes salicina</i> <i>Lepidosaphes tokionis</i> <u><i>Leptocybe invasa</i></u> <i>Leucoptera malifoliella</i> <i>Limenius californicus</i> <i>Liposcelis decolor</i> <i>Listroderes subcinctus</i> <i>Listrionotus bonariensis</i> <i>Lobesia botrana</i> <i>Locusta migratoria</i> <i>Lopholeucaspis cockerelli</i> <i>Lymantria dispar</i> <i>Lymantria monacha</i> <i>Macrosiphum euphorbiae</i>	
--	---	--

<i>Malacosoma americanum</i> <i>Malacosoma disstria</i> <i>Margarodes prieskaensis</i> <i>Margarodes vredendalensis</i> <i>Matsucoccus matsumurae</i> <i>Mayetiola destructor</i> <i>Megalometis chilensis</i> <i>Melanaspis corticosa</i> <i>Melanaspis elaeagni</i> <i>Melanaspis nigropunctata</i> <i>Melanotus communis</i> <i>Messor aciculatus</i> <i>Messor orientalis</i> <i>Metamasius</i> spp. <i>Monema flavescens</i> <i>Monochamus</i> spp. <i>Mudaria luteileprosa</i> <i>Mudaria magniplaga</i> <i>Mycetaspis personata</i> <i>Mycetaspis sphaerioides</i> <i>Myrmicaria brunnea</i> <i>Myzus ornatus</i> <i>Nasutitermes corniger</i> <i>Naupactus xanthographus</i> <i>Nemorimyza maculosa</i> <i>Neomaskellia bergii</i> <i>Neoselenaspidus silvaticus</i> <i>Nipaecoccus nipae</i> <i>Nomadacris septemfasciata</i> <i>Nysius vinitor</i> <i>Oecophylla smaragdina</i> <i>Oncocera semirubella</i> <i>Oncometopia fascialis</i> <i>Operophtera brumata</i> <i>Opogona sacchari</i> <i>Opuntiaspis carinata</i> <i>Orgyia antiqua</i> <i>Orgyia pseudotsugata</i> <i>Orthezia insignis</i> <i>Oryctes monoceros</i> <i>Ostrinia nubilalis</i> <i>Otiorhynchus ligustici</i> <i>Oulema melanopus</i> <i>Ovaticoccus agavium</i> <i>Pammene fasciana</i> <i>Paralipsa gularis</i> <i>Paranthrene tabaniformis</i>	<i>Malacosoma americanum</i> <i>Malacosoma disstria</i> <i>Margarodes prieskaensis</i> <i>Margarodes vredendalensis</i> <i>Matsucoccus matsumurae</i> <i>Mayetiola destructor</i> <i>Megalometis chilensis</i> <i>Melanaspis corticosa</i> <i>Melanaspis elaeagni</i> <i>Melanaspis nigropunctata</i> <i>Melanotus communis</i> <i>Messor aciculatus</i> <i>Messor orientalis</i> <i>Metamasius</i> spp. <i>Monema flavescens</i> <i>Monochamus</i> spp. <i>Mudaria luteileprosa</i> <i>Mudaria magniplaga</i> <i>Mycetaspis personata</i> <i>Mycetaspis sphaerioides</i> <i>Myrmicaria brunnea</i> <i>Myzus ornatus</i> <i>Nasutitermes corniger</i> <i>Naupactus xanthographus</i> <i>Nemorimyza maculosa</i> <i>Neomaskellia bergii</i> <i>Neoselenaspidus silvaticus</i> <i>Nipaecoccus nipae</i> <i>Nomadacris septemfasciata</i> <i>Nysius vinitor</i> <i>Oecophylla smaragdina</i> <i>Oncocera semirubella</i> <i>Oncometopia fascialis</i> <i>Operophtera brumata</i> <i>Opogona sacchari</i> <i>Opuntiaspis carinata</i> <i>Orgyia antiqua</i> <i>Orgyia pseudotsugata</i> <i>Orthezia insignis</i> <i>Oryctes monoceros</i> <i>Ostrinia nubilalis</i> <i>Otiorhynchus ligustici</i> <i>Oulema melanopus</i> <i>Ovaticoccus agavium</i> <i>Pammene fasciana</i> <i>Paralipsa gularis</i> <i>Paranthrene tabaniformis</i>	
---	---	--

<i>Paraputo hispidus</i> <i>Parthenolecanium corni</i> <i>Pectinophora scutigera</i> <i>Perileuoptera coffeella</i> <i>Phalaenoides glycinae</i> <i>Phenacaspis tangana</i> <i>Phenacoccus manihoti</i> <i>Phyllophaga</i> spp. <i>Pinnaspis dracaenae</i> <i>Pinnaspis strachani</i> <i>Pissodes nemorensis</i> <i>Pissodes strobi</i> <i>Pissodes terminalis</i> <i>Pogonomyrmex occidentalis</i> <i>Pogonomyrmex rugosus</i> <i>Polyrhachis ammon</i> <i>Prays endocarpa</i> <i>Premnotypes latithorax</i> <i>Premnotypes suturicallus</i> <i>Premnotypes vorax</i> <i>Proeulia</i> spp. <i>Promecotheca cumingii</i> <i>Prosopocoilus spencei</i> <i>Prostephanus truncatus</i> <i>Proterhinus vestitus</i> <i>Pseudischnaspis bowreyi</i> <i>Pseudacrobasis tergestella</i> <i>Pseudaulacaspis dendrobii</i> <i>Pseudococcus</i> spp. <i>Pterandrus</i> spp. <i>Ptilodactyla exotica</i> <i>Pulvinaria urbicola</i> <i>Pulvinaria vitis</i> <i>Rhagoletis cerasi</i> <i>Rhagoletis cingulata</i> <i>Rhagoletis fausta</i> <i>Rhagoletis indifferens</i> <i>Rhagoletis mendax</i> <i>Rhizoecus amorphophalli</i> <i>Rhizoecus floridanus</i> <i>Rhizoecus simplex</i> <i>Rhodogastria carneola</i> <i>Rhynchophorus palmarum</i> <i>Rondotia menciana</i> <i>Sahlbergella singularis</i> <i>Sardia pluto</i> <i>Scirtothrips aurantii</i>	<i>Paraputo hispidus</i> <i>Parthenolecanium corni</i> <i>Pectinophora scutigera</i> <i>Perileuoptera coffeella</i> <i>Phalaenoides glycinae</i> <i>Phenacaspis tangana</i> <i>Phenacoccus manihoti</i> <i>Phyllophaga</i> spp. <i>Pinnaspis dracaenae</i> <i>Pinnaspis strachani</i> <i>Pissodes nemorensis</i> <i>Pissodes strobi</i> <i>Pissodes terminalis</i> <i>Pogonomyrmex occidentalis</i> <i>Pogonomyrmex rugosus</i> <i>Polyrhachis ammon</i> <i>Prays endocarpa</i> <i>Premnotypes latithorax</i> <i>Premnotypes suturicallus</i> <i>Premnotypes vorax</i> <i>Proeulia</i> spp. <i>Promecotheca cumingii</i> <i>Prosopocoilus spencei</i> <i>Prostephanus truncatus</i> <i>Proterhinus vestitus</i> <i>Pseudischnaspis bowreyi</i> <i>Pseudacrobasis tergestella</i> <i>Pseudaulacaspis dendrobii</i> <i>Pseudococcus</i> spp. <i>Pterandrus</i> spp. <i>Ptilodactyla exotica</i> <i>Pulvinaria urbicola</i> <i>Pulvinaria vitis</i> <i>Rhagoletis cerasi</i> <i>Rhagoletis cingulata</i> <i>Rhagoletis fausta</i> <i>Rhagoletis indifferens</i> <i>Rhagoletis mendax</i> <i>Rhizoecus amorphophalli</i> <i>Rhizoecus floridanus</i> <i>Rhizoecus simplex</i> <i>Rhodogastria carneola</i> <i>Rhynchophorus palmarum</i> <i>Rondotia menciana</i> <i>Sahlbergella singularis</i> <i>Sardia pluto</i> <i>Scirtothrips aurantii</i>	
---	---	--

<i>Scirtothrips citri</i> <i>Schistocerca gregaria</i> <i>Scolytus morawitzi</i> <i>Scolytus multistriatus</i> <i>Scolytus scolytus</i> <i>Scyphophorus acupunctatus</i> <i>Selenaspidus antsingyi</i> <i>Selenaspidus littoralis</i> <i>Sesamia cretica</i> <i>Sirex noctilio</i> <i>Sitophilus granarius</i> <i>Sminthurus viridis</i> <i>Solenopsis invicta</i> <i>Solenopsis richteri</i> <i>Solenopsis <u>invicta</u> × Solenopsis richteri</i> <i>Solenopsis xyloni</i> <i>Sphaeraspis vitis</i> <i>Spilonota lechriaspis</i> <i>Spilonota pyrusicola</i> <i>Spodoptera eridania</i> <i>Spodoptera littoralis</i> <i>Stenoma catenifer</i> <i>Tecia solanivora</i> <i>Tessaratoma papillosa</i> <i>Tetraponera nigra</i> <i>Tetropium castaneum</i> <i>Tetropium fuscum</i> <i>Tetropium gracilicorne</i> <i>Thrips samoensis</i> <i>Thrips spp.</i> <i>Tomicus piniperda</i> <i>Toxotrypana curvicauda</i> <i>Trichogomphus spp.</i> <i>Trioza erytraeae</i> <i>Trogoderma granarium</i> <i>Unaspis citri</i> <i>Urocerus japonicus</i> <i>Voraspis tangana</i> <i>Wasmannia auropunctata</i> <i>Xyleborus affinis</i> <i>Xyleborus ferrugineus</i> <i>Xyleborus rugatus</i> <i>Xylopsocus capucinus</i> <i>Xylotrechus altaicus</i> <i>Xylotrupes spp.</i> <i>Xyphon fulgidum</i>	<i>Scirtothrips citri</i> <i>Schistocerca gregaria</i> <i>Scolytus morawitzi</i> <i>Scolytus multistriatus</i> <i>Scolytus scolytus</i> <i>Scyphophorus acupunctatus</i> <i>Selenaspidus antsingyi</i> <i>Selenaspidus littoralis</i> <i>Sesamia cretica</i> <i>Sirex noctilio</i> <i>Sitophilus granarius</i> <i>Sminthurus viridis</i> <i>Solenopsis invicta</i> <i>Solenopsis richteri</i> <i>Solenopsis richteri × Solenopsis richteri</i> <i>Solenopsis xyloni</i> <i>Sphaeraspis vitis</i> <i>Spilonota lechriaspis</i> <i>Spilonota pyrusicola</i> <i>Spodoptera eridania</i> <i><u>Spodoptera frugiperda</u></i> <i>Spodoptera littoralis</i> <i>Stenoma catenifer</i> <i>Tecia solanivora</i> <i>Tessaratoma papillosa</i> <i>Tetraponera nigra</i> <i>Tetropium castaneum</i> <i>Tetropium fuscum</i> <i>Tetropium gracilicorne</i> <i>Thrips samoensis</i> <i>Thrips spp.</i> <i>Tomicus piniperda</i> <i>Toxotrypana curvicauda</i> <i>Trichogomphus spp.</i> <i>Trioza erytraeae</i> <i>Trogoderma granarium</i> <i>Unaspis citri</i> <i>Urocerus japonicus</i> <i>Voraspis tangana</i> <i>Wasmannia auropunctata</i> <i>Xyleborus affinis</i> <i>Xyleborus ferrugineus</i> <i>Xyleborus rugatus</i> <i>Xylopsocus capucinus</i> <i>Xylotrechus altaicus</i> <i>Xylotrupes spp.</i> <i>Xyphon fulgidum</i>	
--	---	--

<i>Yponomeuta malinellus</i> <i>Zabrotes subfasciatus</i> <i>Zonocerus elegans</i> 蟎類 (32 種) <i>Acarapis woodi</i> <i>Aculops fuchsiae</i> <i>Aculus schlechtendali</i> <i>Bryobia eharai</i> <i>Bryobia rubrioculus</i> <i>Cochlodispus operosus</i> <i>Eotetranychus carpini</i> <i>Eotetranychus pruni</i> <i>Epitrimerus pyri</i> <i>Eriophyes gossypii</i> <i>Mononychellus tanajoa</i> <i>Oligonychus gossypii</i> <i>Oligonychus grypus</i> <i>Oligonychus indicus</i> <i>Oligonychus peruvianus</i> <i>Oligonychus punicae</i> <i>Oligonychus sacchari</i> <i>Oligonychus yothersi</i> <i>Panonychus ulmi</i> <i>Petrobia latens</i> <i>Phyllocoptes aphrastus</i> <i>Phytoseius hongkongensis</i> <i>Schizotetranychus andropogoni</i> <i>Schizotetranychus asparagi</i> <i>Tetranychus canadensis</i> <i>Tetranychus marianae</i> <i>Tetranychus mcdanieli</i> <i>Tetranychus mexicanus</i> <i>Tetranychus pacificus</i> <i>Tetranychus turkestan</i> <i>Tropilaelaps clareae</i> <i>Varroa sinhai</i> 細菌類(56種) <i>Acidovorax avenae</i> subsp. <i>avenae</i> <i>Agrobacterium larrymoorei</i> <i>Agrobacterium tumefaciens</i> <i>Agrobacterium vitis</i> <i>Burkholderia andropogonis</i> <i>Burkholderia caryophylli</i> <i>Burkholderia gladioli</i> pv. <i>gladioli</i> <i>Clavibacter michiganensis</i> subsp. <i>Indidiosus</i> <i>Clavibacter michiganensis</i> subsp. <i>michiganensis</i> <i>Clavibacter michiganensis</i> subsp. <i>Sepedonicus</i>	<i>Yponomeuta malinellus</i> <i>Zabrotes subfasciatus</i> <i>Zonocerus elegans</i> 蟎類 (32 種) <i>Acarapis woodi</i> <i>Aculops fuchsiae</i> <i>Aculus schlechtendali</i> <i>Bryobia eharai</i> <i>Bryobia rubrioculus</i> <i>Cochlodispus operosus</i> <i>Eotetranychus carpini</i> <i>Eotetranychus pruni</i> <i>Epitrimerus pyri</i> <i>Eriophyes gossypii</i> <i>Mononychellus tanajoa</i> <i>Oligonychus gossypii</i> <i>Oligonychus grypus</i> <i>Oligonychus indicus</i> <i>Oligonychus peruvianus</i> <i>Oligonychus punicae</i> <i>Oligonychus sacchari</i> <i>Oligonychus yothersi</i> <i>Panonychus ulmi</i> <i>Petrobia latens</i> <i>Phyllocoptes aphrastus</i> <i>Phytoseius hongkongensis</i> <i>Schizotetranychus andropogoni</i> <i>Schizotetranychus asparagi</i> <i>Tetranychus canadensis</i> <i>Tetranychus marianae</i> <i>Tetranychus mcdanieli</i> <i>Tetranychus mexicanus</i> <i>Tetranychus pacificus</i> <i>Tetranychus turkestan</i> <i>Tropilaelaps clareae</i> <i>Varroa sinhai</i> 細菌類(56種) <i>Acidovorax avenae</i> subsp. <i>avenae</i> <i>Agrobacterium larrymoorei</i> <i>Agrobacterium tumefaciens</i> <i>Agrobacterium vitis</i> <i>Burkholderia andropogonis</i> <i>Burkholderia caryophylli</i> <i>Burkholderia gladioli</i> pv. <i>gladioli</i> <i>Clavibacter michiganensis</i> subsp. <i>Indidiosus</i> <i>Clavibacter michiganensis</i> subsp. <i>michiganensis</i> <i>Clavibacter michiganensis</i> subsp. <i>Sepedonicus</i>	
--	--	--

<i>Clavibacter michiganensis</i> subsp. <i>nebraskensis</i> <i>Curtobacterium flaccumfaciens</i> subsp. <i>Flaccumfaciens</i> <i>Curtobacterium flaccumfaciens</i> subsp. <i>Poinsettiae</i> <i>Dickeya solani</i> <i>Erwinia carotovora</i> subsp. <i>atroseptica</i> <i>Erwinia chrysanthemi</i> <i>Erwinia herbicola</i> pv. <i>gypsophilae</i> <i>Erwinia pyrifoliae</i> <i>Erwinia rhapontici</i> <i>Erwinia salicis</i> <i>Leifsonia xyli</i> subsp. <i>xyli</i> (原 <i>Clavibacter xyli</i> subsp. <i>xyli</i>) <i>Liberobacter asiaticum</i> <i>Pantoea stewartii</i> <i>Potato leaflet stunt bacterium</i> <i>Pseudomonas corrugate</i> <i>Pseudomonas lignicola</i> <i>Pseudomonas savastanoi</i> pv. <i>phaseolicola</i> <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>actinidiae</i> <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>eriobotryae</i> <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>maculicola</i> <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>morsprunorum</i> <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>papulans</i> <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>pisi</i> <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>tabaci</i> <i>Pseudomonas viridiflava</i> <i>Ralstonia solanacearum</i> Race3 <i>Xanthomonas acernea</i> <i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>corylina</i> <i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>begoniae</i> <i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>dieffenbachiae</i> <i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>glycines</i> <i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>phaseoli</i> <i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>poinsettiicola</i> <i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>vignicola</i> <i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>vitians</i> <i>Xanthomonas cucurbitae</i> <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>armoraciae</i> <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>Musacearum</i> <i>Xanthomonas fragariae</i> <i>Xanthomonas hortorum</i> pv. <i>carotae</i> <i>Xanthomonas hortorum</i> pv. <i>perlargonii</i> <i>Xanthomonas hyacinthi</i> <i>Xanthomonas oryzae</i> pv. <i>oryzicola</i> <i>Xanthomonas translucens</i> pv. <i>translucens</i> <i>Xanthomonas theicola</i> <i>Xanthomonas populi</i> 真菌類（ <u>81</u> 種）	<i>Clavibacter michiganensis</i> subsp. <i>nebraskensis</i> <i>Curtobacterium flaccumfaciens</i> subsp. <i>Flaccumfaciens</i> <i>Curtobacterium flaccumfaciens</i> subsp. <i>Poinsettiae</i> <i>Dickeya solani</i> <i>Erwinia carotovora</i> subsp. <i>atroseptica</i> <i>Erwinia chrysanthemi</i> <i>Erwinia herbicola</i> pv. <i>gypsophilae</i> <i>Erwinia pyrifoliae</i> <i>Erwinia rhapontici</i> <i>Erwinia salicis</i> <i>Leifsonia xyli</i> subsp. <i>xyli</i> (原 <i>Clavibacter xyli</i> subsp. <i>xyli</i>) <i>Liberobacter asiaticum</i> <i>Pantoea stewartii</i> <i>Potato leaflet stunt bacterium</i> <i>Pseudomonas corrugate</i> <i>Pseudomonas lignicola</i> <i>Pseudomonas savastanoi</i> pv. <i>phaseolicola</i> <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>actinidiae</i> <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>eriobotryae</i> <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>maculicola</i> <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>morsprunorum</i> <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>papulans</i> <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>pisi</i> <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>tabaci</i> <i>Pseudomonas viridiflava</i> <i>Ralstonia solanacearum</i> Race3 <i>Xanthomonas acernea</i> <i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>corylina</i> <i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>begoniae</i> <i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>dieffenbachiae</i> <i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>glycines</i> <i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>phaseoli</i> <i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>poinsettiicola</i> <i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>vignicola</i> <i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>vitians</i> <i>Xanthomonas cucurbitae</i> <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>armoraciae</i> <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>Musacearum</i> <i>Xanthomonas fragariae</i> <i>Xanthomonas hortorum</i> pv. <i>carotae</i> <i>Xanthomonas hortorum</i> pv. <i>perlargonii</i> <i>Xanthomonas hyacinthi</i> <i>Xanthomonas oryzae</i> pv. <i>oryzicola</i> <i>Xanthomonas translucens</i> pv. <i>translucens</i> <i>Xanthomonas theicola</i> <i>Xanthomonas populi</i> 真菌類（82種）	
---	--	--

<i>Alternaria gaisen</i> <i>Anisogramma anomala</i> <i>Apiosporina morbosa</i> <i>Atropellis piniphila</i> <i>Botryosphaeria laricina</i> <i>Calonectria ilicicola</i> <i>Ceratocystis fagacearum</i> <i>Ceratocystis fimbriata</i> <i>Chrysomyxa abietis</i> <i>Chrysomyxa ledi</i> <i>Ciborinia camelliae</i> <i>Colletotrichum coccodes</i> <i>Cronartium coleosporioides</i> <i>Cronartium flaccidum</i> <i>Cronartium quercuum</i> f. sp. <i>fusiforme</i> <i>Cronartium himalayense</i> <i>Cronartium kamtschaticum</i> <i>Cronartium quercuum</i> <i>Cryphonectria parasitica</i> <i>Cylindrocarpon destructans</i> <i>Cytospora</i> sp. <i>Diaporthe phaseolorum</i> <i>Diaporthe tanakae</i> <i>Diaporthe vaccinii</i> <i>Didymella ligulicola</i> <i>Elsinoe australis</i> <i>Endocronartium harknessii</i> <i>Entyloma holwayi</i> H. & P. Sydow <i>Eutypa lata</i> <i>Fusarium subglutinans</i> <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>Gaeumannomyces graminis</i> <i>Gibberella circinata</i> <i>Gremmeniella abietina</i> <i>Gymnosporangium asiaticum</i> <i>Gymnosporangium clavipes</i> <i>Gymnosporangium fuscum</i> <i>Gymnosporangium globosum</i> <i>Gymnosporangium yamadae</i> <i>Hymenoscyphus pseudoalbidus</i> <i>Lachnellula willkommii</i> <i>Leptosphaeria maculans</i> <i>Leptosphaeria nodorum</i> <i>Marasmiellus scandens</i> <i>Melampsora farlowii</i> <i>Monilinia fructigena</i>	<i>Alternaria gaisen</i> <i>Anisogramma anomala</i> <i>Apiosporina morbosa</i> <i>Atropellis piniphila</i> <i>Botryosphaeria laricina</i> <i>Calonectria ilicicola</i> <i>Ceratocystis fagacearum</i> <i>Ceratocystis fimbriata</i> <i>Chrysomyxa abietis</i> <i>Chrysomyxa ledi</i> <i>Ciborinia camelliae</i> <i>Colletotrichum coccodes</i> <i>Cronartium coleosporioides</i> <i>Cronartium flaccidum</i> <i>Cronartium quercuum</i> f. sp. <i>fusiforme</i> <i>Cronartium himalayense</i> <i>Cronartium kamtschaticum</i> <i>Cronartium quercuum</i> <i>Cryphonectria parasitica</i> <i>Cylindrocarpon destructans</i> <i>Cytospora</i> sp. <i>Diaporthe phaseolorum</i> <i>Diaporthe tanakae</i> <i>Diaporthe vaccinii</i> <i>Didymella ligulicola</i> <i>Elsinoe australis</i> <i>Endocronartium harknessii</i> <i>Entyloma holwayi</i> H. & P. Sydow <i>Eutypa lata</i> <i>Fusarium subglutinans</i> <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>Gaeumannomyces graminis</i> <i>Gibberella circinata</i> <i>Gremmeniella abietina</i> <i>Gymnosporangium asiaticum</i> <i>Gymnosporangium clavipes</i> <i>Gymnosporangium fuscum</i> <i>Gymnosporangium globosum</i> <i>Gymnosporangium yamadae</i> <i>Hymenoscyphus pseudoalbidus</i> <i>Lachnellula willkommii</i> <i>Leptosphaeria maculans</i> <i>Leptosphaeria nodorum</i> <u><i>Macrophomina phaseolina</i></u> <i>Marasmiellus scandens</i> <i>Melampsora farlowii</i> <i>Monilinia fructigena</i>	
---	--	--

<i>Nectria galligena</i> <i>Nectria mauritiicola</i> <i>Nectriella pironii</i> <i>Ophiostoma novo-ulmi</i> <i>Ophiostoma ulmi</i> <i>Ophiostoma wagneri</i> <i>Peronosclerospora maydis</i> <i>Peronosclerospora sacchari</i> <i>Phoma andigena</i> <i>Phoma exigua</i> var. <i>foveata</i> <i>Phoma tracheiphila</i> <i>Phomopsis viticola</i> <i>Phomopsis vitimegaspora</i> <i>Phomopsis vitimegasora</i> <i>Phymatotrichopsis omnivora</i> <i>Phytophthora fragariae</i> <i>Puccinia gladioli</i> <i>Puccinia mcleanii</i> <i>Puccinia pittieriana</i> <i>Rigidoporus lignosus</i> <i>Sclerotium cepivorum</i> <i>Stagonosporopsis chrysanthemi</i> (無性世代： <i>Didymella ligulicola</i>) <i>Septoria lycopersici</i> <i>Stenocarpella maydis</i> <i>Thecaphora solani</i> <i>Tilletia barclayana</i> <i>Tilletia indica</i> <i>Trachysphaera fructigena</i> <i>Uredo dioscoreae-alatae</i> <i>Uredo gladioli-buettneri</i> <i>Urocystis agropyri</i> <i>Urocystis tritici</i> <i>Ustilago scitaminea</i> <i>Verticillium alboatrum</i> <i>Verticillium dahliae</i> 病毒類（<u>461</u>種） <i>Abutilon mosaic virus</i> (AbMV) (<i>Geminiviridae</i> , <i>Begomovirus</i>) <i>Ageratum yellow vein virus</i> (AYVV) (<i>Geminiviridae</i> , <i>Begomovirus</i>) <i>African cassava mosaic virus</i> (ACMV) (<i>Geminiviridae</i> , <i>Begomovirus</i>) <i>Agropyron mosaic virus</i> (AgMV) (<i>Potyviridae</i> , <i>Bymovirus</i>) <i>Alfalfa cryptic virus 1</i> (ACV-1) (<i>Partitiviridae</i> , <i>alphacryptovirus</i>) <i>Alfalfa enation virus</i> <i>Alfalfa mosaic virus</i> (AIMV) (<i>Bromoviridae</i> , <i>alfamovirus</i>) <i>Alsike clover vein mosaic virus</i> <i>Alstroemeria mosaic virus</i> (AIMV) (<i>Potyviridae</i> , <i>potyvirus</i>) <i>Amaranthus leaf mottle virus</i> (AmLMV) (<i>Potyviridae</i> , <i>potyvirus</i>) <i>American plum line pattern virus</i> (APLPV) (<i>Bromoviridae</i> , <i>Ilarvirus</i>)	<i>Nectria galligena</i> <i>Nectria mauritiicola</i> <i>Nectriella pironii</i> <i>Ophiostoma novo-ulmi</i> <i>Ophiostoma ulmi</i> <i>Ophiostoma wagneri</i> <i>Peronosclerospora maydis</i> <i>Peronosclerospora sacchari</i> <i>Phoma andigena</i> <i>Phoma exigua</i> var. <i>foveata</i> <i>Phoma tracheiphila</i> <i>Phomopsis viticola</i> <i>Phomopsis vitimegaspora</i> <i>Phomopsis vitimegasora</i> <i>Phymatotrichopsis omnivora</i> <i>Phytophthora fragariae</i> <i>Puccinia gladioli</i> <i>Puccinia mcleanii</i> <i>Puccinia pittieriana</i> <i>Rigidoporus lignosus</i> <i>Sclerotium cepivorum</i> <i>Stagonosporopsis chrysanthemi</i> (無性世代： <i>Didymella ligulicola</i>) <i>Septoria lycopersici</i> <i>Stenocarpella maydis</i> <i>Thecaphora solani</i> <i>Tilletia barclayana</i> <i>Tilletia indica</i> <i>Trachysphaera fructigena</i> <i>Uredo dioscoreae-alatae</i> <i>Uredo gladioli-buettneri</i> <i>Urocystis agropyri</i> <i>Urocystis tritici</i> <i>Ustilago scitaminea</i> <i>Verticillium alboatrum</i> <i>Verticillium dahliae</i> 病毒類（<u>465</u>種） <i>Abutilon mosaic virus</i> (AbMV) (<i>Geminiviridae</i> , <i>Begomovirus</i>) <i>Ageratum yellow vein virus</i> (AYVV) (<i>Geminiviridae</i> , <i>Begomovirus</i>) <i>African cassava mosaic virus</i> (ACMV) (<i>Geminiviridae</i> , <i>Begomovirus</i>) <i>Agropyron mosaic virus</i> (AgMV) (<i>Potyviridae</i> , <i>Bymovirus</i>) <i>Alfalfa cryptic virus 1</i> (ACV-1) (<i>Partitiviridae</i> , <i>alphacryptovirus</i>) <i>Alfalfa enation virus</i> <i>Alfalfa mosaic virus</i> (AIMV) (<i>Bromoviridae</i> , <i>alfamovirus</i>) <i>Alsike clover vein mosaic virus</i> <i>Alstroemeria mosaic virus</i> (AIMV) (<i>Potyviridae</i> , <i>potyvirus</i>) <i>Amaranthus leaf mottle virus</i> (AmLMV) (<i>Potyviridae</i> , <i>potyvirus</i>) <i>American plum line pattern virus</i> (APLPV) (<i>Bromoviridae</i> , <i>Ilarvirus</i>)	
---	---	--

<i>Andean potato latent virus (APLV) (Tymovirus)</i> <i>Andean potato mottle virus (APMoV) (Comoviridae, Comovirus)</i> <i>Anthoxanthum latent blanching virus (ALBV) (Hordeivirus)</i> <i>Anthriscus yellows virus (AYV) (Sequiviridae, waikavirus)</i> <i>Apple chat fruit disease</i> <i>Apple chlorotic leaf spot virus (ACLSV) (Trichovirus, Flexiviridae)</i> <i>Apple dimple fruit viroid (ADFVd) (Apscaviroid, Pospiviroidae)</i> <i>Apple mosaic virus (ApMV) (Bromoviridae, Ilarvirus)</i> <i>Apple scar skin viroid (ASSVd) (Pospiviroidae, Apscaviriod)</i> <i>Apple stem grooving virus (ASGV) (Capillovirus, Flexiviridae)</i> <i>Apple stem pitting virus (ASPV) (Foveavirus, Flexiviridae)</i> <i>Araujia mosaic virus (ArjMV) (Potyviridae, potyvirus)</i> <i>Arracacha Virus A (AVA) (Comoviridae, Nepovirus)</i> <i>Arracacha Virus B (AVB) (Comoviridae, Nepovirus)</i> <i>Arracacha Virus Y (AVY) (Potyviridae, potyvirus)</i> <i>Artichoke Italian latent virus (AILV) (Comoviridae, nepovirus)</i> <i>Artichoke latent virus (ArLV) (Potyviridae, potyvirus)</i> <i>Artichoke mottled crinkle virus (AMCV) (Tombusviridae, Tombusvirus)</i> <i>Artichoke yellow ringspot virus (AYRSV) (Comoviridae, Nepovirus)</i> <i>Asparagus virus 1 (AV-1) (Potyviridae, potyvirus)</i> <i>Asparagus virus 2 (AV-2) (Bromoviridae, ilarvirus)</i> <i>Asparagus virus 3 (AV-3) (Potexvirus)</i> <i>Banana bunchy top virus (BBTV) (Nanovirus)</i> <i>Barley mild mosaic virus (BaMMV) (Potyviridae, bymovirus)</i> <i>Barley mosaic virus (BBV)</i> <i>Barley yellow dwarf virus-GPV (BYDV-GPV) (Luteovirus)</i> <i>Barley yellow mosaic virus (BaYMV) (Potyviridae, Bymovirus)</i> <i>Barley yellow striate mosaic virus (BYSMV) (Rhabdoviridae, Cytorhabdovirus)</i> <i>Bean calico mosaic virus (BCaMV) (Geminiviridae, Begomovirus)</i> <i>Bean common mosaic virus (Potyviridae, potyvirus)</i> <i>Bean golden mosaic virus (BGMV) (Geminiviridae, Begomovirus)</i> <i>Bean leaf roll virus (BLRV) (Luteoviridae, luteovirus)</i> <i>Bean mild mosaic virus (BMMV) (Tombusviridae, carmovirus)</i> <i>Bean pod mottle virus (BPMV) (Comoviridae, comovirus)</i> <i>Bean rugose mosaic virus (BRMV) (Comoviridae, comovirus)</i> <i>Bean southern mosaic virus (SBMV) (sobemovirus)</i> <i>Bean yellow vein banding virus (BYVBV) (Umbravirus)</i> <i>Beet distortion mosaic virus</i> <i>Beet mild yellowing virus (BMYV) (Luteoviridae, luteovirus)</i> <i>Beet mosaic virus (BtMV) (Potyviridae, potyvirus)</i> <i>Beet soil-borne virus (BSBV) (Pomovirus)</i> <i>Beet western yellows virus (BWYV) (Luteoviridae, luteovirus)</i> <i>Beet yellows virus (BYV) (Closteroviridae, closterovirus)</i> <i>Beet yellow stunt virus (BYSV) (Closteroviridae, closterovirus)</i> <i>Beet curly top virus (BCTV) (Geminiviridae, Curtomovirus)</i> <i>Beet leaf curl virus (BLCV) (Rhabdoviridae)</i> <i>Beet necrotic yellow vein virus (BNYVV) (Benyvirus)</i>	<i>Andean potato latent virus (APLV) (Tymovirus)</i> <i>Andean potato mottle virus (APMoV) (Comoviridae, Comovirus)</i> <i>Anthoxanthum latent blanching virus (ALBV) (Hordeivirus)</i> <i>Anthriscus yellows virus (AYV) (Sequiviridae, waikavirus)</i> <i>Apple chat fruit disease</i> <i>Apple chlorotic leaf spot virus (ACLSV) (Trichovirus, Flexiviridae)</i> <i>Apple dimple fruit viroid (ADFVd) (Apscaviroid, Pospiviroidae)</i> <i>Apple mosaic virus (ApMV) (Bromoviridae, Ilarvirus)</i> <i>Apple scar skin viroid (ASSVd) (Pospiviroidae, Apscaviriod)</i> <i>Apple stem grooving virus (ASGV) (Capillovirus, Flexiviridae)</i> <i>Apple stem pitting virus (ASPV) (Foveavirus, Flexiviridae)</i> <i>Araujia mosaic virus (ArjMV) (Potyviridae, potyvirus)</i> <i>Arracacha Virus A (AVA) (Comoviridae, Nepovirus)</i> <i>Arracacha Virus B (AVB) (Comoviridae, Nepovirus)</i> <i>Arracacha Virus Y (AVY) (Potyviridae, potyvirus)</i> <i>Artichoke Italian latent virus (AILV) (Comoviridae, nepovirus)</i> <i>Artichoke latent virus (ArLV) (Potyviridae, potyvirus)</i> <i>Artichoke mottled crinkle virus (AMCV) (Tombusviridae, Tombusvirus)</i> <i>Artichoke yellow ringspot virus (AYRSV) (Comoviridae, Nepovirus)</i> <i>Asparagus virus 1 (AV-1) (Potyviridae, potyvirus)</i> <i>Asparagus virus 2 (AV-2) (Bromoviridae, ilarvirus)</i> <i>Asparagus virus 3 (AV-3) (Potexvirus)</i> <i>Banana bunchy top virus (BBTV) (Nanovirus)</i> <i>Barley mild mosaic virus (BaMMV) (Potyviridae, bymovirus)</i> <i>Barley mosaic virus (BBV)</i> <i>Barley yellow dwarf virus-GPV (BYDV-GPV) (Luteovirus)</i> <i>Barley yellow mosaic virus (BaYMV) (Potyviridae, Bymovirus)</i> <i>Barley yellow striate mosaic virus (BYSMV) (Rhabdoviridae, Cytorhabdovirus)</i> <i>Bean calico mosaic virus (BCaMV) (Geminiviridae, Begomovirus)</i> <i>Bean common mosaic virus (Potyviridae, potyvirus)</i> <i>Bean golden mosaic virus (BGMV) (Geminiviridae, Begomovirus)</i> <i>Bean leaf roll virus (BLRV) (Luteoviridae, luteovirus)</i> <i>Bean mild mosaic virus (BMMV) (Tombusviridae, carmovirus)</i> <i>Bean pod mottle virus (BPMV) (Comoviridae, comovirus)</i> <i>Bean rugose mosaic virus (BRMV) (Comoviridae, comovirus)</i> <i>Bean southern mosaic virus (SBMV) (sobemovirus)</i> <i>Bean yellow vein banding virus (BYVBV) (Umbravirus)</i> <i>Beet distortion mosaic virus</i> <i>Beet mild yellowing virus (BMYV) (Luteoviridae, luteovirus)</i> <i>Beet mosaic virus (BtMV) (Potyviridae, potyvirus)</i> <i>Beet soil-borne virus (BSBV) (Pomovirus)</i> <i>Beet western yellows virus (BWYV) (Luteoviridae, luteovirus)</i> <i>Beet yellows virus (BYV) (Closteroviridae, closterovirus)</i> <i>Beet yellow stunt virus (BYSV) (Closteroviridae, closterovirus)</i> <i>Beet curly top virus (BCTV) (Geminiviridae, Curtomovirus)</i> <i>Beet leaf curl virus (BLCV) (Rhabdoviridae)</i> <i>Beet necrotic yellow vein virus (BNYVV) (Benyvirus)</i>	
---	---	--

<i>Belladonna mottle virus</i> (BeMV) (<i>Tymovirus</i>) <i>Bermuda grass etched-line virus</i> (BELV) (<i>Marafivirus</i>) <i>Bhendi yellow vein mosaic virus</i> (BYVMV) (<i>Geminiviridae</i> , <i>Begomovirus</i>) <i>Bidens mosaic virus</i> (BiMV) (<i>Potyviridae</i> , <i>potyvirus</i>) <i>Bidens mottle virus</i> (BiMoV) (<i>Potyviridae</i> , <i>potyvirus</i>) <i>Black raspberry latent ilarvirus</i> <i>Black raspberry necrosis virus</i> (BRNV) <i>Blackcurrant reversion associated virus</i> (BRAV) (<i>Comoviridae</i> , <i>Nepovirus</i>) <i>Blueberry leaf mottle virus</i> (BLMoV) (<i>Comoviridae</i> , <i>Nepovirus</i>) <i>Blueberry necrotic shock virus</i> (BlShV) (<i>ilarvirus</i>) <i>Blueberry red ringspot virus</i> (BRRV) (<i>Caulimoviridae</i> , <i>caulimovirus</i>) <i>Blueberry scorch virus</i> (BBScV) (<i>carlavirus</i>) <i>Blueberry shoestring virus</i> (BSSV) (<i>sobemovirus</i>) <i>Broad bean B virus</i> <i>Broad bean necrosis virus</i> (BBNV) (<i>Pomovirus</i>) <i>Broad bean severe chlorosis virus</i> (<i>Closteroviridae</i> , <i>closterovirus</i>) <i>Broad bean stain virus</i> (BBSV) (<i>Comoviridae</i> , <i>comovirus</i>) <i>Broad bean true mosaic virus</i> (BBTMV) (<i>Comoviridae</i> , <i>comovirus</i>) <i>Broad bean yellow ringspot virus</i> <i>Broad bean yellow vein virus</i> (<i>Rhabdoviridae</i> , <i>cytorhabdovirus</i>) <i>Broccoli necrotic yellows virus</i> (BNYV) (<i>Rhabdoviridae</i> , <i>cytorhabdovirus</i>) <i>Brome mosaic virus</i> (BMV) (<i>Bromoviridae</i> , <i>bromovirus</i>) <i>Brome streak mosaic virus</i> (BrStMV) (<i>Potyviridae</i> , <i>Tritimovirus</i>) <i>Burdock mosaic virus</i> <i>Burdock mottle virus</i> <i>Burdock yellows virus</i> (BuYV) (<i>Closteroviridae</i> , <i>closterovirus</i>) <i>Cacao necrosis virus</i> (CNV) (<i>Comoviridae</i> , <i>nepovirus</i>) <i>Cacao swollen shoot virus</i> (CSSV) (<i>Caulimoviridae</i> , <i>badnavirus</i>) <i>Cacao yellow mosaic virus</i> (CYMV) (<i>Tymovirus</i>) <i>Cactus virus</i> (CV-2) (<i>Carlavirus</i>) <i>Canna yellow mottle VIRUS</i> (CaYMV) (<i>Caulimoviridae</i> , <i>badnavirus</i>) <i>Caper latent virus</i> (CapLV) (<i>Carlavirus</i>) <i>Cardamine chlorotic fleck virus</i> (CCFV) (<i>Tombusviridae</i> , <i>carmovirus</i>) <i>Cardamom mosaic virus</i> (CdMV) (<i>Potyviridae</i> , <i>potyvirus</i>) <i>Carnation cryptic virus 1</i> (CCV-1) (<i>Partitiviridae</i> , <i>alphacryptovirus</i>) <i>Carnation etched ring virus</i> (CERV) (<i>Cualimoviridae</i> , <i>caulimovirus</i>) <i>Carnation Italian ringspot virus</i> (CIRV) (<i>Tombusviridae</i> , <i>tombusvirus</i>) <i>Carnation latent virus</i> (CLV) (<i>Carlavirus</i>) <i>Carnation necrotic fleck virus</i> (CNFV) (<i>Clostreoviridae</i> , <i>closterovirus</i>) <i>Carnation ringspot virus</i> (CRSV) (<i>Tombusviridae</i> , <i>dianthovirus</i>) <i>Carnation vein mottle virus</i> (CVMoV) (<i>Potyviridae</i> , <i>potyvirus</i>) <i>Carrot latent virus</i> (CtLV) (<i>Rhabdoviridae</i> , <i>nucleorhabdovirus</i>) <i>Carrot mottle mimic virus</i> (CmoMV) (<i>Umbravirus</i>) <i>Carrot mottle virus</i> (CMoV) (<i>Umbravirus</i>) <i>Carrot red leaf virus</i> (CtRLV) (<i>Luteoviridae</i> , <i>luteovirus</i>)	<i>Belladonna mottle virus</i> (BeMV) (<i>Tymovirus</i>) <i>Bermuda grass etched-line virus</i> (BELV) (<i>Marafivirus</i>) <i>Bhendi yellow vein mosaic virus</i> (BYVMV) (<i>Geminiviridae</i> , <i>Begomovirus</i>) <i>Bidens mosaic virus</i> (BiMV) (<i>Potyviridae</i> , <i>potyvirus</i>) <i>Bidens mottle virus</i> (BiMoV) (<i>Potyviridae</i> , <i>potyvirus</i>) <i>Black raspberry latent ilarvirus</i> <i>Black raspberry necrosis virus</i> (BRNV) <i>Blackcurrant reversion associated virus</i> (BRAV) (<i>Comoviridae</i> , <i>Nepovirus</i>) <i>Blueberry leaf mottle virus</i> (BLMoV) (<i>Comoviridae</i> , <i>Nepovirus</i>) <i>Blueberry necrotic shock virus</i> (BlShV) (<i>ilarvirus</i>) <i>Blueberry red ringspot virus</i> (BRRV) (<i>Caulimoviridae</i> , <i>caulimovirus</i>) <i>Blueberry scorch virus</i> (BBScV) (<i>carlavirus</i>) <i>Blueberry shoestring virus</i> (BSSV) (<i>sobemovirus</i>) <i>Broad bean B virus</i> <i>Broad bean necrosis virus</i> (BBNV) (<i>Pomovirus</i>) <i>Broad bean severe chlorosis virus</i> (<i>Closteroviridae</i> , <i>closterovirus</i>) <i>Broad bean stain virus</i> (BBSV) (<i>Comoviridae</i> , <i>comovirus</i>) <i>Broad bean true mosaic virus</i> (BBTMV) (<i>Comoviridae</i> , <i>comovirus</i>) <u><i>Broad bean wilt virus</i> (BBWV) (<i>Comoviridae</i>, <i>fabavirus</i>)</u> <i>Broad bean yellow ringspot virus</i> <i>Broad bean yellow vein virus</i> (<i>Rhabdoviridae</i> , <i>cytorhabdovirus</i>) <i>Broccoli necrotic yellows virus</i> (BNYV) (<i>Rhabdoviridae</i> , <i>cytorhabdovirus</i>) <i>Brome mosaic virus</i> (BMV) (<i>Bromoviridae</i> , <i>bromovirus</i>) <i>Brome streak mosaic virus</i> (BrStMV) (<i>Potyviridae</i> , <i>Tritimovirus</i>) <i>Burdock mosaic virus</i> <i>Burdock mottle virus</i> <i>Burdock yellows virus</i> (BuYV) (<i>Closteroviridae</i> , <i>closterovirus</i>) <i>Cacao necrosis virus</i> (CNV) (<i>Comoviridae</i> , <i>nepovirus</i>) <i>Cacao swollen shoot virus</i> (CSSV) (<i>Caulimoviridae</i> , <i>badnavirus</i>) <i>Cacao yellow mosaic virus</i> (CYMV) (<i>Tymovirus</i>) <i>Cactus virus</i> (CV-2) (<i>Carlavirus</i>) <i>Canna yellow mottle VIRUS</i> (CaYMV) (<i>Caulimoviridae</i> , <i>badnavirus</i>) <i>Caper latent virus</i> (CapLV) (<i>Carlavirus</i>) <i>Cardamine chlorotic fleck virus</i> (CCFV) (<i>Tombusviridae</i> , <i>carmovirus</i>) <i>Cardamom mosaic virus</i> (CdMV) (<i>Potyviridae</i> , <i>potyvirus</i>) <i>Carnation cryptic virus 1</i> (CCV-1) (<i>Partitiviridae</i> , <i>alphacryptovirus</i>) <i>Carnation etched ring virus</i> (CERV) (<i>Cualimoviridae</i> , <i>caulimovirus</i>) <i>Carnation Italian ringspot virus</i> (CIRV) (<i>Tombusviridae</i> , <i>tombusvirus</i>) <i>Carnation latent virus</i> (CLV) (<i>Carlavirus</i>) <u><i>Carnation mottle virus</i> (CarMV) (<i>Carmovirus</i>)</u> <i>Carnation necrotic fleck virus</i> (CNFV) (<i>Clostreoviridae</i> , <i>closterovirus</i>) <i>Carnation ringspot virus</i> (CRSV) (<i>Tombusviridae</i> , <i>dianthovirus</i>) <i>Carnation vein mottle virus</i> (CVMoV) (<i>Potyviridae</i> , <i>potyvirus</i>) <i>Carrot latent virus</i> (CtLV) (<i>Rhabdoviridae</i> , <i>nucleorhabdovirus</i>) <i>Carrot mottle mimic virus</i> (CmoMV) (<i>Umbravirus</i>) <i>Carrot mottle virus</i> (CMoV) (<i>Umbravirus</i>) <i>Carrot red leaf virus</i> (CtRLV) (<i>Luteoviridae</i> , <i>luteovirus</i>)	
---	--	--

<i>Carrot temperate virus 1</i> (CteV-1) (<i>Partitiviridae</i>, <i>alphacryptovirus</i>) <i>Carrot temperate virus 2</i> (CteV-2) (<i>Partitiviridae</i>, <i>betacryptovirus</i>) <i>Carrot temperate virus 3</i> (CteV-3) (<i>Partitiviridae</i>, <i>alphacryptovirus</i>) <i>Carrot temperate virus 4</i> (CteV-4) (<i>Partitiviridae</i>, <i>alphacryptovirus</i>) <i>Carrot thin leaf virus</i> (CTLV) (<i>Potyviridae</i>, <i>potyvirus</i>) <i>Cowpea chlorotic mottle virus</i> (CCMV) (<i>Bromoviridae</i>, <i>Bromovirus</i>) <i>Cowpea golden mosaic virus</i> (CPGMV) (<i>Geminiviridae</i>, <i>Begomovirus</i>) <i>Cowpea green vein-banding virus</i> (CGVBV) (<i>Potyviridae</i>, <i>Potyvirus</i>) <i>Cowpea mosaic virus</i> (CPMV) (<i>Comoviridae</i>, <i>Comovirus</i>) <i>Cowpea rugose mosaic virus</i> (CPRMV) (<i>Potyviridae</i>, <i>Potyvirus</i>) <i>Cowpea severe mosaic virus</i> (CPSMV) (<i>Comoviridae</i>, <i>Comovirus</i>) <i>Cowpea stunt virus</i> (<i>Luteovirus</i>) <i>Cassava African mosaic virus</i> (ACMV) (<i>Geminiviridae</i>, <i>bigeminivirus</i>) <i>Cassava green mottle virus</i> (CaGMV) (<i>Comoviridae</i>, <i>nepovirus</i>) <i>Cassava Indian mosaic virus</i> (ICMV) (<i>Geminiviridae</i>, <i>bigeminivirus</i>) <i>Cassava Ivorian bacilliform virus</i> (CsIBV) (<i>Ourmiavirus</i>) <i>Cassava virus X</i> (CsVX) (<i>Potexvirus</i>) <i>Cassia mosaic virus</i> <i>Cassia ringspot virus</i> <i>Cassia yellow blotch virus</i> (CYBV) (<i>Bromoviridae</i>, <i>bromovirus</i>) <i>Cassia yellow spot virus</i> (CasYSV) (<i>Potyviridae</i>, <i>potyvirus</i>) <i>Cauliflower mosaic virus</i> (CaMV) (<i>Caulimoviridae</i>, <i>caulimovirus</i>) <i>Celery mosaic virus</i> (CeMV) (<i>Potyviridae</i>, <i>potyvirus</i>) <i>Cereal northern mosaic virus</i> (NCMV) (<i>cytorhabdovirus</i>) <i>Cassava brown streak virus</i> (CsBSV) (<i>Potyviridae</i>, <i>Ipomovirus</i>) <i>Cassava common mosaic virus</i> (CsCMV) (<i>Potexvirus</i>) <i>Cereal chlorotic mosaic virus</i> (CCMoV) (<i>Rhabdoviridae</i>) <i>Cherry green ring mottle virus</i> (CGRMV) (<i>Foveavirus</i>) <i>Cherry leaf roll virus</i> (CLRV) (<i>Comoviridae</i>, <i>Nepovirus</i>) <i>Cherry mottle leaf virus</i> (CMLV) (<i>Trichovirus</i>) <i>Cherry rasp leaf virus</i> (CRLV) (<i>Comoviridae</i>, <i>Nepovirus</i>) <i>Cherry virus A</i> (CVA) (<i>Capillovirus</i>) <i>Chickpea bushy dwarf virus</i> (CpBDV) (<i>Potyviridae</i>, <i>potyvirus</i>) <i>Chickpea distortion mosaic virus</i> (<i>Potyviridae</i>, <i>potyvirus</i>) <i>Chicory virus</i> (ChVX) (<i>potexvirus</i>) <i>Chicory yellow mottle virus</i> (ChYMV) (<i>Comoviridae</i>, <i>nepovirus</i>) <i>Chino del tomate virus</i> (CdTV) (<i>Geminiviridae</i>, <i>bigeminivirus</i>) <i>Chloris striate mosaic virus</i> (CSMV) (<i>Geminiviridae</i>, <i>monogeminivirus</i>) <i>Chrysanthemum virus B</i> (CVB) (<i>Carlavirus</i>) <i>Citrus blight disease</i> <i>Citrus leprosis virus</i> (CiLV) (<i>Rhabdoviridae</i>) <i>Citrus yellow mosaic virus</i> (CiYMV) (<i>Caulimoviridae</i>, <i>Badnavirus</i>) <i>Citrus leaf rugose virus</i> (CiLRV) (<i>Rhabdoviridae</i>, <i>ilarvirus</i>) <i>Citrus ringspot virus</i> <i>Citrus sudden death-associated virus</i> (CSD- associated virus) (<i>Marafivirus</i>, <i>Tymoviridae</i>) <i>Citrus variegation virus</i> (CVV) (<i>Bromoviridae</i>, <i>ilarvirus</i>)	<i>Carrot temperate virus 1</i> (CteV-1) (<i>Partitiviridae</i>, <i>alphacryptovirus</i>) <i>Carrot temperate virus 2</i> (CteV-2) (<i>Partitiviridae</i>, <i>betacryptovirus</i>) <i>Carrot temperate virus 3</i> (CteV-3) (<i>Partitiviridae</i>, <i>alphacryptovirus</i>) <i>Carrot temperate virus 4</i> (CteV-4) (<i>Partitiviridae</i>, <i>alphacryptovirus</i>) <i>Carrot thin leaf virus</i> (CTLV) (<i>Potyviridae</i>, <i>potyvirus</i>) <i>Cowpea chlorotic mottle virus</i> (CCMV) (<i>Bromoviridae</i>, <i>Bromovirus</i>) <i>Cowpea golden mosaic virus</i> (CPGMV) (<i>Geminiviridae</i>, <i>Begomovirus</i>) <i>Cowpea green vein-banding virus</i> (CGVBV) (<i>Potyviridae</i>, <i>Potyvirus</i>) <i>Cowpea mosaic virus</i> (CPMV) (<i>Comoviridae</i>, <i>Comovirus</i>) <i>Cowpea rugose mosaic virus</i> (CPRMV) (<i>Potyviridae</i>, <i>Potyvirus</i>) <i>Cowpea severe mosaic virus</i> (CPSMV) (<i>Comoviridae</i>, <i>Comovirus</i>) <i>Cowpea stunt virus</i> (<i>Luteovirus</i>) <i>Cassava African mosaic virus</i> (ACMV) (<i>Geminiviridae</i>, <i>bigeminivirus</i>) <i>Cassava green mottle virus</i> (CaGMV) (<i>Comoviridae</i>, <i>nepovirus</i>) <i>Cassava Indian mosaic virus</i> (ICMV) (<i>Geminiviridae</i>, <i>bigeminivirus</i>) <i>Cassava Ivorian bacilliform virus</i> (CsIBV) (<i>Ourmiavirus</i>) <i>Cassava virus X</i> (CsVX) (<i>Potexvirus</i>) <i>Cassia mosaic virus</i> <i>Cassia ringspot virus</i> <i>Cassia yellow blotch virus</i> (CYBV) (<i>Bromoviridae</i>, <i>bromovirus</i>) <i>Cassia yellow spot virus</i> (CasYSV) (<i>Potyviridae</i>, <i>potyvirus</i>) <i>Cauliflower mosaic virus</i> (CaMV) (<i>Caulimoviridae</i>, <i>caulimovirus</i>) <i>Celery mosaic virus</i> (CeMV) (<i>Potyviridae</i>, <i>potyvirus</i>) <i>Cereal northern mosaic virus</i> (NCMV) (<i>cytorhabdovirus</i>) <i>Cassava brown streak virus</i> (CsBSV) (<i>Potyviridae</i>, <i>Ipomovirus</i>) <i>Cassava common mosaic virus</i> (CsCMV) (<i>Potexvirus</i>) <i>Cereal chlorotic mosaic virus</i> (CCMoV) (<i>Rhabdoviridae</i>) <i>Cherry green ring mottle virus</i> (CGRMV) (<i>Foveavirus</i>) <i>Cherry leaf roll virus</i> (CLRV) (<i>Comoviridae</i>, <i>Nepovirus</i>) <i>Cherry mottle leaf virus</i> (CMLV) (<i>Trichovirus</i>) <i>Cherry rasp leaf virus</i> (CRLV) (<i>Comoviridae</i>, <i>Nepovirus</i>) <i>Cherry virus A</i> (CVA) (<i>Capillovirus</i>) <i>Chickpea bushy dwarf virus</i> (CpBDV) (<i>Potyviridae</i>, <i>potyvirus</i>) <i>Chickpea distortion mosaic virus</i> (<i>Potyviridae</i>, <i>potyvirus</i>) <i>Chicory virus</i> (ChVX) (<i>potexvirus</i>) <i>Chicory yellow mottle virus</i> (ChYMV) (<i>Comoviridae</i>, <i>nepovirus</i>) <i>Chino del tomate virus</i> (CdTV) (<i>Geminiviridae</i>, <i>bigeminivirus</i>) <i>Chloris striate mosaic virus</i> (CSMV) (<i>Geminiviridae</i>, <i>monogeminivirus</i>) <i>Chrysanthemum virus B</i> (CVB) (<i>Carlavirus</i>) <i>Citrus blight disease</i> <i>Citrus leprosis virus</i> (CiLV) (<i>Rhabdoviridae</i>) <i>Citrus yellow mosaic virus</i> (CiYMV) (<i>Caulimoviridae</i>, <i>Badnavirus</i>) <i>Citrus leaf rugose virus</i> (CiLRV) (<i>Rhabdoviridae</i>, <i>ilarvirus</i>) <i>Citrus ringspot virus</i> <i>Citrus sudden death-associated virus</i> (CSD- associated virus) (<i>Marafivirus</i>, <i>Tymoviridae</i>) <i>Citrus variegation virus</i> (CVV) (<i>Bromoviridae</i>, <i>ilarvirus</i>)	
--	--	--

<i>Clitoria yellow vein virus</i> (CYVV) (<i>Tymovirus</i>) <i>Clover mild mosaic virus</i> <i>Clover wound tumor virus</i> (WTV) (<i>Phytoreovirus</i>) <i>Clover yellow mosaic virus</i> (CIYMV) (<i>potexvirus</i>) <i>Clover yellows virus</i> (CYV) (<i>Closteroviridae, closterovirus</i>) <i>Clover yellow vein virus</i> (CIYVV) (<i>Potyviridae, potyvirus</i>) <i>Cocksfoot mottle virus</i> (CoMV) (<i>Sobemovirus</i>) <i>Coconut foliar decay virus</i> (CFDV) (<i>Nanavirus</i>) <i>Commelina diffusa virus</i> (<i>Potyviridae, potyvirus</i>) <i>Commelina mosaic virus</i> (ComMV) (<i>Potyviridae, potyvirus</i>) <i>Commelina virus X</i> (ComVX) (<i>potexvirus</i>) <i>Commelina yellow mottle virus</i> (ComYMV) (<i>Caulimoviridae,badnavirus</i>) <i>Cocksfoot mild mosaic virus</i> (CoMV) (<i>Sobemovirus</i>) <i>Cocoa mottle leaf virus</i> <i>Cocoa necrosis virus</i> (CoNV) (<i>Comoviridae, Nepovirus</i>) <i>Cocoa swollen shoot virus</i> (CSSV) (<i>Caulimoviridae, Badnavirus</i>) <i>Cocoa yellow mosaic virus</i> <i>Colombian datura virus</i> (CDV) (<i>Potyviridae, Potyvirus</i>) <i>Coriander feathery red vein virus</i> (CFRVV) (<i>Rhabdoviridae, nucleorhabdovirus</i>) <i>Cotton leaf curl virus</i> (CLCuV) (<i>Geminiviridae, Begomovirus</i>) <i>Cotton leaf crumple virus</i> (CLCrV) (<i>Geminiviridae,bigeminivirus</i>) <i>Cowpea mild mottle virus</i> (CPMMV) (<i>Carlavirus</i>) <i>Crimson clover latent virus</i> (CCLV) (<i>Comoviridae, nepovirus</i>) <i>Crinum mosaic virus</i> (CriMV) (<i>Potyviridae, potyvirus</i>) <i>Croton yellow vein mosaic virus</i> (CYVMV) (<i>Geminiviridae, bigeminivirus</i>) <i>Cucumber leaf spot virus</i> (CLSV) (<i>Tombusviridae, carmovirus</i>) <i>Cucumber necrosis virus</i> (CuNV) (<i>Tombusviridae, tombusvirus</i>) <i>Cucumber soil-borne virus</i> (CuSBV) (<i>Tombusviridae, carmovirus</i>) <i>Cucumber vein yellowing virus</i> (CVYV) <i>Cucurbit chlorotic yellows virus</i> (CCYV) (<i>Closteroviridae, Crinivirus</i>) <i>Cycas necrotic stunt virus</i> (CNSV) (<i>Comoviridae, nepovirus</i>) <i>Cymbidium ringspot virus</i> (CymRSV) (<i>Tombusviridae, tombusvirus</i>) <i>Cynodon chlorotic streak virus</i> <i>Cynosurus mottle virus</i> (CnMoV) (<i>Sobemovirus</i>) <i>Dahlia mosaic virus</i> (DMV) (<i>Caulimoviridae,caulimovirus</i>) <i>Dandelion latent virus</i> (DaLV) (<i>Carlavirus</i>) <i>Dandelion yellow mosaic virus</i> (DaYMV) (<i>Sequiviridae, sequivirus</i>) <i>Daphne virus X</i> (DVX) (<i>Potexvirus</i>) <i>Daphne virus Y</i> (DVY) (<i>Potyviridae, potyvirus</i>) <i>Datura Colombian virus</i> (CDV) (<i>Potyviridae, potyvirus</i>) <i>Datura distortion mosaic virus</i> (DDMV) (<i>Potyviridae, potyvirus</i>) <i>Datura necrosis virus</i> (DNV) (<i>Potyviridae, potyvirus</i>) <i>Datura shoestring virus</i> (DSTV) (<i>Potyviridae, potyvirus</i>) <i>Datura yellow vein virus</i> (DYVV) (<i>Rhabdoviridae, nucleorhabdovirus</i>) <i>Datura distortion virus</i>	<i>Clitoria yellow vein virus</i> (CYVV) (<i>Tymovirus</i>) <i>Clover mild mosaic virus</i> <i>Clover wound tumor virus</i> (WTV) (<i>Phytoreovirus</i>) <i>Clover yellow mosaic virus</i> (CIYMV) (<i>potexvirus</i>) <i>Clover yellows virus</i> (CYV) (<i>Closteroviridae, closterovirus</i>) <i>Clover yellow vein virus</i> (CIYVV) (<i>Potyviridae, potyvirus</i>) <i>Cocksfoot mottle virus</i> (CoMV) (<i>Sobemovirus</i>) <i>Coconut foliar decay virus</i> (CFDV) (<i>Nanavirus</i>) <i>Commelina diffusa virus</i> (<i>Potyviridae, potyvirus</i>) <i>Commelina mosaic virus</i> (ComMV) (<i>Potyviridae, potyvirus</i>) <i>Commelina virus X</i> (ComVX) (<i>potexvirus</i>) <i>Commelina yellow mottle virus</i> (ComYMV) (<i>Caulimoviridae,badnavirus</i>) <i>Cocksfoot mild mosaic virus</i> (CoMV) (<i>Sobemovirus</i>) <i>Cocoa mottle leaf virus</i> <i>Cocoa necrosis virus</i> (CoNV) (<i>Comoviridae, Nepovirus</i>) <i>Cocoa swollen shoot virus</i> (CSSV) (<i>Caulimoviridae, Badnavirus</i>) <i>Cocoa yellow mosaic virus</i> <i>Colombian datura virus</i> (CDV) (<i>Potyviridae, Potyvirus</i>) <i>Coriander feathery red vein virus</i> (CFRVV) (<i>Rhabdoviridae, nucleorhabdovirus</i>) <i>Cotton leaf curl virus</i> (CLCuV) (<i>Geminiviridae, Begomovirus</i>) <i>Cotton leaf crumple virus</i> (CLCrV) (<i>Geminiviridae,bigeminivirus</i>) <i>Cowpea mild mottle virus</i> (CPMMV) (<i>Carlavirus</i>) <i>Crimson clover latent virus</i> (CCLV) (<i>Comoviridae, nepovirus</i>) <i>Crinum mosaic virus</i> (CriMV) (<i>Potyviridae, potyvirus</i>) <i>Croton yellow vein mosaic virus</i> (CYVMV) (<i>Geminiviridae, bigeminivirus</i>) <u><i>Cucumber green mottle mosaic virus</i> (CGMMV) (<i>Tobamovirus</i>)</u> <i>Cucumber leaf spot virus</i> (CLSV) (<i>Tombusviridae, carmovirus</i>) <u><i>Cucumber mosaic virus subgroup II</i> (CMV-II)(<i>Bromoviridae, Cucumovirus</i>)</u> <i>Cucumber necrosis virus</i> (CuNV) (<i>Tombusviridae, tombusvirus</i>) <i>Cucumber soil-borne virus</i> (CuSBV) (<i>Tombusviridae, carmovirus</i>) <i>Cucumber vein yellowing virus</i> (CVYV) <i>Cucurbit chlorotic yellows virus</i> (CCYV) (<i>Closteroviridae, Crinivirus</i>) <i>Cycas necrotic stunt virus</i> (CNSV) (<i>Comoviridae, nepovirus</i>) <i>Cymbidium ringspot virus</i> (CymRSV) (<i>Tombusviridae, tombusvirus</i>) <i>Cynodon chlorotic streak virus</i> <i>Cynosurus mottle virus</i> (CnMoV) (<i>Sobemovirus</i>) <i>Dahlia mosaic virus</i> (DMV) (<i>Caulimoviridae,caulimovirus</i>) <i>Dandelion latent virus</i> (DaLV) (<i>Carlavirus</i>) <i>Dandelion yellow mosaic virus</i> (DaYMV) (<i>Sequiviridae, sequivirus</i>) <i>Daphne virus X</i> (DVX) (<i>Potexvirus</i>) <i>Daphne virus Y</i> (DVY) (<i>Potyviridae, potyvirus</i>) <i>Datura Colombian virus</i> (CDV) (<i>Potyviridae, potyvirus</i>) <i>Datura distortion mosaic virus</i> (DDMV) (<i>Potyviridae, potyvirus</i>) <i>Datura necrosis virus</i> (DNV) (<i>Potyviridae, potyvirus</i>) <i>Datura shoestring virus</i> (DSTV) (<i>Potyviridae, potyvirus</i>) <i>Datura yellow vein virus</i> (DYVV) (<i>Rhabdoviridae, nucleorhabdovirus</i>) <i>Datura distortion virus</i>	
---	--	--

<i>Datura enation mosaic virus</i> <i>Dendrobium mosaic virus</i> (DeMV) (Potyviridae, potyvirus) <i>Desmodium mosaic virus</i> (DesMV) (Potyviridae, potyvirus) <i>Desmodium yellow mottle virus</i> (DYMV) (Tymovirus) <i>Digitaria streak virus</i> (DSV) (Geminiviridae, monogeminivirus) <i>Digitaria striate mosaic</i> (DiSMV) (Geminiviridae, monogeminivirus) <i>Dioscorea alata virus</i> (Potyviridae, potyvirus) <i>Dioscorea bacilliform virus</i> (DBV) (Caulimoviridae, badnavirus) <i>Dioscorea green banding mosaic virus</i> (Potyviridae, potyvirus) <i>Dodonaea yellows-associated virus</i> <i>Dolichos yellow mosaic virus</i> (DoMYV) (Geminiviridae,bigeminivirus) <i>Dulcamara mottle virus</i> (DuMV) (Tymovirus) <i>Eggplant green mosaic virus</i> (EGMV) (Potyviridae, potyvirus) <i>Eggplant mottled dwarf virus</i> (EMDV) (Rhabdoviridae, nucleorhabdoviru) <i>Elderberry virus</i> (EV) (Carlavirus 1) <i>Epirus cherry virus</i> (EpCV) (Ourmiavirus) <i>Erysimum latent virus</i> (ErLV) (Tymovirus) <i>Echinochloa ragged stunt virus</i> (ERSV) (Reoviridae, Oryzavirus) <i>Elm mottle virus</i> (EMoV) (Bromoviridae, Ilarvirus) <i>European wheat striate mosaic virus</i> (EWSMV) (Tenuivirus) <i>Euphorbia mosaic virus</i> (EuMV) (Geminiviridae, bigeminivirus) <i>Euphorbia ringspot virus</i> (EuRV) (Potyviridae, potyvirus) <i>Faba bean necrotic yellows virus</i> (FBNYV) (Nanovirus) <i>Festuca leaf streak virus</i> (FLSV) (Rhabdoviridae, cytorhabdovirus) <i>Fig virus S</i> (FVS) (Carlavirus) <i>Figwort mosaic virus</i> (FMV) (Caulimoviridae, caulimovirus) <i>Foxtail mosaic virus</i> (FoMV) (Potexvirus) <i>Frangipani mosaic virus</i> (FrMV) (Tobamovirus) <i>French bean mosaic virus</i> <i>Freesia leaf necrosis virus</i> (FLNV) (Varicosavirus) <i>Freesia mosaic virus</i> (FreMV) (Potyviridae, Potyvirus) <i>Galinsoga mosaic virus</i> (GaMV) (Tombusviridae, carmovirus) <i>Glycine mosaic virus</i> (GMV) (Comoviridae, Comovirus) <i>Grapevine Algerian latent virus</i> (GALV) (Tombusviridae, Tombusvirus) <i>Grapevine asteroid mosaic virus</i> <i>Grapevine berry inner necrosis virus</i> (GINV) (Trichovirus) <i>Grapevine Bulgarian latent virus</i> (GBLV) (Comoviridae, Nepovirus) <i>Grapevine chrome mosaic virus</i> (GCMV) (Comoviridae, Nepovirus) <i>Grapevine leafroll-associated virus 1</i> (GLRAV-1)(Closteroviridae, Ampelovirus) <i>Grapevine stem pitting associated closterovirus</i> (Closteroviridae, Closterovirus) <i>Grapevine Tunisian ringspot virus</i> (GTRSV) (Comoviridae, Nepovirus) <i>Grapevine fanleaf virus</i> (GFLV) (Comoviridae, nepovirus) <i>Grapevine fleck virus</i> (GFkV) <i>Grapevine stunt virus</i> <i>Grapevine vein necrosis virus</i> <i>Grapevine virus A</i> (GVA) (Betaflexiviridae, Vitivirus) <i>Grapevine virus B</i> (GVB) (Vitivirus, Flexiviridae)	<i>Datura enation mosaic virus</i> <i>Dendrobium mosaic virus</i> (DeMV) (Potyviridae, potyvirus) <i>Desmodium mosaic virus</i> (DesMV) (Potyviridae, potyvirus) <i>Desmodium yellow mottle virus</i> (DYMV) (Tymovirus) <i>Digitaria streak virus</i> (DSV) (Geminiviridae, monogeminivirus) <i>Digitaria striate mosaic</i> (DiSMV) (Geminiviridae, monogeminivirus) <i>Dioscorea alata virus</i> (Potyviridae, potyvirus) <i>Dioscorea bacilliform virus</i> (DBV) (Caulimoviridae, badnavirus) <i>Dioscorea green banding mosaic virus</i> (Potyviridae, potyvirus) <i>Dodonaea yellows-associated virus</i> <i>Dolichos yellow mosaic virus</i> (DoMYV) (Geminiviridae,bigeminivirus) <i>Dulcamara mottle virus</i> (DuMV) (Tymovirus) <i>Eggplant green mosaic virus</i> (EGMV) (Potyviridae, potyvirus) <i>Eggplant mottled dwarf virus</i> (EMDV) (Rhabdoviridae, nucleorhabdoviru) <i>Elderberry virus</i> (EV) (Carlavirus 1) <i>Epirus cherry virus</i> (EpCV) (Ourmiavirus) <i>Erysimum latent virus</i> (ErLV) (Tymovirus) <i>Echinochloa ragged stunt virus</i> (ERSV) (Reoviridae, Oryzavirus) <i>Elm mottle virus</i> (EMoV) (Bromoviridae, Ilarvirus) <i>European wheat striate mosaic virus</i> (EWSMV) (Tenuivirus) <i>Euphorbia mosaic virus</i> (EuMV) (Geminiviridae, bigeminivirus) <i>Euphorbia ringspot virus</i> (EuRV) (Potyviridae, potyvirus) <i>Faba bean necrotic yellows virus</i> (FBNYV) (Nanovirus) <i>Festuca leaf streak virus</i> (FLSV) (Rhabdoviridae, cytorhabdovirus) <i>Fig virus S</i> (FVS) (Carlavirus) <i>Figwort mosaic virus</i> (FMV) (Caulimoviridae, caulimovirus) <i>Foxtail mosaic virus</i> (FoMV) (Potexvirus) <i>Frangipani mosaic virus</i> (FrMV) (Tobamovirus) <i>French bean mosaic virus</i> <i>Freesia leaf necrosis virus</i> (FLNV) (Varicosavirus) <i>Freesia mosaic virus</i> (FreMV) (Potyviridae, Potyvirus) <i>Galinsoga mosaic virus</i> (GaMV) (Tombusviridae, carmovirus) <i>Glycine mosaic virus</i> (GMV) (Comoviridae, Comovirus) <i>Grapevine Algerian latent virus</i> (GALV) (Tombusviridae, Tombusvirus) <i>Grapevine asteroid mosaic virus</i> <i>Grapevine berry inner necrosis virus</i> (GINV) (Trichovirus) <i>Grapevine Bulgarian latent virus</i> (GBLV) (Comoviridae, Nepovirus) <i>Grapevine chrome mosaic virus</i> (GCMV) (Comoviridae, Nepovirus) <i>Grapevine leafroll-associated virus 1</i> (GLRAV-1)(Closteroviridae, Ampelovirus) <i>Grapevine stem pitting associated closterovirus</i> (Closteroviridae, Closterovirus) <i>Grapevine Tunisian ringspot virus</i> (GTRSV) (Comoviridae, Nepovirus) <i>Grapevine fanleaf virus</i> (GFLV) (Comoviridae, nepovirus) <i>Grapevine fleck virus</i> (GFkV) <i>Grapevine stunt virus</i> <i>Grapevine vein necrosis virus</i> <i>Grapevine virus A</i> (GVA) (Betaflexiviridae, Vitivirus) <i>Grapevine virus B</i> (GVB) (Vitivirus, Flexiviridae)	
---	---	--

Grapevine yellow speckle viroid (GYSVd) (<i>Pospiviroidae</i>, <i>Apscaviroid</i>) Groundnut chlorotic leaf streak virus Groundnut chlorotic spotting virus Groundnut rosette assistor virus (GRAV) (<i>Luteoviridae</i>, <i>Enamovirus</i>) Groundnut rosette virus (GRV) (<i>Umbravirus</i>) Groundnut eyespot virus (GEV) (<i>Potyviridae</i>, <i>Potyvirus</i>) Guar symptomless virus (GSLV) (<i>Potyviridae</i>, <i>Potyvirus</i>) Guar top necrosis virus Guinea grass mosaic virus (GGMV) (<i>Potyviridae</i>, <i>Potyvirus</i>) Helenium virus S (HVS) (<i>Carlavirus</i>) Helenium virus Y (HVY) (<i>Potyviridae</i>, <i>Potyvirus</i>) Henbane mosaic virus (HMV) (<i>Potyviridae</i>, <i>Potyvirus</i>) Heracleum latent virus (HLV) (<i>Vitivirus</i>) Hibiscus latent ringspot virus (HLRSV) (<i>Comoviridae</i>, <i>nepovirus</i>) Hibiscus chlorotic ringspot virus (HCRSV) (<i>Tombusviridae</i>, <i>Carmovirus</i>) Hippeastrum mosaic virus Honeysuckle latent virus (LnLV) (<i>Carlavirus</i>) Hop American latent (AHLV) (<i>Carlavirus</i>) Hop latent virus (HpLV) (<i>Carlavirus</i>) Hop mosaic virus (HpMV) (<i>Carlavirus</i>) Hop trefoil cryptic virus 1 (HTCV-1) (<i>Partitiviridae</i>, <i>alphacryptovirus</i>) Hop trefoil cryptic virus 2 (HTCV-2) (<i>Partitiviridae</i>, <i>betacryptovirus</i>) Hop trefoil cryptic virus 3 (HTCV-3) (<i>Partitiviridae</i>, <i>alphacryptovirus</i>) Hop stunt viroid (HpSVd) (<i>Hostuviroid</i>, <i>Pospiviroidae</i>) Hordeum mosaic virus (HoMV) (<i>Potyviridae</i>, <i>Potyvirus</i>) Humulus japonicus virus (HJV) (<i>Bromoviridae</i>, <i>ilarvirus</i>) Hyacinth mosaic virus (HyaMV) (<i>Potyviridae</i>, <i>Potyvirus</i>) Hydrangea mosaic virus (HdMV) (<i>Bromoviridae</i>, <i>ilarvirus</i>) Hydrangea ringspot virus (HRSV) (<i>Potexvirus</i>) Horsegram yellow mosaic virus (HgYMV) (<i>Geminiviridae</i>, <i>Begomovirus</i>) Iris fulva mosaic virus (IFMV) (<i>Potyviridae</i>, <i>Potyvirus</i>) Iris Japanese necrotic ring virus Iris mild mosaic virus (IMMV) (<i>Potyviridae</i>, <i>Potyvirus</i>) Iris severe mosaic virus (ISMV) (<i>Potyviridae</i>, <i>Potyvirus</i>) Indian peanut clump virus (IPCV) (<i>Pechivirus</i>) Indonesian soybean dwarf virus (ISDV) (<i>Luteoviridae</i>, <i>Enamovirus</i>) Iranian maize mosaic virus Jatropha mosaic virus (JMV) (<i>Geminiviridae</i>, <i>bigeminivirus</i>) Johnsongrass mosaic (JGMV) (<i>Potyviridae</i>, <i>Potyvirus</i>) Kalanchoe isometric virus Kalanchoe latent virus (KLV) (<i>Carlavirus</i>) Kalanchoe top-spotting virus (KTSV) (<i>Caulimoviridae</i>, <i>badnavirus</i>) Kennedya yellow mosaic virus (KYMV) (<i>Tymovirus</i>) Kennedya virus Y (KVY) (<i>Potyviridae</i>, <i>Potyvirus</i>) Kyuri green mottle mosaic virus (KGMMV) (<i>Tobamovirus</i>) Konjac mosaic virus (KoMV) (<i>Potyviridae</i>, <i>Potyvirus</i>) Kober stem grooving	Grapevine yellow speckle viroid (GYSVd) (<i>Pospiviroidae</i>, <i>Apscaviroid</i>) Groundnut chlorotic leaf streak virus Groundnut chlorotic spotting virus Groundnut rosette assistor virus (GRAV) (<i>Luteoviridae</i>, <i>Enamovirus</i>) Groundnut rosette virus (GRV) (<i>Umbravirus</i>) Groundnut eyespot virus (GEV) (<i>Potyviridae</i>, <i>Potyvirus</i>) Guar symptomless virus (GSLV) (<i>Potyviridae</i>, <i>Potyvirus</i>) Guar top necrosis virus Guinea grass mosaic virus (GGMV) (<i>Potyviridae</i>, <i>Potyvirus</i>) Helenium virus S (HVS) (<i>Carlavirus</i>) Helenium virus Y (HVY) (<i>Potyviridae</i>, <i>Potyvirus</i>) Henbane mosaic virus (HMV) (<i>Potyviridae</i>, <i>Potyvirus</i>) Heracleum latent virus (HLV) (<i>Vitivirus</i>) Hibiscus latent ringspot virus (HLRSV) (<i>Comoviridae</i>, <i>nepovirus</i>) Hibiscus chlorotic ringspot virus (HCRSV) (<i>Tombusviridae</i>, <i>Carmovirus</i>) Hippeastrum mosaic virus Honeysuckle latent virus (LnLV) (<i>Carlavirus</i>) Hop American latent (AHLV) (<i>Carlavirus</i>) Hop latent virus (HpLV) (<i>Carlavirus</i>) Hop mosaic virus (HpMV) (<i>Carlavirus</i>) Hop trefoil cryptic virus 1 (HTCV-1) (<i>Partitiviridae</i>, <i>alphacryptovirus</i>) Hop trefoil cryptic virus 2 (HTCV-2) (<i>Partitiviridae</i>, <i>betacryptovirus</i>) Hop trefoil cryptic virus 3 (HTCV-3) (<i>Partitiviridae</i>, <i>alphacryptovirus</i>) Hop stunt viroid (HpSVd) (<i>Hostuviroid</i>, <i>Pospiviroidae</i>) Hordeum mosaic virus (HoMV) (<i>Potyviridae</i>, <i>Potyvirus</i>) Humulus japonicus virus (HJV) (<i>Bromoviridae</i>, <i>ilarvirus</i>) Hyacinth mosaic virus (HyaMV) (<i>Potyviridae</i>, <i>Potyvirus</i>) Hydrangea mosaic virus (HdMV) (<i>Bromoviridae</i>, <i>ilarvirus</i>) Hydrangea ringspot virus (HRSV) (<i>Potexvirus</i>) Horsegram yellow mosaic virus (HgYMV) (<i>Geminiviridae</i>, <i>Begomovirus</i>) Iris fulva mosaic virus (IFMV) (<i>Potyviridae</i>, <i>Potyvirus</i>) Iris Japanese necrotic ring virus Iris mild mosaic virus (IMMV) (<i>Potyviridae</i>, <i>Potyvirus</i>) Iris severe mosaic virus (ISMV) (<i>Potyviridae</i>, <i>Potyvirus</i>) Indian peanut clump virus (IPCV) (<i>Pechivirus</i>) Indonesian soybean dwarf virus (ISDV) (<i>Luteoviridae</i>, <i>Enamovirus</i>) Iranian maize mosaic virus Jatropha mosaic virus (JMV) (<i>Geminiviridae</i>, <i>bigeminivirus</i>) Johnsongrass mosaic (JGMV) (<i>Potyviridae</i>, <i>Potyvirus</i>) Kalanchoe isometric virus Kalanchoe latent virus (KLV) (<i>Carlavirus</i>) Kalanchoe top-spotting virus (KTSV) (<i>Caulimoviridae</i>, <i>badnavirus</i>) Kennedya yellow mosaic virus (KYMV) (<i>Tymovirus</i>) Kennedya virus Y (KVY) (<i>Potyviridae</i>, <i>Potyvirus</i>) Kyuri green mottle mosaic virus (KGMMV) (<i>Tobamovirus</i>) Konjac mosaic virus (KoMV) (<i>Potyviridae</i>, <i>Potyvirus</i>) Kober stem grooving	
--	--	--

<i>Lamium mild mottle virus</i> (LMMV) (<i>Comoviridae, fabavirus</i>) <i>Lato River virus</i> (LRV) (<i>Tombusviridae, tombusvirus</i>) <i>Leek yellow stripe virus</i> (LYSV) (<i>Potyviridae, potyvirus</i>) <i>Lettuce big-vein virus</i> (LBVV) (<i>Varicosavirus</i>) <i>Lettuce mosaic virus</i> (LMV) (<i>Potyviridae, potyvirus</i>) <i>Lettuce necrotic yellows virus</i> (LNYV) (<i>Rhabdoviridae, cytorhabdovirus</i>) <i>Lettuce speckles mottle virus</i> (LSMV) (<i>Umbravirus</i>) <i>Lilac chlorotic leafspot virus</i> (LCLV) (<i>Capillovirus</i>) <i>Lilac mottle virus</i> (LiMV) (<i>Carlavirus</i>) <i>Lilac ring mottle virus</i> (LRMV) (<i>Bromoviridae, ilarvirus</i>) <i>Lily mottle virus</i> (LMoV) (<i>Potyviridae, potyvirus</i>) <i>Lily virus X</i> (LVX) (<i>Potexvirus</i>) <i>Lettuce infectious yellows virus</i> (LIYV) (<i>Closteroviridae, Crinivirus</i>) <i>Limabean golden mosaic virus</i> (LGMV) (<i>Geminiviridae, Begomovirus</i>) <i>Little cherry virus</i> (LChV) (<i>Closteroviridae, Closterovirus</i>) <i>LN33 stem grooving</i> <i>Lucerne Australian symptomless virus</i> (LASV) (<i>Comoviridae, Nepovirus</i>) <i>Lucerne vein yellowing virus</i> <i>Lucerne transient streak virus</i> (LTSV) (<i>Sobemovirus</i>) <i>Lychnis ringspot virus</i> (LRSV) (<i>Hordeivirus</i>) <i>Maclura mosaic virus</i> (MacMV) (<i>Potyviridae, macluravirus</i>) <i>Maize chlorotic dwarf virus</i> (MCDV) (<i>Sequiviridae, waikavirus</i>) <i>Maize chlorotic mottle virus</i> (MCMV) (<i>Tombusviridae, machlomovirus</i>) <i>Maize dwarf mosaic virus</i> (MDMV) (<i>Potyviridae, potyvirus</i>) <i>Maize line virus</i> <i>Maize mosaic virus</i> (MMV) (<i>Rhabdoviridae, nucleorhabdovirus</i>) <i>Maize rayado fino virus</i> (MRFV) (<i>Marafivirus</i>) <i>Maize white line mosaic virus</i> (MWLMV) <i>Maize mottle/chlorotic stunt virus</i> <i>Maize rough dwarf virus</i> (MRDV) (<i>Reoviridae, Fijivirus</i>) <i>Maize streak virus</i> (MSV) (<i>Genimiviridae, Mastrevirus</i>) <i>Malvastrum mottle virus</i> <i>Malva vein clearing virus</i> (MVCV) (<i>Potyviridae, potyvirus</i>) <i>Marigold mottle virus</i> (MaMoV) (<i>Potyviridae, potyvirus</i>) <i>Melandrium yellow fleck virus</i> (MYFV) (<i>Bromoviridae, bromovirus</i>) <i>Melon leaf curl virus</i> (MLCV) (<i>Geminiviridae, bigeminivirus</i>) <i>Melon Ourmia virus</i> (OuMV) (<i>Ourmiavirus</i>) <i>Melon rugose mosaic virus</i> (MRMV) (<i>Tymovirus</i>) <i>Milk vetch dwarf virus</i> (MDV) (<i>Nanovirus</i>) <i>Mimosa mosaic virus</i> <i>Mirabilis mosaic virus</i> (MiMV) (<i>Caulimovirus</i>) <i>Miscanthus streak virus</i> (MiSV) (<i>Geminiviridae, monogeminivirus</i>) <i>Mulberry latent virus</i> (MLV) (<i>Carlavirus</i>) <i>Mulberry ringspot virus</i> (MRSV) (<i>Comoviridae, nepovirus</i>) <i>Mung bean yellow mosaic virus</i> (MYMV) (<i>Geminiviridae, bigeminivirus</i>) <i>Muskmelon vein necrosis virus</i> (MuVNV) (<i>Carlavirus</i>) <i>Myrobalan latent ringspot virus</i> (MLRSV) (<i>Comoviridae, nepovirus</i>)	<i>Lamium mild mottle virus</i> (LMMV) (<i>Comoviridae, fabavirus</i>) <i>Lato River virus</i> (LRV) (<i>Tombusviridae, tombusvirus</i>) <i>Leek yellow stripe virus</i> (LYSV) (<i>Potyviridae, potyvirus</i>) <i>Lettuce big-vein virus</i> (LBVV) (<i>Varicosavirus</i>) <i>Lettuce mosaic virus</i> (LMV) (<i>Potyviridae, potyvirus</i>) <i>Lettuce necrotic yellows virus</i> (LNYV) (<i>Rhabdoviridae, cytorhabdovirus</i>) <i>Lettuce speckles mottle virus</i> (LSMV) (<i>Umbravirus</i>) <i>Lilac chlorotic leafspot virus</i> (LCLV) (<i>Capillovirus</i>) <i>Lilac mottle virus</i> (LiMV) (<i>Carlavirus</i>) <i>Lilac ring mottle virus</i> (LRMV) (<i>Bromoviridae, ilarvirus</i>) <i>Lily mottle virus</i> (LMoV) (<i>Potyviridae, potyvirus</i>) <i>Lily virus X</i> (LVX) (<i>Potexvirus</i>) <i>Lettuce infectious yellows virus</i> (LIYV) (<i>Closteroviridae, Crinivirus</i>) <i>Limabean golden mosaic virus</i> (LGMV) (<i>Geminiviridae, Begomovirus</i>) <i>Little cherry virus</i> (LChV) (<i>Closteroviridae, Closterovirus</i>) <i>LN33 stem grooving</i> <i>Lucerne Australian symptomless virus</i> (LASV) (<i>Comoviridae, Nepovirus</i>) <i>Lucerne vein yellowing virus</i> <i>Lucerne transient streak virus</i> (LTSV) (<i>Sobemovirus</i>) <i>Lychnis ringspot virus</i> (LRSV) (<i>Hordeivirus</i>) <i>Maclura mosaic virus</i> (MacMV) (<i>Potyviridae, macluravirus</i>) <i>Maize chlorotic dwarf virus</i> (MCDV) (<i>Sequiviridae, waikavirus</i>) <i>Maize chlorotic mottle virus</i> (MCMV) (<i>Tombusviridae, machlomovirus</i>) <i>Maize dwarf mosaic virus</i> (MDMV) (<i>Potyviridae, potyvirus</i>) <i>Maize line virus</i> <i>Maize mosaic virus</i> (MMV) (<i>Rhabdoviridae, nucleorhabdovirus</i>) <i>Maize rayado fino virus</i> (MRFV) (<i>Marafivirus</i>) <i>Maize white line mosaic virus</i> (MWLMV) <i>Maize mottle/chlorotic stunt virus</i> <i>Maize rough dwarf virus</i> (MRDV) (<i>Reoviridae, Fijivirus</i>) <i>Maize streak virus</i> (MSV) (<i>Genimiviridae, Mastrevirus</i>) <i>Malvastrum mottle virus</i> <i>Malva vein clearing virus</i> (MVCV) (<i>Potyviridae, potyvirus</i>) <i>Marigold mottle virus</i> (MaMoV) (<i>Potyviridae, potyvirus</i>) <i>Melandrium yellow fleck virus</i> (MYFV) (<i>Bromoviridae, bromovirus</i>) <i>Melon leaf curl virus</i> (MLCV) (<i>Geminiviridae, bigeminivirus</i>) <i>Melon Ourmia virus</i> (OuMV) (<i>Ourmiavirus</i>) <i>Melon rugose mosaic virus</i> (MRMV) (<i>Tymovirus</i>) <i>Milk vetch dwarf virus</i> (MDV) (<i>Nanovirus</i>) <i>Mimosa mosaic virus</i> <i>Mirabilis mosaic virus</i> (MiMV) (<i>Caulimovirus</i>) <i>Miscanthus streak virus</i> (MiSV) (<i>Geminiviridae, monogeminivirus</i>) <i>Mulberry latent virus</i> (MLV) (<i>Carlavirus</i>) <i>Mulberry ringspot virus</i> (MRSV) (<i>Comoviridae, nepovirus</i>) <i>Mung bean yellow mosaic virus</i> (MYMV) (<i>Geminiviridae, bigeminivirus</i>) <i>Muskmelon vein necrosis virus</i> (MuVNV) (<i>Carlavirus</i>) <i>Myrobalan latent ringspot virus</i> (MLRSV) (<i>Comoviridae, nepovirus</i>)	
--	--	--

<i>Narcissus latent virus</i> (NLV) (<i>Potyviridae, macluravirus</i>) <i>Narcissus mosaic virus</i> (NMV) (<i>Potexvirus</i>) <i>Narcissus yellow stripe virus</i> (<i>Potyviridae, potyvirus</i>) <i>Natsudaidai dwarf virus</i> (NDV) (<i>Sadwavirus</i>) <i>Neckar River virus</i> (NRV) (<i>Tombusviridae, tombusvirus</i>) <i>Nerine latent virus</i> (NeLV) (<i>Carlavirus</i>) <i>Nerine virus</i> (NV) (<i>Potyviridae, potyvirus</i>) <i>Nerine virus X</i> (NVX) (<i>Potexvirus</i>) <i>Northern cereal mosaic virus</i> (NCMV) (<i>Rhabdoviridae, Cytorhabdovirus</i>) <i>Oak ringspot virus</i> <i>Oat blue dwarf virus</i> (OBDV) (<i>Marafivirus</i>) <i>Oat golden stripe virus</i> (OGSV) (<i>Furovirus</i>) <i>Oat mosaic virus</i> (OMV)(<i>Potyviridae, bymovirus</i>) <i>Oat necrotic mottle virus</i> (ONMV) (<i>Potyviridae, rymovirus</i>) <i>Oat red streak mosaic virus</i> <i>Oat sterile dwarf virus</i> (OSDV) (<i>Reoviridae, Fijivirus</i>) <i>Okra leaf-curl virus</i> (OLCV) (<i>Geminivirus, bigeminivirus</i>) <i>Okra mosaic virus</i> (OkMV) (<i>Tymovirus</i>) <i>Olive latent ringspot virus</i> (OLRSV) (<i>Comoviridae, nepovirus</i>) <i>Ononis yellow mosaic virus</i> (OYMV) (<i>Tymovirus</i>) <i>Opuntia Sammons' virus</i> (SOV) (<i>Tobamovirus</i>) <i>Ornithogalum mosaic virus</i> <i>Pangola stunt virus</i> (PaSV) (<i>Reoviridae, Fijivirus</i>) <i>Panicum streak virus</i> (PanSV) (<i>Geminiviridae, monogeminivirus</i>) <i>Papaya leaf curl virus</i> (PaLCuV) (<i>Begomovirus, Geminiviridae</i>) <i>Papaya meleira virus</i> (PMeV) <i>Papaya mosaic virus</i> (PapMV) (<i>Potexvirus, Flexiviridae</i>) <i>Paprika mild mottle virus</i> (PaMMV) (<i>Tobamovirus</i>) <i>Parietaria mottle virus</i> (PmoV) (<i>Bromoviridae, ilarvirus</i>) <i>Parsnip leafcurl virus</i> <i>Parsnip mosaic virus</i> (ParMV) <i>Parsnip yellow fleck virus</i> (PYFV) (<i>Sequiviridae, sequivirus</i>) <i>Paspalum striate mosaic virus</i> (PSMV) (<i>Geminiviridae, monogeminivirus</i>) <i>Passiflora latent virus</i> (PLV)(<i>Carlavirus</i>) <i>Passiflora South African virus</i> (<i>Potyviridae, potyvirus</i>) <i>Passiflora ringspot virus</i> (PFRSV) (<i>Potyviridae, potyvirus</i>) <i>Passionfruit woodiness virus</i> (PWV) (<i>Potyviridae, potyvirus</i>) <i>Passionfruit yellow mosaic virus</i> (PaYMV) (<i>Tymovirus</i>) <i>Patchouli mosaic virus</i> (<i>Potyviridae, potyvirus</i>) <i>Pea early browning virus</i> (PEBV) (<i>Tobravirus</i>) <i>Pea enation mosaic virus-1</i> (PEMV-1) (<i>Luteovirus</i>) <i>Pea enation mosaic virus-2</i> (PEMV-2) (<i>Umbravirus</i>) <i>Pea mild mosaic virus</i> (PmiMV) (<i>Comoviridae, comovirus</i>) <i>Pea mosaic virus</i> (<i>Potyviridae, potyvirus</i>) <i>Peanut chlorotic streak virus</i> (PCSV) (<i>Caulimoviridae, caulimovirus</i>) <i>Peanut green mosaic virus</i> (<i>Potyviridae, potyvirus</i>) <i>Peanut stunt virus</i> (PSV) (<i>Bromoviridae, cucumovirus</i>)	<i>Narcissus latent virus</i> (NLV) (<i>Potyviridae, macluravirus</i>) <i>Narcissus mosaic virus</i> (NMV) (<i>Potexvirus</i>) <i>Narcissus yellow stripe virus</i> (<i>Potyviridae, potyvirus</i>) <i>Natsudaidai dwarf virus</i> (NDV) (<i>Sadwavirus</i>) <i>Neckar River virus</i> (NRV) (<i>Tombusviridae, tombusvirus</i>) <i>Nerine latent virus</i> (NeLV) (<i>Carlavirus</i>) <i>Nerine virus</i> (NV) (<i>Potyviridae, potyvirus</i>) <i>Nerine virus X</i> (NVX) (<i>Potexvirus</i>) <i>Northern cereal mosaic virus</i> (NCMV) (<i>Rhabdoviridae, Cytorhabdovirus</i>) <i>Oak ringspot virus</i> <i>Oat blue dwarf virus</i> (OBDV) (<i>Marafivirus</i>) <i>Oat golden stripe virus</i> (OGSV) (<i>Furovirus</i>) <i>Oat mosaic virus</i> (OMV)(<i>Potyviridae, bymovirus</i>) <i>Oat necrotic mottle virus</i> (ONMV) (<i>Potyviridae, rymovirus</i>) <i>Oat red streak mosaic virus</i> <i>Oat sterile dwarf virus</i> (OSDV) (<i>Reoviridae, Fijivirus</i>) <i>Okra leaf-curl virus</i> (OLCV) (<i>Geminivirus, bigeminivirus</i>) <i>Okra mosaic virus</i> (OkMV) (<i>Tymovirus</i>) <i>Olive latent ringspot virus</i> (OLRSV) (<i>Comoviridae, nepovirus</i>) <i>Ononis yellow mosaic virus</i> (OYMV) (<i>Tymovirus</i>) <i>Opuntia Sammons' virus</i> (SOV) (<i>Tobamovirus</i>) <i>Ornithogalum mosaic virus</i> <i>Pangola stunt virus</i> (PaSV) (<i>Reoviridae, Fijivirus</i>) <i>Panicum streak virus</i> (PanSV) (<i>Geminiviridae, monogeminivirus</i>) <i>Papaya leaf curl virus</i> (PaLCuV) (<i>Begomovirus, Geminiviridae</i>) <i>Papaya meleira virus</i> (PMeV) <i>Papaya mosaic virus</i> (PapMV) (<i>Potexvirus, Flexiviridae</i>) <i>Paprika mild mottle virus</i> (PaMMV) (<i>Tobamovirus</i>) <i>Parietaria mottle virus</i> (PmoV) (<i>Bromoviridae, ilarvirus</i>) <i>Parsnip leafcurl virus</i> <i>Parsnip mosaic virus</i> (ParMV) <i>Parsnip yellow fleck virus</i> (PYFV) (<i>Sequiviridae, sequivirus</i>) <i>Paspalum striate mosaic virus</i> (PSMV) (<i>Geminiviridae, monogeminivirus</i>) <i>Passiflora latent virus</i> (PLV)(<i>Carlavirus</i>) <i>Passiflora South African virus</i> (<i>Potyviridae, potyvirus</i>) <i>Passiflora ringspot virus</i> (PFRSV) (<i>Potyviridae, potyvirus</i>) <i>Passionfruit woodiness virus</i> (PWV) (<i>Potyviridae, potyvirus</i>) <i>Passionfruit yellow mosaic virus</i> (PaYMV) (<i>Tymovirus</i>) <i>Patchouli mosaic virus</i> (<i>Potyviridae, potyvirus</i>) <i>Pea early browning virus</i> (PEBV) (<i>Tobravirus</i>) <i>Pea enation mosaic virus-1</i> (PEMV-1) (<i>Luteovirus</i>) <i>Pea enation mosaic virus-2</i> (PEMV-2) (<i>Umbravirus</i>) <i>Pea mild mosaic virus</i> (PmiMV) (<i>Comoviridae, comovirus</i>) <i>Pea mosaic virus</i> (<i>Potyviridae, potyvirus</i>) <i>Peanut chlorotic streak virus</i> (PCSV) (<i>Caulimoviridae, caulimovirus</i>) <i>Peanut green mosaic virus</i> (<i>Potyviridae, potyvirus</i>) <i>Peanut stunt virus</i> (PSV) (<i>Bromoviridae, cucumovirus</i>)	
---	---	--

<i>Peanut yellow spot virus (PeYMV) (Tospovirus)</i> <i>Peach American mosaic virus</i> <i>Peach latent mosaic viroid (PLMVd)</i> <i>Peach mosaic virus (PMV) (Trichovirus)</i> <i>Peach rosette mosaic virus (PRMV) (Comoviridae, Nepovirus)</i> <i>Peanut clump virus (PCV) (Peculovirus)</i> <i>Pear blister canker viroid (PBCVd) (Pospiviroidae, Apscaviriod)</i> <i>Pear necrotic spot virus</i> <i>Pineapple bacilliform virus (PBV) (Badnavirus, Caulimoviridae)</i> <i>Pineapple mealybug wilt-associated virus-1 (PMWaV-1) (Ampelovirus, Closteroviridae)</i> <i>Pineapple mealybug wilt-associated virus-2 (PMWaV-2) (Ampelovirus, Closteroviridae)</i> <i>Plum American line pattern virus (APLPV) (Ilarvirus, Bromoviridae)</i> <i>Plum bark split virus</i> <i>Plum pox virus (PPV) (Potyviridae, Potyvirus)</i> <i>Plum rusty blotch</i> <i>Potato black ringspot virus (PBRSV) (Comoviridae, Nepovirus)</i> <i>Potato deforming mosaic virus</i> <i>Potato mop-top virus (PMTV) (Pomovirus)</i> <i>Potato virus T (PVT) (Trichovirus)</i> <i>Potato virus U (PVU) (Comoviridae, Nepovirus)</i> <i>Potato virus V (PVV) (Potyviridae, Potyvirus)</i> <i>Potato yellow dwarf virus (PYDV) (Rhabdoviridae, Nucleorhabdovirus)</i> <i>Potato yellow vein virus (PYVV) (Closteroviridae, Crinivirus)</i> <i>Potato yellowing virus</i> <i>Prune dwarf virus (PDV) (Bromoviridae, Ilarvirus)</i> <i>Prunus necrotic ringspot virus (PNRSV) (Bromoviridae, Ilarvirus)</i> <i>Raspberry leaf curl virus</i> <i>Raspberry ringspot virus (RpRSV) (Comoviridae, Nepovirus)</i> <i>Red clover mottle virus (RCMV) (Comoviridae, Comovirus)</i> <i>Rice gall dwarf virus (RGDV) (Reoviridae, Phytoreovirus)</i> <i>Rice tungro bacilliform virus (RTBV) (Caulimoviridae, Rice tungro bacilliform-like virus)</i> <i>Rice tungro spherical virus (RTSV) (Sequiviridae, Waikavirus)</i> <i>Rice yellow mottle virus (RYMV) (Sobemovirus)</i> <i>Rupestris stem pitting-associated virus (Foveavirus, Flexiviridae)</i> <i>Squash leaf curl virus (SLCV) (Geminiviridae, Begomovirus)</i> <i>Squash mosaic virus (SqMV) (Comoviridae, Comovirus)</i> <i>Strawberry latent ringspot virus (SLRSV) (Sadwavirus)</i> <i>Strawberry veinbanding virus (SVBV) (Caulimoviridae, Caulimovirus)</i> <i>Sugarcane yellow leaf virus (ScYLV) (Polerovirus, Luteoviridae)</i> <i>Tobacco rattle virus (TRV) (Tobravirus)</i> <i>Tobacco ringspot virus (TRSV) (Comoviridae, Nepovirus)</i> <i>Tobacco mosaic virus (TMV) (Tobamovirus)</i> <i>Tobacco necrosis virus</i> <i>Tobacco streak virus (TSV) (Ilarvirus, Bromoviridae)</i>	<i>Peanut yellow spot virus (PeYMV) (Tospovirus)</i> <i>Peach American mosaic virus</i> <i>Peach latent mosaic viroid (PLMVd)</i> <i>Peach mosaic virus (PMV) (Trichovirus)</i> <i>Peach rosette mosaic virus (PRMV) (Comoviridae, Nepovirus)</i> <i>Peanut clump virus (PCV) (Peculovirus)</i> <i>Pear blister canker viroid (PBCVd) (Pospiviroidae, Apscaviriod)</i> <i>Pear necrotic spot virus</i> <i>Pineapple bacilliform virus (PBV) (Badnavirus, Caulimoviridae)</i> <i>Pineapple mealybug wilt-associated virus-1 (PMWaV-1) (Ampelovirus, Closteroviridae)</i> <i>Pineapple mealybug wilt-associated virus-2 (PMWaV-2) (Ampelovirus, Closteroviridae)</i> <i>Plum American line pattern virus (APLPV) (Ilarvirus, Bromoviridae)</i> <i>Plum bark split virus</i> <i>Plum pox virus (PPV) (Potyviridae, Potyvirus)</i> <i>Plum rusty blotch</i> <i>Potato black ringspot virus (PBRSV) (Comoviridae, Nepovirus)</i> <i>Potato deforming mosaic virus</i> <i>Potato mop-top virus (PMTV) (Pomovirus)</i> <i>Potato virus T (PVT) (Trichovirus)</i> <i>Potato virus U (PVU) (Comoviridae, Nepovirus)</i> <i>Potato virus V (PVV) (Potyviridae, Potyvirus)</i> <i>Potato yellow dwarf virus (PYDV) (Rhabdoviridae, Nucleorhabdovirus)</i> <i>Potato yellow vein virus (PYVV) (Closteroviridae, Crinivirus)</i> <i>Potato yellowing virus</i> <i>Prune dwarf virus (PDV) (Bromoviridae, Ilarvirus)</i> <i>Prunus necrotic ringspot virus (PNRSV) (Bromoviridae, Ilarvirus)</i> <i>Raspberry leaf curl virus</i> <i>Raspberry ringspot virus (RpRSV) (Comoviridae, Nepovirus)</i> <i>Red clover mottle virus (RCMV) (Comoviridae, Comovirus)</i> <i>Rice gall dwarf virus (RGDV) (Reoviridae, Phytoreovirus)</i> <i>Rice tungro bacilliform virus (RTBV) (Caulimoviridae, Rice tungro bacilliform-like virus)</i> <i>Rice tungro spherical virus (RTSV) (Sequiviridae, Waikavirus)</i> <i>Rice yellow mottle virus (RYMV) (Sobemovirus)</i> <i>Rupestris stem pitting-associated virus (Foveavirus, Flexiviridae)</i> <i>Squash leaf curl virus (SLCV) (Geminiviridae, Begomovirus)</i> <i>Squash mosaic virus (SqMV) (Comoviridae, Comovirus)</i> <i>Strawberry latent ringspot virus (SLRSV) (Sadwavirus)</i> <i>Strawberry veinbanding virus (SVBV) (Caulimoviridae, Caulimovirus)</i> <i>Sugarcane yellow leaf virus (ScYLV) (Polerovirus, Luteoviridae)</i> <i>Tobacco rattle virus (TRV) (Tobravirus)</i> <i>Tobacco ringspot virus (TRSV) (Comoviridae, Nepovirus)</i> <i>Tobacco mosaic virus (TMV) (Tobamovirus)</i> <i>Tobacco necrosis virus</i> <i>Tobacco streak virus (TSV) (Ilarvirus, Bromoviridae)</i>	
--	--	--

<i>Tomato black ring virus</i> (TBRV) (<i>Comoviridae</i> , <i>Nepovirus</i>) <i>Tomato bushy stunt virus</i> (TBSV) (<i>Tombusvirus</i> , <i>Tombusviridae</i>) <i>Tomato mottle virus</i> (ToMoV) (<i>Geminiviridae</i> , <i>Begomovirus</i>) <i>Tomato ringspot virus</i> (ToRSV) (<i>Comoviridae</i> , <i>Nepovirus</i>) <i>Tulare apple mosaic virus</i> (TAMV) (<i>Ilarvirus</i> , <i>Bromoviridae</i>) <i>Tulip breaking virus</i> <i>Ullucus virus C</i> (UVC) (<i>Comoviridae</i> , <i>comovirus</i>) <i>Ullucus mild mottle virus</i> (UMMV) (<i>Tobamovirus</i>) <i>Ullucus mosaic virus</i> (UMV) (<i>Potyviridae</i> , <i>potyvirus</i>) <i>Urd bean leaf crinkle virus</i> <i>Vallota mosaic virus</i> (ValMV) (<i>Potyviridae</i> , <i>potyvirus</i>) <i>Vanilla mosaic virus</i> (VanMV) (<i>Potyviridae</i> , <i>potyvirus</i>) <i>Vanilla necrosis virus</i> (<i>Potyviridae</i> , <i>potyvirus</i>) <i>Velvet tobacco mottle virus</i> (VTMoV) (<i>Sobemovirus</i>) <i>Viola mottle virus</i> (VMV) (<i>Potexvirus</i>) <i>Voandzeia distortion mosaic virus</i> (<i>Potyviridae</i> , <i>potyvirus</i>) <i>Voandzeia necrotic mosaic virus</i> (VNMV) (<i>Tymovirus</i>) <i>Watercress yellow spot virus</i> (WYSV) <i>Watermelon chlorotic stunt virus</i> (WmCSV) (<i>Geminiviridae</i> , <i>bigeminivirus</i>) <i>Watermelon curly mottle virus</i> (WmCMV) (<i>Geminiviridae</i> , <i>bigeminivirus</i>) <i>Watermelon mosaic virus 2</i> (WMV-2) (<i>Potyviridae</i> , <i>potyvirus</i>) <i>Wheat American striate mosaic virus</i> (WASMV) (<i>Rhabdovirus</i> , <i>ucleorhabdovirus</i>) <i>Wheat yellow leaf virus</i> (WYLV) (<i>Closteroviridae</i> , <i>Closterovirus</i>) <i>Wheat dwarf virus</i> (WDV) (<i>Geminiviridae</i> , <i>monogeminivirus</i>) <i>Wheat soil-borne mosaic virus</i> (SBWMV) (<i>Furovirus</i>) <i>Wheat streak mosaic virus</i> (WSMV) (<i>Potyviridae</i> , <i>rymovirus</i>) <i>Wheat spindle streak mosaic virus</i> (WSSMV) (<i>Potyvirida</i> , <i>bymovirus</i>) <i>Wheat yellow mosaic virus</i> (WYMV) (<i>Potyviridae</i> , <i>bymovirus</i>) <i>White clover mosaic virus</i> (WCIMV) (<i>Potexvirus</i>) <i>Wild cucumber mosaic virus</i> (WCMV) (<i>Tymovirus</i>) <i>Wild potato mosaic</i> (WPMV) (<i>Potyviridae</i> , <i>Potyvirus</i>) <i>Wineberry latent virus</i> (WLV) <i>Wisteria vein mosaic virus</i> (WVMV) (<i>Potyviridae</i> , <i>Potyvirus</i>) <i>Yam mosaic virus</i> (YMV) (<i>Potyviridae</i> , <i>Potyvirus</i>) <i>Zucchini yellow fleck virus</i> (ZYFV) (<i>Potyviridae</i> , <i>Potyvirus</i>) 備註：以上病毒之媒介有害生物亦一併列入管制 植物菌質體類（93 種） <i>Alder yellows</i> AIY <i>Almond witches' broom phytoplasma</i> <i>American aster yellows</i> AAY <i>Annual blue grass white leaf</i> ABGWL <i>Apple proliferation</i> AT, AP-A <i>Apple proliferation phytoplasma</i> AP <i>Ash yellows</i> AshY <i>Aster yellows</i> AY <i>Australian grapevine yellows</i> AUSGY <i>Bermudagrass white leaf</i> BGWL	<i>Tomato black ring virus</i> (TBRV) (<i>Comoviridae</i> , <i>Nepovirus</i>) <i>Tomato bushy stunt virus</i> (TBSV) (<i>Tombusvirus</i> , <i>Tombusviridae</i>) <i>Tomato mottle virus</i> (ToMoV) (<i>Geminiviridae</i> , <i>Begomovirus</i>) <i>Tomato ringspot virus</i> (ToRSV) (<i>Comoviridae</i> , <i>Nepovirus</i>) <i>Tulare apple mosaic virus</i> (TAMV) (<i>Ilarvirus</i> , <i>Bromoviridae</i>) <i>Tulip breaking virus</i> <i>Ullucus virus C</i> (UVC) (<i>Comoviridae</i> , <i>comovirus</i>) <i>Ullucus mild mottle virus</i> (UMMV) (<i>Tobamovirus</i>) <i>Ullucus mosaic virus</i> (UMV) (<i>Potyviridae</i> , <i>potyvirus</i>) <i>Urd bean leaf crinkle virus</i> <i>Vallota mosaic virus</i> (ValMV) (<i>Potyviridae</i> , <i>potyvirus</i>) <i>Vanilla mosaic virus</i> (VanMV) (<i>Potyviridae</i> , <i>potyvirus</i>) <i>Vanilla necrosis virus</i> (<i>Potyviridae</i> , <i>potyvirus</i>) <i>Velvet tobacco mottle virus</i> (VTMoV) (<i>Sobemovirus</i>) <i>Viola mottle virus</i> (VMV) (<i>Potexvirus</i>) <i>Voandzeia distortion mosaic virus</i> (<i>Potyviridae</i> , <i>potyvirus</i>) <i>Voandzeia necrotic mosaic virus</i> (VNMV) (<i>Tymovirus</i>) <i>Watercress yellow spot virus</i> (WYSV) <i>Watermelon chlorotic stunt virus</i> (WmCSV) (<i>Geminiviridae</i> , <i>bigeminivirus</i>) <i>Watermelon curly mottle virus</i> (WmCMV) (<i>Geminiviridae</i> , <i>bigeminivirus</i>) <i>Watermelon mosaic virus 2</i> (WMV-2) (<i>Potyviridae</i> , <i>potyvirus</i>) <i>Wheat American striate mosaic virus</i> (WASMV) (<i>Rhabdovirus</i> , <i>ucleorhabdovirus</i>) <i>Wheat yellow leaf virus</i> (WYLV) (<i>Closteroviridae</i> , <i>Closterovirus</i>) <i>Wheat dwarf virus</i> (WDV) (<i>Geminiviridae</i> , <i>monogeminivirus</i>) <i>Wheat soil-borne mosaic virus</i> (SBWMV) (<i>Furovirus</i>) <i>Wheat streak mosaic virus</i> (WSMV) (<i>Potyviridae</i> , <i>rymovirus</i>) <i>Wheat spindle streak mosaic virus</i> (WSSMV) (<i>Potyvirida</i> , <i>bymovirus</i>) <i>Wheat yellow mosaic virus</i> (WYMV) (<i>Potyviridae</i> , <i>bymovirus</i>) <i>White clover mosaic virus</i> (WCIMV) (<i>Potexvirus</i>) <i>Wild cucumber mosaic virus</i> (WCMV) (<i>Tymovirus</i>) <i>Wild potato mosaic</i> (WPMV) (<i>Potyviridae</i> , <i>Potyvirus</i>) <i>Wineberry latent virus</i> (WLV) <i>Wisteria vein mosaic virus</i> (WVMV) (<i>Potyviridae</i> , <i>Potyvirus</i>) <i>Yam mosaic virus</i> (YMV) (<i>Potyviridae</i> , <i>Potyvirus</i>) <i>Zucchini yellow fleck virus</i> (ZYFV) (<i>Potyviridae</i> , <i>Potyvirus</i>) 備註：以上病毒之媒介有害生物亦一併列入管制 植物菌質體類（93 種） <i>Alder yellows</i> AIY <i>Almond witches' broom phytoplasma</i> <i>American aster yellows</i> AAY <i>Annual blue grass white leaf</i> ABGWL <i>Apple proliferation</i> AT, AP-A <i>Apple proliferation phytoplasma</i> AP <i>Ash yellows</i> AshY <i>Aster yellows</i> AY <i>Australian grapevine yellows</i> AUSGY <i>Bermudagrass white leaf</i> BGWL	
---	---	--

<i>Black alder witches'-broom BAWB</i> <i>Blueberry stunt BBS1 BBS3</i> <i>Bois noir BN</i> <i>Canadian peach X phytoplasma CX</i> <i>Candidatus Liberibacter americanus Lam</i> <i>Candidatus Phytoplasma asteris</i> <i>Candidatus Phytoplasma australiense</i> <i>Candidatus Phytoplasma caricae</i> <i>Celery yellows CelY</i> <i>Cherry lethal yellows CLY</i> <i>Chrysanthemum yellows CY</i> <i>Clover phyllody CPh</i> <i>Clover proliferation CP</i> <i>Clover yellow edge CYE</i> <i>Coconut lethal yellows LY, LY3</i> <i>Dwarf aster yellows DAY</i> <i>Eastern aster yellows NAY</i> <i>Eggplant dwarf ED</i> <i>Elm witches'-broom ULW</i> <i>Elm yellows</i> <i>Eucalyptus little leaf</i> <i>European aster yellows EAY</i> <i>European stone fruit yellows phytoplasma</i> <i>European stone fruit yellows PPER</i> <i>Faba bean phyllody FBP</i> <i>Flavescence dorée</i> <i>Garland chrysanthemum WB GCW</i> <i>Gentian witches'-broom GW</i> <i>Gladiolus yellows GLY</i> <i>Goldenrod yellows GRY (GR1)</i> <i>Grapevine yellows</i> <i>Grey dogwood witches'-broom GD1</i> <i>Hydrangea phyllody HyPH1</i> <i>Hydrangea virescence</i> <i>Ipomoea witches'-broom IOB</i> <i>Jujube witches'-broom JWB</i> <i>Leafhopper-borne BVK</i> <i>Lilac witches'-broom LiWB</i> <i>Loofah witches'-broom LfWB</i> <i>Maize bushy stunt MBS</i> <i>Marguerite yellows MY</i> <i>Maryland aster yellows AY1</i> <i>Mexican periwinkle virescence MPV</i> <i>Michigan aster yellows MIAY</i> <i>Milkweed yellows MWY (MW1)</i> <i>Mitsuba witches'-broom JHW</i> <i>Mulberry dwarf MD</i>	<i>Black alder witches'-broom BAWB</i> <i>Blueberry stunt BBS1 BBS3</i> <i>Bois noir BN</i> <i>Canadian peach X phytoplasma CX</i> <i>Candidatus Liberibacter americanus Lam</i> <i>Candidatus Phytoplasma asteris</i> <i>Candidatus Phytoplasma australiense</i> <i>Candidatus Phytoplasma caricae</i> <i>Celery yellows CelY</i> <i>Cherry lethal yellows CLY</i> <i>Chrysanthemum yellows CY</i> <i>Clover phyllody CPh</i> <i>Clover proliferation CP</i> <i>Clover yellow edge CYE</i> <i>Coconut lethal yellows LY, LY3</i> <i>Dwarf aster yellows DAY</i> <i>Eastern aster yellows NAY</i> <i>Eggplant dwarf ED</i> <i>Elm witches'-broom ULW</i> <i>Elm yellows</i> <i>Eucalyptus little leaf</i> <i>European aster yellows EAY</i> <i>European stone fruit yellows phytoplasma</i> <i>European stone fruit yellows PPER</i> <i>Faba bean phyllody FBP</i> <i>Flavescence dorée</i> <i>Garland chrysanthemum WB GCW</i> <i>Gentian witches'-broom GW</i> <i>Gladiolus yellows GLY</i> <i>Goldenrod yellows GRY (GR1)</i> <i>Grapevine yellows</i> <i>Grey dogwood witches'-broom GD1</i> <i>Hydrangea phyllody HyPH1</i> <i>Hydrangea virescence</i> <i>Ipomoea witches'-broom IOB</i> <i>Jujube witches'-broom JWB</i> <i>Leafhopper-borne BVK</i> <i>Lilac witches'-broom LiWB</i> <i>Loofah witches'-broom LfWB</i> <i>Maize bushy stunt MBS</i> <i>Marguerite yellows MY</i> <i>Maryland aster yellows AY1</i> <i>Mexican periwinkle virescence MPV</i> <i>Michigan aster yellows MIAY</i> <i>Milkweed yellows MWY (MW1)</i> <i>Mitsuba witches'-broom JHW</i> <i>Mulberry dwarf MD</i>	
---	---	--

<i>New Jersey aster yellows NJAY</i> <i>Oklahoma aster yellows OKAY1</i> <i>Onion yellows OAY (OA)</i> <i>Passion fruit proliferation phytoplasma</i> <i>Peach rosette phytoplasma</i> <i>Peach yellow leaf roll PYLR</i> <i>Peach yellows phytoplasma</i> <i>Pear decline PD</i> <i>Pecan bunch PB</i> <i>Periwinkle little leaf CN1</i> <i>Periwinkle virescence VR, BLTVA</i> <i>Phormium yellow leaf PYL</i> <i>Plum leptonecrosis PLN</i> <i>Potato yellows</i> <i>Primula yellows PY</i> <i>Ranunculus phyllody RPh</i> <i>Rice yellow dwarf RYD</i> <i>Rubus stunt RS</i> <i>Spiraea stunt SP1</i> <i>Stolbur STOL</i> <i>Strawberry green petal</i> <i>Sugarcane grassy shoot SCGS</i> <i>Sugarcane white leaf phytoplasma</i> <i>Sunhemp witches'-broom SUNHP</i> <i>Sweet potato little leaf SPLL</i> <i>Sweet potato witches'-broom SPWB</i> <i>Tanzanian coconut lethal decline LDT</i> <i>Tomato big bud</i> <i>Tomato yellows TY</i> <i>Tsuwabuki witches'-broom TW</i> <i>Vaccinium witches'-broom VAC</i> <i>Walnut witches'-broom WWB</i> <i>Western aster yellows SAY, TLAY</i> <i>Witches'-broom of lime WBDL</i> <i>X-disease</i> <i>Yucatan coconut lethal decline LDY</i> 線蟲類（54 種） <i>Anguina tritici</i> <i>Aphelenchoides aradhidis</i> <i>Aphelenchoides bicaudatus</i> <i>Aphelenchoides fragariae</i> <i>Aphelenchoides goodeyi</i> <i>Aphelenchoides ritzemabosi</i> <i>Aphelenchoides suipingensis</i> <i>Belonolaimus gracilis</i> <i>Belonolaimus longicaudatus</i> <i>Bursaphelenchus muconatus</i>	<i>New Jersey aster yellows NJAY</i> <i>Oklahoma aster yellows OKAY1</i> <i>Onion yellows OAY (OA)</i> <i>Passion fruit proliferation phytoplasma</i> <i>Peach rosette phytoplasma</i> <i>Peach yellow leaf roll PYLR</i> <i>Peach yellows phytoplasma</i> <i>Pear decline PD</i> <i>Pecan bunch PB</i> <i>Periwinkle little leaf CN1</i> <i>Periwinkle virescence VR, BLTVA</i> <i>Phormium yellow leaf PYL</i> <i>Plum leptonecrosis PLN</i> <i>Potato yellows</i> <i>Primula yellows PY</i> <i>Ranunculus phyllody RPh</i> <i>Rice yellow dwarf RYD</i> <i>Rubus stunt RS</i> <i>Spiraea stunt SP1</i> <i>Stolbur STOL</i> <i>Strawberry green petal</i> <i>Sugarcane grassy shoot SCGS</i> <i>Sugarcane white leaf phytoplasma</i> <i>Sunhemp witches'-broom SUNHP</i> <i>Sweet potato little leaf SPLL</i> <i>Sweet potato witches'-broom SPWB</i> <i>Tanzanian coconut lethal decline LDT</i> <i>Tomato big bud</i> <i>Tomato yellows TY</i> <i>Tsuwabuki witches'-broom TW</i> <i>Vaccinium witches'-broom VAC</i> <i>Walnut witches'-broom WWB</i> <i>Western aster yellows SAY, TLAY</i> <i>Witches'-broom of lime WBDL</i> <i>X-disease</i> <i>Yucatan coconut lethal decline LDY</i> 線蟲類（54 種） <i>Anguina tritici</i> <i>Aphelenchoides aradhidis</i> <i>Aphelenchoides bicaudatus</i> <i>Aphelenchoides fragariae</i> <i>Aphelenchoides goodeyi</i> <i>Aphelenchoides ritzemabosi</i> <i>Aphelenchoides suipingensis</i> <i>Belonolaimus gracilis</i> <i>Belonolaimus longicaudatus</i> <i>Bursaphelenchus muconatus</i>	
---	---	--

<i>Bursaphelenchus xylophilus</i> <i>Ditylenchus triformis</i> <i>Dolichodorus heterocephalus</i> <i>Globodera pallida</i> <i>Globodera tabacum</i> <i>Hemicycliophora arenaria</i> <i>Hemicycliophora nudata</i> <i>Heterodera glycines</i> <i>Heterodera goettingiana</i> <i>Heterodera sacchari</i> <i>Heterodera schachtii</i> <i>Heterodera zeae</i> <i>Hirschmanniella gracilis</i> <i>Hirschmanniella imamuri</i> <i>Hirschmanniella magna</i> <i>Hirschmanniella miticausa</i> <i>Hirschmanniella spinicaudata</i> <i>Hoplolaimus</i> spp. <i>Longidorus elongatus</i> <i>Longidorus jiangsuensis</i> <i>Meloidogyne fujianensis</i> <i>Meloidogyne kongi</i> <i>Meloidogyne lini</i> <i>Nacobbus aberrans</i> <i>Paralongidorus</i> spp. <i>Paratrichodorus minor</i> <i>Paratrichodorus porosus</i> <i>Pratylenchus convallariae</i> <i>Pratylenchus goodeyi</i> <i>Pratylenchus indicus</i> <i>Pratylenchus laticauda</i> <i>Pratylenchus penetrans</i> <i>Pratylenchus pratensis</i> <i>Pratylenchus vulnus</i> <i>Pratylenchus zeae</i> <i>Radopholus citri</i> <i>Rhadinaphelenchus cocophilus</i> <i>Scutellonema bradys</i> <i>Trichodorus</i> spp. <i>Xiphinema bricolense</i> <i>Xiphinema californicum</i> <i>Xiphinema diversicaudatum</i> <i>Xiphinema hunaniense</i> <i>Xiphinema index</i> 雜草類(264 種) <i>Abelmoschus ficulneus</i> (L.) Wight & Arn. <i>Acacia podalyriifolia</i>	<i>Bursaphelenchus xylophilus</i> <i>Ditylenchus triformis</i> <i>Dolichodorus heterocephalus</i> <i>Globodera pallida</i> <i>Globodera tabacum</i> <i>Hemicycliophora arenaria</i> <i>Hemicycliophora nudata</i> <i>Heterodera glycines</i> <i>Heterodera goettingiana</i> <i>Heterodera sacchari</i> <i>Heterodera schachtii</i> <i>Heterodera zeae</i> <i>Hirschmanniella gracilis</i> <i>Hirschmanniella imamuri</i> <i>Hirschmanniella magna</i> <i>Hirschmanniella miticausa</i> <i>Hirschmanniella spinicaudata</i> <i>Hoplolaimus</i> spp. <i>Longidorus elongatus</i> <i>Longidorus jiangsuensis</i> <i>Meloidogyne fujianensis</i> <i>Meloidogyne kongi</i> <i>Meloidogyne lini</i> <i>Nacobbus aberrans</i> <i>Paralongidorus</i> spp. <i>Paratrichodorus minor</i> <i>Paratrichodorus porosus</i> <i>Pratylenchus convallariae</i> <i>Pratylenchus goodeyi</i> <i>Pratylenchus indicus</i> <i>Pratylenchus laticauda</i> <i>Pratylenchus penetrans</i> <i>Pratylenchus pratensis</i> <i>Pratylenchus vulnus</i> <i>Pratylenchus zeae</i> <i>Radopholus citri</i> <i>Rhadinaphelenchus cocophilus</i> <i>Scutellonema bradys</i> <i>Trichodorus</i> spp. <i>Xiphinema bricolense</i> <i>Xiphinema californicum</i> <i>Xiphinema diversicaudatum</i> <i>Xiphinema hunaniense</i> <i>Xiphinema index</i> 雜草類(288 種) <i>Abelmoschus ficulneus</i> (L.) Wight & Arn. <i>Acacia podalyriifolia</i>	
---	---	--

<i>Acanthospermum hispidum</i> DC. <i>Achnatherum calamagrostis</i> P.Beauv. <i>Ageratum mexicanum</i>= <i>A. houstonianum</i> <i>Agropyron repens</i> (L.)Beauv. (syn. <i>Triticum repens</i> L.) <i>Albizia julibrissin</i> Durazz. <i>Alopecurus aequalis</i> Sobol. <i>Amaranthus blitum</i> L. <i>Amaranthus dubius</i> Mart. <i>Amaranthus gracilis</i> Desf. <i>Amaranthus graecizans</i> L. <i>Amaranthus hybridus</i> L. <i>Amaranthus retroflexus</i> L. <i>Ambrosia psilostachya</i> DC. <i>Ambrosia trifida</i> L. <i>Ammi majus</i> L. <i>Ammi visnaga</i> <i>Andropogon virginicus</i> L. <i>Anthemis cotula</i> L. <i>Anthocephalus chinensis</i> Walp. <i>Asphodelus tenuifolius</i> Cav. <i>Atriplex hortensis</i> <i>Avena sterilis</i> L. <i>Bidens ferulifolia</i>= <i>B. aurea</i> <i>Bidens triplinervia</i> <i>Boerhavia erecta</i> L. <i>Bowiea volubilis</i> Harv. ex Hook.f. <i>Brachiaria eruciformis</i> (J. E. Sm.) Griseb. <i>Brachiaria plantaginea</i> (Link) Hitchc. <i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) Beauv. <i>Brassica kaber</i> (DC.) L.C.Wheeler var. <i>pinnatifida</i> (Stokes), L.C.Wheeler (syn. <i>Sinapis arvensis</i> L., <i>Brassica arvensis</i>, <i>Brassica kaber</i>) <i>Brassica nigra</i> (L.) Koch <i>Bromus secalinus</i> L. <i>Bromus tectorum</i> L. <i>Cabomba caroliniana</i> Gray <i>Calamagrostis epigejos</i> (L.) Roth <i>Camelina sativa</i> <i>Campanula cochleariifolia</i> <i>Cannabis sativa</i> <i>Cardaria draba</i> (L.)Desv. (<i>Lepidium draba</i> L.)	<i>Acanthospermum hispidum</i> DC. <i>Achnatherum calamagrostis</i> P.Beauv. <i>Ageratum mexicanum</i>= <i>A. houstonianum</i> <i>Agropyron repens</i> (L.)Beauv. (syn. <i>Triticum repens</i> L.) <i>Albizia julibrissin</i> Durazz. <i>Alopecurus aequalis</i> Sobol. <u><i>Alternanthera philoxeroides</i> (Mart) Griseb.</u> <i>Amaranthus blitum</i> L. <i>Amaranthus dubius</i> Mart. <i>Amaranthus gracilis</i> Desf. <i>Amaranthus graecizans</i> L. <i>Amaranthus hybridus</i> L. <u><i>Amaranthus patulus</i> Bertoloni</u> <i>Amaranthus retroflexus</i> L. <u><i>Ambrosia artemisiifolia</i> L.</u> <i>Ambrosia psilostachya</i> DC. <i>Ambrosia trifida</i> L. <i>Ammi majus</i> L. <i>Ammi visnaga</i> <i>Andropogon virginicus</i> L. <i>Anthemis cotula</i> L. <i>Anthocephalus chinensis</i> Walp. <u><i>Ardisia elliptica</i> Thunb.</u> <i>Asphodelus tenuifolius</i> Cav. <u><i>Aster subulatus</i> Michx.</u> <i>Atriplex hortensis</i> <i>Avena sterilis</i> L. <i>Bidens ferulifolia</i>= <i>B. aurea</i> <u><i>Bidens pilosa</i> L.</u> <i>Bidens triplinervia</i> <i>Boerhavia erecta</i> L. <i>Bowiea volubilis</i> Harv. ex Hook.f. <i>Brachiaria eruciformis</i> (J. E. Sm.) Griseb. <u><i>Brachiaria mutica</i> (Forssk.) Stapf</u> <i>Brachiaria plantaginea</i> (Link) Hitchc. <i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) Beauv. <i>Brassica kaber</i> (DC.) L.C.Wheeler var. <i>pinnatifida</i> (Stokes), L.C.Wheeler (syn. <i>Sinapis arvensis</i> L., <i>Brassica arvensis</i>, <i>Brassica kaber</i>) <i>Brassica nigra</i> (L.) Koch <i>Bromus secalinus</i> L. <i>Bromus tectorum</i> L. <i>Cabomba caroliniana</i> Gray <i>Calamagrostis epigejos</i> (L.) Roth <i>Camelina sativa</i> <i>Campanula cochleariifolia</i> <i>Cannabis sativa</i> <i>Cardaria draba</i> (L.)Desv. (<i>Lepidium draba</i> L.)	
---	--	--

<i>Cardiospermum grandiflorum</i> Sw. <i>Carduus nutans</i> L. <i>Carduus pycnocephalus</i> L. <i>Ceanothus americanus</i> L. <i>Cecropia obtusifolia</i> Bertol. <i>Cecropia peltata</i> L. <i>Centaurea repens</i> L. <i>Centaurea solstitialis</i> L. <i>Cephalaria syriaca</i> (L.) Schrad. <i>Cerastium arvense</i> L. <i>Chasmanthium latifolium</i> (Michx.) Yates <i>Chasmanthium laxum</i> (L.) Yates <i>Chenopodium album</i> <i>Chenopodium murale</i> L. <i>Chenopodium opulifolium</i> Schrad. <i>Chondrilla juncea</i> L. <i>Chrysophyllum oliviforme</i> L. <i>Chrysopogon gryllus</i> Trin. <i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop. <i>Cirsium lanceolatum</i> Hill <i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Tenore <i>Cleome monophylla</i> L. <i>Clerodendrum quadriloculare</i> <i>Clidemia hirta</i> (L.) D. Don <i>Cnidium monnieri</i> <i>Conium maculatum</i> L. <i>Convolvulus arvensis</i> L. <i>Cordia alliodora</i> (Ruiz & Pav.) Oken <i>Cordia macrostachya</i> Roem & Schlucht. <i>Cortaderia selloana</i> (J.A. & J.H. Schultes) Aschers. & Graebn. <i>Crotalaria brevidens</i> <i>Crotalaria deserticola</i> <i>Crotalaria laburnifolia</i> <i>Crotalaria laburnoides</i> <i>Crotalaria lanceolata</i> <i>Crotalaria pallida</i> <i>Crotalaria pisicarpa</i> <i>Cryptostegia grandiflora</i> R. Br. <i>Cuscuta campestris</i> Yuncker <i>Cuscuta monogyna</i> Vahl. <i>Cynodon plectostachyum</i> (Schum.) Pilger. <i>Cynoglossum amabile</i> Stapf & Drummond <i>Cyperus esculentus</i> L. <i>Datura stramonium</i> L. var. <i>chalybaea</i> Koch <i>Descurainia sophia</i>	<i>Cardiospermum grandiflorum</i> Sw. <i>Carduus nutans</i> L. <i>Carduus pycnocephalus</i> L. <i>Ceanothus americanus</i> L. <i>Cecropia obtusifolia</i> Bertol. <i>Cecropia peltata</i> L. <i>Centaurea repens</i> L. <i>Centaurea solstitialis</i> L. <u><i>Centrosema pubescens</i></u> <i>Cephalaria syriaca</i> (L.) Schrad. <i>Cerastium arvense</i> L. <i>Chasmanthium latifolium</i> (Michx.) Yates <i>Chasmanthium laxum</i> (L.) Yates <i>Chenopodium album</i> <i>Chenopodium murale</i> L. <i>Chenopodium opulifolium</i> Schrad. <i>Chondrilla juncea</i> L. <u><i>Chromolaena odorata</i> (L.) R. M. King & H. Rob.</u> <i>Chrysophyllum oliviforme</i> L. <i>Chrysopogon gryllus</i> Trin. <i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop. <i>Cirsium lanceolatum</i> Hill <i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Tenore <i>Cleome monophylla</i> L. <i>Clerodendrum quadriloculare</i> <i>Clidemia hirta</i> (L.) D. Don <i>Cnidium monnieri</i> <i>Conium maculatum</i> L. <i>Convolvulus arvensis</i> L. <i>Cordia alliodora</i> (Ruiz & Pav.) Oken <i>Cordia macrostachya</i> Roem & Schlucht. <i>Cortaderia selloana</i> (J.A. & J.H. Schultes) Aschers. & Graebn. <i>Crotalaria brevidens</i> <i>Crotalaria deserticola</i> <i>Crotalaria laburnifolia</i> <i>Crotalaria laburnoides</i> <i>Crotalaria lanceolata</i> <i>Crotalaria pallida</i> <i>Crotalaria pisicarpa</i> <i>Cryptostegia grandiflora</i> R. Br. <i>Cuscuta campestris</i> Yuncker <i>Cuscuta monogyna</i> Vahl. <i>Cynodon plectostachyum</i> (Schum.) Pilger. <i>Cynoglossum amabile</i> Stapf & Drummond <i>Cyperus esculentus</i> L. <i>Datura stramonium</i> L. var. <i>chalybaea</i> Koch <i>Descurainia sophia</i>	
--	---	--

<i>Dichrostachys cinerea</i> (L.)Wight & Arn. <i>Digitaria scalarum</i> (Schweinf.) Chiov <i>Digitaria velutina</i> (Forsk.) Beauv. <i>Diplotaxis tenuifolia</i> (莖葉除外) <i>Dipsacus sativus</i> (L.) Honckeney <i>Echinochloa crus-pavonis</i> (H.B.K.) Schult <i>Echinochloa esculenta</i> <i>Echinochloa pyramidalis</i> (Lam.) Hitchc. & A. Chase <i>Echium plantagineum</i> L. <i>Eleocharis palustris</i> (L.)R. Br. (syn. <i>E. filiculmis</i> Schur.) <i>Elodea canadensis</i> Michx. <i>Emex spinosa</i> (L.) Campdera <i>Equisetum arvense</i> L. <i>Equisetum palustre</i> L. <i>Erigeron karvinskianus</i>= <i>E. mucronatus</i> <i>Eriocaulon cinereum</i> <i>Eriocephalus racemosus</i> <i>Erodium cicutarium</i> (L.) L. ex W. Ait. <i>Eucalyptus globulus</i> Labill. <i>Euonymus europaeus</i> L. <i>Euphorbia helioscopia</i> L. <i>Euphorbia myrsinites</i> <i>Euphorbia prunifolia</i> Jacq. (syn. <i>E. geniculata</i> Orteg). <i>Furcraea foetida</i> <i>Gaillardia pulchella</i> <i>Galeopsis tetrahit</i> L. <i>Galium aparine</i> L. <i>Geranium molle</i> L. <i>Gladiolus segetum</i> Ker-Gawl. <i>Gynandropsis gynandra</i> (L.) Briq. <i>Hardenbergia comptoniana</i> (Andrews) Benth. <i>Heliotropium europaeum</i> L. <i>Heteropanax fragrans</i> (Roxb.) Seem. <i>Homeria collina</i> <i>Homeria flaccid</i> <i>Homeria miniata</i> <i>Homeria ochroleuca</i> <i>Hordeum murinum</i> L. <i>Hyacinthoides</i> spp. <i>Hydrilla verticillata</i> <i>Hypochoeris radicata</i> L. <i>Indigofera amblyantha</i> Craib <i>Ipomoea oenothera</i>	<i>Dichrostachys cinerea</i> (L.)Wight & Arn. <u><i>Digitaria sanguinalis</i> = <i>Panicum sanguinale</i>, <i>Paspalum sanguinale</i>, <i>Syntherisma sanguinalis</i></u> <i>Digitaria scalarum</i> (Schweinf.) Chiov <i>Digitaria velutina</i> (Forsk.) Beauv. <i>Diplotaxis tenuifolia</i> (莖葉除外) <i>Dipsacus sativus</i> (L.) Honckeney <u><i>Echinochloa crus-galli</i></u> <i>Echinochloa crus-pavonis</i> (H.B.K.) Schult <i>Echinochloa esculenta</i> <i>Echinochloa pyramidalis</i> (Lam.) Hitchc. & A. Chase <i>Echium plantagineum</i> L. <u><i>Eichhornia crassipes</i> (Mart.) Solms</u> <i>Eleocharis palustris</i> (L.)R. Br. (syn. <i>E. filiculmis</i> Schur.) <i>Elodea canadensis</i> Michx. <i>Emex spinosa</i> (L.) Campdera <i>Equisetum arvense</i> L. <i>Equisetum palustre</i> L. <i>Erigeron karvinskianus</i>= <i>E. mucronatus</i> <i>Eriocaulon cinereum</i> <i>Eriocephalus racemosus</i> <i>Erodium cicutarium</i> (L.) L. ex W. Ait. <i>Eucalyptus globulus</i> Labill. <i>Euonymus europaeus</i> L. <i>Euphorbia helioscopia</i> L. <i>Euphorbia myrsinites</i> <i>Euphorbia prunifolia</i> Jacq. (syn. <i>E. geniculata</i> Orteg). <i>Furcraea foetida</i> <i>Gaillardia pulchella</i> <i>Galeopsis tetrahit</i> L. <i>Galium aparine</i> L. <i>Geranium molle</i> L. <i>Gladiolus segetum</i> Ker-Gawl. <i>Gynandropsis gynandra</i> (L.) Briq. <i>Hardenbergia comptoniana</i> (Andrews) Benth. <i>Heliotropium europaeum</i> L. <i>Heteropanax fragrans</i> (Roxb.) Seem. <i>Homeria collina</i> <i>Homeria flaccid</i> <i>Homeria miniata</i> <i>Homeria ochroleuca</i> <i>Hordeum murinum</i> L. <i>Hyacinthoides</i> spp. <i>Hydrilla verticillata</i> <i>Hypochoeris radicata</i> L. <i>Indigofera amblyantha</i> Craib <i>Ipomoea oenothera</i>	
--	---	--

<i>Jatropha gossypiiifolia</i> L. var. <i>elegans</i> (Pohl) Muell.-Arg. <i>Juncus bufonius</i> L. <i>Jussiaea repens</i> L. <i>Jussiaea suffruticosa</i> L. <i>Kallstroemia maxima</i> Gray. <i>Laburnum anagyroides</i> Medik. <i>Lactuca serriola</i> L. <i>Lagarosiphon</i> spp. <i>Lagurus ovatus</i> L. <i>Lathyrus aphaca</i> L. <i>Lemna minor</i> L. <i>Leonotis nepetifolia</i> (L.) Ait. f. <i>Leontodon autumnalis</i> L. <i>Lepidium draba</i> L. <i>Lepidium sativum</i> <i>Leptospermum scoparium</i> <i>Limnocharis flava</i> <i>Lithospermum arvense</i> L. <i>Lolium temulentum</i> L. <i>Luzula sylvatica</i> (Huds.) Gaudin <i>Malva parviflora</i> L. <i>Marsilea quadrifolia</i> L. <i>Medicago hispida</i> Gaertn. <i>Melastoma malabathricum</i> L. <i>Mercurialis annua</i> L. <i>Mertensia virginica</i> (L.) Pers. ex Link <i>Miconia calvescens</i> DC. <i>Mikania scandens</i> (L.) Wild. <i>Mimosa pigra</i> L. <i>Miscanthus giganteus</i> Kunth <i>Monochoria hastata</i> (L.)Solms <i>Mucuna pruriens</i> (L.) DC. var. <i>pruriens</i> Cowitch <i>Muhlenbergia capillaris</i> <i>Muhlenbergia reverchonii</i> <i>Murdannia nudiflora</i> (L.) Brenan <i>Muscari botryoides</i> <i>Myosotis scorpioides</i> <i>Myrciaria aureana</i> <i>Myrica faya</i> Ait. <i>Myriophyllum aquaticum</i> (Vell.) Verdc. <i>Myriophyllum brasiliense</i> Camb. <i>Nassella tenuissima</i> (Trin.) Barkworth <i>Neslia paniculata</i> (L.) Desv.	<i>Jatropha gossypiiifolia</i> L. var. <i>elegans</i> (Pohl) Muell.-Arg. <i>Juncus bufonius</i> L. <i>Jussiaea repens</i> L. <i>Jussiaea suffruticosa</i> L. <i>Kallstroemia maxima</i> Gray. <i>Laburnum anagyroides</i> Medik. <i>Lactuca serriola</i> L. <i>Lagarosiphon</i> spp. <i>Lagurus ovatus</i> L. <u><i>Lantana camara</i> L.</u> <i>Lathyrus aphaca</i> L. <i>Lemna minor</i> L. <i>Leonotis nepetifolia</i> (L.) Ait. f. <i>Leontodon autumnalis</i> L. <i>Lepidium draba</i> L. <i>Lepidium sativum</i> <i>Leptospermum scoparium</i> <u><i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit</u> <i>Limnocharis flava</i> <i>Lithospermum arvense</i> L. <i>Lolium temulentum</i> L. <i>Luzula sylvatica</i> (Huds.) Gaudin <i>Malva parviflora</i> L. <i>Marsilea quadrifolia</i> L. <i>Medicago hispida</i> Gaertn. <i>Melastoma malabathricum</i> L. <i>Mercurialis annua</i> L. <i>Mertensia virginica</i> (L.) Pers. ex Link <i>Miconia calvescens</i> DC. <u><i>Mikania micrantha</i> Kunth</u> <i>Mikania scandens</i> (L.) Wild. <u><i>Mimosa diplotricha</i> C. Wright ex Sauvalle</u> <i>Mimosa pigra</i> L. <i>Miscanthus giganteus</i> Kunth <i>Monochoria hastata</i> (L.)Solms <i>Mucuna pruriens</i> (L.) DC. var. <i>pruriens</i> Cowitch <i>Muhlenbergia capillaris</i> <i>Muhlenbergia reverchonii</i> <i>Murdannia nudiflora</i> (L.) Brenan <i>Muscari botryoides</i> <i>Myosotis scorpioides</i> <i>Myrciaria aureana</i> <i>Myrica faya</i> Ait. <i>Myriophyllum aquaticum</i> (Vell.) Verdc. <i>Myriophyllum brasiliense</i> Camb. <i>Nassella tenuissima</i> (Trin.) Barkworth <i>Neslia paniculata</i> (L.) Desv.	
---	--	--

<i>Orlaya grandiflora</i> Hoffm. <i>Oryza barthii</i> A. Chev. (syn. <i>O. breviligulata</i> A. Chev.et Roehr.) <i>Oryza officinalis</i> Wall. Ex Watt. <i>Oryza punctata</i> Kotschy ex Steud. <i>Panicum fasciculatum</i> Sw. <i>Passiflora mollissima</i> (H. B. K.) Bailey <i>Passiflora rubra</i> Lam. <i>Peltophorum dubium</i> (Spreng.)Taub. <i>Pennisetum ciliare</i> (L.) Link <i>Pennisetum clandestinum</i> Hochst. ex Chiov. <i>Pennisetum macrourum</i> Trin. <i>Pennisetum pedicellatum</i> Trin. <i>Pennisetum polystachion</i> (L.) Schult. <i>Pennisetum setaceum</i> (Forsk.) Chiov. <i>Pennisetum villosum</i> R. Br. ex Fresen. <i>Phalaris minor</i> Retz. <i>Phalaris paradoxa</i> L. <i>Pinus pinaster</i>= <i>P. maritima</i>= <i>P. mesogeneensid</i> <i>Pluchea carolinensis</i> (Jacq.) G. Don <i>Pluchea odorata</i> (L.) Cass. <i>Poa cita</i> E. Edgar <i>Pontederia rotundifolia</i> L. f. <i>Potamogeton natans</i> L. <i>Prunella grandiflora</i> <i>Pueraria phaseoloides</i> <i>Quercus gambelii</i> Nutt. <i>Radermachera hainanensis</i> Merrill <i>Ranunculus arvensis</i> L. <i>Ranunculus repens</i> L. <i>Raphanus raphanistrum</i> L. (<i>Raphanus arvense</i> Wallr., <i>Raphanus sylvestris</i> Aschers) <i>Rapistrum rugosum</i> (L.) All. <i>Reseda lutea</i> L. <i>Rhodanthe chlorocephala</i> (Turcz.) Paul G.Wilson <i>Ribes cereum</i>= <i>R. viscidulum</i> <i>Richardia brasiliensis</i> Gomez <i>Rides roezlii</i> <i>Rosa canina</i> <i>Rosa rubiginosa</i> = <i>Rosa eglanteria</i> <i>Rubus argutus</i> Link <i>Rubus leucodermis</i> <i>Rubus moluccanus</i> L.	<u><i>Nicandra physalodes</i> (L.) Gaertn.</u> <i>Orlaya grandiflora</i> Hoffm. <i>Oryza barthii</i> A. Chev. (syn. <i>O. breviligulata</i> A. Chev.et Roehr.) <i>Oryza officinalis</i> Wall. Ex Watt. <i>Oryza punctata</i> Kotschy ex Steud. <i>Panicum fasciculatum</i> Sw. <u><i>Panicum maximum</i> Jacq.</u> <u><i>Parthenium hysterophorus</i> L.</u> <i>Passiflora mollissima</i> (H. B. K.) Bailey <i>Passiflora rubra</i> Lam. <i>Peltophorum dubium</i> (Spreng.)Taub. <i>Pennisetum ciliare</i> (L.) Link <i>Pennisetum clandestinum</i> Hochst. ex Chiov. <i>Pennisetum macrourum</i> Trin. <i>Pennisetum pedicellatum</i> Trin. <i>Pennisetum polystachion</i> (L.) Schult. <u><i>Pennisetum purpureum</i> Schumach.</u> <i>Pennisetum setaceum</i> (Forsk.) Chiov. <i>Pennisetum villosum</i> R. Br. ex Fresen. <i>Phalaris minor</i> Retz. <i>Phalaris paradoxa</i> L. <i>Pinus pinaster</i>= <i>P. maritima</i>= <i>P. mesogeneensid</i> <i>Pluchea carolinensis</i> (Jacq.) G. Don <i>Pluchea odorata</i> (L.) Cass. <u><i>Pluchea sagittalis</i> (Lam.) Cabera</u> <i>Poa cita</i> E. Edgar <i>Pontederia rotundifolia</i> L. f. <u><i>Portulaca oleracea</i></u> <i>Potamogeton natans</i> L. <i>Prunella grandiflora</i> <i>Pueraria phaseoloides</i> <i>Quercus gambelii</i> Nutt. <i>Radermachera hainanensis</i> Merrill <i>Ranunculus arvensis</i> L. <i>Ranunculus repens</i> L. <i>Raphanus raphanistrum</i> L. (<i>Raphanus arvense</i> Wallr., <i>Raphanus sylvestris</i> Aschers) <i>Rapistrum rugosum</i> (L.) All. <i>Reseda lutea</i> L. <i>Rhodanthe chlorocephala</i> (Turcz.) Paul G.Wilson <i>Ribes cereum</i>= <i>R. viscidulum</i> <i>Richardia brasiliensis</i> Gomez <i>Rides roezlii</i> <i>Rosa canina</i> <i>Rosa rubiginosa</i> = <i>Rosa eglanteria</i> <i>Rubus argutus</i> Link <i>Rubus leucodermis</i> <i>Rubus moluccanus</i> L.	
--	--	--

<i>Rubus parviflorus</i> <i>Rumex pulcher</i> L. <i>Sagittaria sagittifolia</i> L. <i>Sagittaria subulata</i> (L.) Buch. <i>Salicornia europaea</i> <i>Salsola kali</i> L. <i>Schefflera actinophylla</i> <i>Schizachyrium condensatum</i> (Kunth) Nees <i>Scirpus grossus</i> L. f. <i>Scirpus maritimus</i> L. <i>Scirpus mucronatus</i> L. <i>Sesbania punicea</i> (Cav.) Benth. <i>Sida spinosa</i> L. <i>Silene gallica</i> L. <i>Silybum marianum</i> <i>Sinapis arvensis</i> L. <i>Sisymbrium luteum</i> = <i>Hesperis lutea</i> <i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scop. <i>Solanum incanum</i> <i>Solanum mauritianum</i> Scopoli <i>Solanum sisymbriifolium</i> = <i>S. sisymbriifolium</i> <i>Solidago canadensis</i> L. <i>Solidago speciosa</i> Nutt. <i>Sophora secundiflora</i> Lag. ex DC. <i>Sorghastrum nutans</i> (L.) Nash <i>Spergula arvensis</i> L. <i>Sporobolus heterolepis</i> (Gray) Gray <i>Stachytarpheta urticaefolia</i> (Salisb.) Sims <i>Stipa tenacissima</i> L. = <i>Nassella tenuissima</i> (Trin.) Barkworth <i>Striga asiatica</i> (L.) O. Ktze. <i>Swainsona formosa</i> (G.Don) J.Thompson <i>Tagetes minuta</i> L. <i>Taraxacum mongolicum</i> Hand.-Mazz. <i>Tecoma stans</i> <i>Thlaspi arvense</i> L. <i>Tibouchina urvilleana</i> (DC) Cogn. <i>Trichachne insulatis</i> (L.) Ness <i>Trisacum dactyloides</i> <i>Typha latifolia</i> L. <i>Ulex europaeus</i> L. <i>Urochloa panicoides</i> Beauv. <i>Urtica dioica</i> L. <i>Urtica urens</i> L. <i>Vallisneria spiralis</i> L. <i>Verbascum blattaria</i> L.	<i>Rubus parviflorus</i> <i>Rumex pulcher</i> L. <i>Sagittaria sagittifolia</i> L. <i>Sagittaria subulata</i> (L.) Buch. <i>Salicornia europaea</i> <i>Salsola kali</i> L. <u><i>Sanvitalia procumbens</i> Lam.</u> <i>Schefflera actinophylla</i> <i>Schizachyrium condensatum</i> (Kunth) Nees <i>Scirpus grossus</i> L. f. <i>Scirpus maritimus</i> L. <i>Scirpus mucronatus</i> L. <i>Sesbania punicea</i> (Cav.) Benth. <i>Sida spinosa</i> L. <i>Silene gallica</i> L. <i>Silybum marianum</i> <i>Sinapis arvensis</i> L. <i>Sisymbrium luteum</i> = <i>Hesperis lutea</i> <i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scop. <i>Solanum incanum</i> <i>Solanum mauritianum</i> Scopoli <i>Solanum sisymbriifolium</i> = <i>S. sisymbriifolium</i> <i>Solidago canadensis</i> L. <i>Solidago speciosa</i> Nutt. <i>Sophora secundiflora</i> Lag. ex DC. <i>Sorghastrum nutans</i> (L.) Nash <i>Spergula arvensis</i> L. <i>Sporobolus heterolepis</i> (Gray) Gray <i>Stachytarpheta urticaefolia</i> (Salisb.) Sims <i>Stipa tenacissima</i> L. = <i>Nassella tenuissima</i> (Trin.) Barkworth <i>Striga asiatica</i> (L.) O. Ktze. <i>Swainsona formosa</i> (G.Don) J.Thompson <i>Tagetes minuta</i> L. <i>Taraxacum mongolicum</i> Hand.-Mazz. <u><i>Taraxacum officinale</i> G.H. Weber ex Wiggers</u> <i>Tecoma stans</i> <i>Thlaspi arvense</i> L. <i>Tibouchina urvilleana</i> (DC) Cogn. <i>Trichachne insulatis</i> (L.) Ness <i>Trisacum dactyloides</i> <i>Typha latifolia</i> L. <i>Ulex europaeus</i> L. <i>Urochloa panicoides</i> Beauv. <i>Urtica dioica</i> L. <i>Urtica urens</i> L. <i>Vallisneria spiralis</i> L. <i>Verbascum blattaria</i> L.	
---	---	--

<i>Verbascum bombyciferum</i> Heuff. <i>Verbascum olympicum</i> Boiss. <i>Vicia angustifolia</i> L. <i>Vicia sativa</i> <i>Xanthium spinosum</i> L. <i>Yucca glauca</i> 寄生性植物類（13 種） <i>Aeginetia indica</i> <i>Arceuthobium</i> spp. <i>Arceuthobium americanum</i> <i>Arceuthobium pusillum</i> <i>Conopholis</i> spp. <i>Cuscuta major</i> <i>Cuscuta japonica</i> <i>Cuscuta indicora</i> <i>Cuscuta planiflora</i> <i>Cuscuta campestris</i> <i>Orobanche</i> spp. <i>Phoradendron</i> spp. <i>Striga</i> spp. 軟體動物類（12 種） <i>Achatina achatina</i> <i>Archachatina degneri</i> <i>Archachatina purpurea</i> <i>Archachatina ventricosa</i> <i>Bradybaena similaris</i> <i>Cepaea nemoralis</i> <i>Eobania vermiculata</i> <i>Helix aspersa</i> <i>Lehmannia valentiana</i> <i>Otala lactea</i> <i>Succinea costaricana</i> <i>Theba pisana</i> 未確定致病因子（45 種） <i>African soybean dwarf agent</i> <i>Apple flat limb agent</i> <i>Apple green crinkle agent</i> <i>Apple ringspot agent</i> <i>Apple rosette agent</i> <i>Apple rough bark agent</i> <i>Apple star crack agent</i> <i>Apricot ring pox agent</i> <i>Cherry necrotic rusty mottle agent (CNRMV)</i> <i>Cherry pink fruit agent</i> <i>Cherry rough fruit agent</i> <i>Cherry rusty mottle (European) agent</i>	<i>Verbascum bombyciferum</i> Heuff. <i>Verbascum olympicum</i> Boiss. <i>Vicia angustifolia</i> L. <i>Vicia sativa</i> <i>Xanthium spinosum</i> L. <i>Yucca glauca</i> 寄生性植物類（13 種） <i>Aeginetia indica</i> <i>Arceuthobium</i> spp. <i>Arceuthobium americanum</i> <i>Arceuthobium pusillum</i> <i>Conopholis</i> spp. <i>Cuscuta major</i> <i>Cuscuta japonica</i> <i>Cuscuta indicora</i> <i>Cuscuta planiflora</i> <i>Cuscuta campestris</i> <i>Orobanche</i> spp. <i>Phoradendron</i> spp. <i>Striga</i> spp. 軟體動物類（13 種） <i>Achatina achatina</i> <u><i>Achatina fulica</i></u> <i>Archachatina degneri</i> <i>Archachatina purpurea</i> <i>Archachatina ventricosa</i> <i>Bradybaena similaris</i> <i>Cepaea nemoralis</i> <i>Eobania vermiculata</i> <i>Helix aspersa</i> <i>Lehmannia valentiana</i> <i>Otala lactea</i> <i>Succinea costaricana</i> <i>Theba pisana</i> 未確定致病因子（45 種） <i>African soybean dwarf agent</i> <i>Apple flat limb agent</i> <i>Apple green crinkle agent</i> <i>Apple ringspot agent</i> <i>Apple rosette agent</i> <i>Apple rough bark agent</i> <i>Apple star crack agent</i> <i>Apricot ring pox agent</i> <i>Cherry necrotic rusty mottle agent (CNRMV)</i> <i>Cherry pink fruit agent</i> <i>Cherry rough fruit agent</i> <i>Cherry rusty mottle (European) agent</i>	
---	--	--

<i>Cherry short stem agent</i> <i>Cherry twisted leaf agent</i> <i>Cotton anthocyanosis agent</i> <i>Cotton small leaf agent</i> <i>Euonymus mosaic agents</i> <i>Grapevine Bratislava mosaic agent</i> <i>Grapevine chasselas latent agent</i> <i>Grapevine enation agent</i> <i>Grapevine little leaf agent</i> <i>Grapevine vein mosaic agent</i> <i>Grapevine vein necrosis agent</i> <i>Hibiscus leaf curl agent</i> <i>Horsechestnut variegation agent</i> <i>Horsechestnut yellow mosaic agent</i> <i>Jasmine variegation agents</i> <i>Ligustrum mosaic agents</i> <i>Maple mosaic agent</i> <i>Maple variegation agent</i> <i>Mountain ash ringspot mosaic agent</i> <i>Mountain ash variegation agent</i> <i>Mulberry mosaic agent</i> <i>Okra mosaic agents</i> <i>Okra yellow leaf curl agent</i> <i>Peach wart agent</i> <i>Pear bud drop agent</i> <i>Pear rough bark agent</i> <i>Pear stony pit agent</i> <i>Quince sooty ringspot agent</i> <i>Quince stunt agent</i> <i>Quince yellow blotch agent</i> <i>Rose wilt agent</i> <i>Sampaguita yellow ringspot mosaic agent</i> <i>Spur cherry agent</i>	<i>Cherry short stem agent</i> <i>Cherry twisted leaf agent</i> <i>Cotton anthocyanosis agent</i> <i>Cotton small leaf agent</i> <i>Euonymus mosaic agents</i> <i>Grapevine Bratislava mosaic agent</i> <i>Grapevine chasselas latent agent</i> <i>Grapevine enation agent</i> <i>Grapevine little leaf agent</i> <i>Grapevine vein mosaic agent</i> <i>Grapevine vein necrosis agent</i> <i>Hibiscus leaf curl agent</i> <i>Horsechestnut variegation agent</i> <i>Horsechestnut yellow mosaic agent</i> <i>Jasmine variegation agents</i> <i>Ligustrum mosaic agents</i> <i>Maple mosaic agent</i> <i>Maple variegation agent</i> <i>Mountain ash ringspot mosaic agent</i> <i>Mountain ash variegation agent</i> <i>Mulberry mosaic agent</i> <i>Okra mosaic agents</i> <i>Okra yellow leaf curl agent</i> <i>Peach wart agent</i> <i>Pear bud drop agent</i> <i>Pear rough bark agent</i> <i>Pear stony pit agent</i> <i>Quince sooty ringspot agent</i> <i>Quince stunt agent</i> <i>Quince yellow blotch agent</i> <i>Rose wilt agent</i> <i>Sampaguita yellow ringspot mosaic agent</i> <i>Spur cherry agent</i>	
---	---	--

中華民國輸入植物或植物產品檢疫規定乙、有條件輸入 植物或植物產品之檢疫條件第二點第二十一項附件美國 威斯康辛州產新鮮西洋參輸入檢疫條件第三點修正草案 對照表

修 正 規 定	現 行 規 定	說 明
三、土壤檢測基準 (一) 美方應以系統性方式取樣<u>指定</u>生產點之土壤(如附件),面積為一公頃以下者,應選取二十五個取樣點;面積為一公頃以上者按其公頃數乘以二十五為其取樣點數(採無條件進入法取概數到個位)。土壤之取樣點應儘可能靠近西洋參根部,且每個取樣點取深度十三公分、至少十公克之土壤。 (二) 每個土壤樣本至多由五十個取樣點之土壤混合組成,並保存在塑膠袋或其他保濕袋中。 (三) 土壤樣本應存放在陰涼處,避免溫度變化。樣本袋應貼妥標籤並密封以保持土壤濕度。取樣人員如無法親自運送到土壤檢測實驗室,應將土壤樣本裝在隔熱容器中並以次日可抵達之方式寄送。 (四) 土壤樣本應予編號,並由美方核可之實驗室進行線蟲檢測,實驗室應在十個工作天內出具檢測結果。如在土壤樣本中發現穿孔線蟲屬(<i>Radopholus</i> spp.)之線蟲時應鑑定至種,	三、土壤檢測基準 (一) 美方應以系統性方式取樣之<u>定</u>生產點之土壤(如附件),面積為一公頃以下者,應選取二十五個取樣點;面積為一公頃以上者按其公頃數乘以二十五為其取樣點數(採無條件進入法取概數到個位)。土壤之取樣點應儘可能靠近西洋參根部,且每個取樣點取深度十三公分、至少十公克之土壤。 (二) 每個土壤樣本至多由五十個取樣點之土壤混合組成,並保存在塑膠袋或其他保濕袋中。 (三) 土壤樣本應存放在陰涼處,避免溫度變化。樣本袋應貼妥標籤並密封以保持土壤濕度。取樣人員如無法親自運送到土壤檢測實驗室,應將土壤樣本裝在隔熱容器中並以次日可抵達之方式寄送。 (四) 土壤樣本應予編號,並由美方核可之實驗室進行線蟲檢測,實驗室應在十個工作天內出具檢測結果。如在土壤樣本中發現穿孔線蟲屬(<i>Radopholus</i> spp.)之線蟲時應鑑定至種,	修正誤植文字。

並通知我國植物檢疫機關。 (五) 美方、土壤檢測實驗室及生產者應保留土壤樣本之檢測紀錄備查，紀錄內容應包括取樣日期、指定生產點代號、面積、取樣點數量、土壤樣本數、線蟲鑑定人員、鑑定日期及鑑定結果。	並通知我國植物檢疫機關。 (五) 美方、土壤檢測實驗室及生產者應保留土壤樣本之檢測紀錄備查，紀錄內容應包括取樣日期、指定生產點代號、面積、取樣點數量、土壤樣本數、線蟲鑑定人員、鑑定日期及鑑定結果。	
--	--	--