

茶樹病蟲害

整合性管理技術



田間管理作業流程

(一) 每年 12 月上旬至次年 1 月中旬茶園可進行扦插、中耕及剪枝；扦插前母樹園先行藥劑處理再採穗，可減少茶赤葉枯病或茶褐色圓星病的發生。茶樹剪枝時需徹底的清除罹病枝條，並進行噴藥的工作，可降低夏天枝枯病的發生。



行政院
農業委員會 動植物防疫檢疫局

植物防疫諮詢專線：

0800-069-880

作者：茶業改良場 曾方明、曾信光

植物病蟲害防治摺頁 Plant Disease and Pest Control Information Sheet 34

茶樹關鍵病蟲害發生及其防治時期

月 份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
網餅病												
茶餅病												
茶枝枯病												
茶赤葉枯病、褐色圓星病												
神澤氏葉蟬												
茶蠶												
蟻蟻（雞母蟲）												
茶姬捲葉蛾												
盲椿象、刺粉蝨、白蟻												
茶小緣葉蟬、薊馬												
茶葉蟬、錫蘭偽葉蟬												
茶捲葉蛾												
月 份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

(二) 1月下旬至2月下旬可進行定植或補植，定植前茶園先進行深度耕犁，並休耕1年以上，休耕期間可種植綠肥作物，除可改善土壤質地，增加土壤肥力外，可以減少根部的病蟲害。

(三) 3月中旬至5月中旬、5月中旬至8月中旬、8月下旬至10月中旬、10月中旬至11月中旬分別為春茶、夏茶、秋茶及冬茶的採摘期，施用農藥時應與採摘期配合，以免發生殘留的問題。

(四) 其餘如施肥、除草的工作應依照茶樹田間作業規範進行，以培養健康之茶樹，將有助於抵抗病蟲害。



圖一 茶樹枝枯病病徵圖片。



圖二 茶樹褐色圓星病病徵圖片。



圖三 茶園釋放草蛉卵片。

圖四 茶園種植綠肥植物。

